

Daehan
Nupharm

PRODUCT LIST

for **Obesity**

SNU Wonder

스누원더하버네로



Activation of brown adipose tissue

**SNU
wonder**

Capsinodis
(Capsiate, Dihydrocapsiate)

**교감 신경계
활성화**

**열에 반응하는
온도 센서**

TRPV1

transient receptor
potential vanilloid 1

**갈색 지방과
베이지색 지방의**

UCP1

활성화




비만 PRODUCT LIST | SUMMARY

계열분류	제품명	성분명	대조약
A 08 식욕억제제	피티엠정	Phentermine HCl	아다펙스정
	페스틴정	Phentermine HCl	푸리민정
	펜틴정	Phendimetrazine tatarate	푸링정
A 08 지방흡수억제제	제로비캡슐	Orlistat	제니칼캡슐
	제로비정	Orlistat	제니칼캡슐
A 08 16 R 05 대사촉진제	디카틴정	L-Carnitine	엘칸정
	다이엔캡슐	Green tea powder / Orthosiphon powder	-
	카푸린에스정	Ephedrine HCl / Acetaminophen / Caffeine anhydrous	-
	버닝슬림정 NEW	가르시니아캄보지아추출분말, 스누윈더하바네로분말	건강기능식품
A 10 V 03 탄수화물 흡수억제제	미그보스필름코팅정	Miglitol	-
	루치온정	Glutathione(reduced)	비스타치정 / 글루100정
	카보글루엑스캡슐	흰강낭콩분말 / Vit.C / Vit. B / Vit.B2 / Vit.B6 /Whey Calcium	건강기능식품
A C N R 03 10 03 06 06 06 06 08 07 기타비만보조제	탐부틴정	Trimebutine maleate	포리부틴정
	마노엘정	Aloe Ext. / Magnesium hydroxide / Ursodeoxycholic acid	-
	뉴코딜정	Bisacodyl / Docusate sodium	-
	마메이드정	Alginate acid / Carboxymethyl cellulose sodium	-
	캠벨정	방풍통성산건조엑스 (4.64 → 1)	-
	캠벨더블정 NEW	방풍통성산건조엑스 (4.64 → 1)	-
	나오미정	방기황기탕건조엑스 (7.52 → 1)	-
	콜레스텐연질캡슐	Safflower oil / Tocopherol acetate / Pyridoxine HCl 0.67mg	-
	토피정	Topiramate	토파맥스정
	토피트정	Topiramate	토파맥스정
	디프렌캡슐	Fluoxetine HCl	폭세틴캡슐/푸로작캡슐
	나렉스정	Naltrexone HCl	-
	히스탐에프정	Betahistine HCl	메가베타정
	파인에스정	Bromelain / Caffeine anhydrous / Diphenhydramine HCl	-
	바이타비정	Folic acid / Cyanocobalamin Pyridoxine HCl 50mg	-
에니플러스캡슐	Vit. C / Magnesium oxide / Crystalline cellulose / L-tyrosine	건강기능식품	

식욕억제제

A




08

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	피티엠정 Phentermine HCl 18.75mg (As Phentermine 15mg)	초기 체질량지수(BMI)가 30kg/m ² 이상, 또는 다른 위험인자가 있는 BMI 27kg/m ² 이상인 외인성 비만 환자에서 운동, 행동 수정 및 칼로리 제한을 기본으로 하는 체중감량 보조요법	1일 1~2회, 1회 1정	669905860 440원	30정/병 100정/병	A08AA01 전문/항정 123 자율 신경제
	페스틴정 Phentermine HCl 37.5mg (As Phentermine 30mg)		1일 1회, 1회 1정	669904160 770원	30정/병 100정/병	
	펜틴정 Phendimetrazine tartrate 35mg		1일 2~3회, 1회 1~2정	669904170 330원	30정/병 300정/병	

지방흡수억제제

A

08

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	제로비캡슐 60mg Orlistat 60mg	체질량 지수(BMI) 30 kg/m ² 이상 또는 다른 위험인자 (예, 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증)가 있는 27kg /m ² 이상의 비만환자에 있어 저칼로리 식이와 함께 체중감소 또는 체중유지를 포함한 비만치료 또는 체중 재증가의 위험감소	지방을 함유하는 식사와 함께 복용하거나 식사 후 1시간 이내 1일 3회, 1회 120mg	669907830 590원	30캡슐/병 300캡슐/병	A08AB01 전문 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품
	제로비캡슐 120mg Orlistat 120mg			669907840 950원		
	제로비정 120mg Orlistat 120mg			669908210 890원		

* 각 제품의 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.

대사촉진제

A 08 16 R 05




대사촉진제

탄수화물억제제


제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드	포장단위	ATC코드
				약가		식약처분류
	디카틴정 L-carnitine 330mg	1차성, 2차성 카르니틴 결핍증 허혈성 심질환에 의한 심근대사장애 : 협심증, 급성심근경색	1일 2~3g을 2~3회 분할 경구투여	6699050180 220원	90 정/상자 (10정/ PTP×9)	A16AA01 일반 219 기타의 순환계용약
	다이엔캡슐 Green tea powder 250mg Orthosiphon powder 150mg	비만 또는 과체중시 체중감량 보조제	1일 3회, 1회 1~2캡슐	669900460 141원	300캡슐/병	A08AX 일반 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품
	카푸린에스정 Ephedrine HCl 25mg Caffeine anhydrous 25mg Acetaminophen 200mg	감기의 증상 (인후(목구멍)통, 기침 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화	1일 3회, 1회 1정	669905870 140원	60정/병	R05X 일반 114 해열, 진통, 소염제
NEW						
	버닝슬림정 가르시니아캄보지아, 스누윈더하바네로, 히드록시프로필메틸셀룰 로스 외	탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음.	1일 2회, 1회 2정	363원	180정/병	건강기능식품

탄수화물흡수억제제

A 10 V 03

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드	포장단위	ATC코드
				약가		식약처분류
	미그보스 필름코팅정 Miglitol 50mg	식이요법만으로는 충분히 조절되지 않거나 혹은 식이요법과 설폰닐우레아의 병용요법으로 치료가 되지 않은 인슐린 비의존성 당뇨병	초기 : 1정 1일 3회 복용 내약성에 따라 4-12주간의 치료 후 유지 용량으로 100밀리그램을 1일 3회까지 정상적으로 증량	671805540 330원	30정/병 500정/병	A10BF02 전문 396 당뇨병용제
	루치온정 50mg Glutathione(Reduced) 50mg	약물중독	1일 1~3회 (50mg 최대 6정, 100mg 최대 3정)	669907880 220원	300정/병	V03AB32 일반 392 해독제
	루치온정 100mg Glutathione(Reduced) 100mg			669907860 440원		

탄수화물흡수억제제

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	카보글루엑스캡슐 흰강낭콩분말 / Vit.C / Vit.B / Vit.B2 / Vit.B6 / Whey Calcium	[비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민C] 결합조직 형성과 기능 유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요	1일 2회, 1회 2캡슐	330원	300캡슐/병	건강기능식품

기타비만보조제

A 03 06

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	탐부틴정 200mg Trimbutine maleate 200mg	식도역류 및 열공헤르니아, 위 십이지장염, 위 십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상(복통, 소화불량, 구역, 구토), 과민성대장증후군 및 경련성 결장, 소아 질환: 습관성 구토, 비강염성 장관통과장애 (변비, 설사), 동요자극, 수면장애	1일 3회, 1회 1/2~1정	669903930 120원	500정/병	A03AA05 일반 239 기타의 소화기관용약
	마노엘정 Aloe Ext.100mg Magnesium hydroxide 500mg Ursodeoxycholic acid 10mg	변비, 변비에 따른 다음 증상의 완화: 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질	15세 이상: 1회 1~2정, 1일 2회 (식전, 식간)	669905390 121원	300정/병	A06AB20 일반 238 하제, 완장제
	뉴코딜정 Bisacodyl 3mg Docusate sodium 16.75mg	변비에 따른 다음 증상의 완화: 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질	1. 15세 이상: 1회 1~2정, 1일 3회 식후에 복용 2. 11세 이상 ~15세 미만: 1회 2/3 ~ 3/4정, 1일 3회 식후에 복용 3. 7세 이상 ~ 11세 미만: 1회 1/2 ~ 1정, 1일 3회 식후에 복용	669907370 92원	500정/병	A06AB52 일반 238 하제, 완장제

* 각 제품의 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.

기타비만보조제

A 08 C 10 N 03 06

기타비만보조제

Daehan Nupharm

Product List

2025

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	마메이드정 Alginate acid 200mg Carboxymethyl cellulose sodium 100mg	음식물 섭취 감소를 통한 체중감량의 보조요법	1일 3회, 1회 2정	669904770 242원	300정/병	A08AX 일반 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품
	캠벨정 방풍통성산건조엑스 (4.64 → 1) 237.5mg	음식물 섭취 감소를 통한 체중감량의 보조요법	1일 3회, 1회 4정 (식전 또는 식간 복용)	66990360 121원	500정/병	A08AX 일반 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품
NEW						
	캠벨더블정 방풍통성산건조엑스 (4.64 → 1) 475mg	음식물 섭취 감소를 통한 체중감량의 보조요법	1일 3회, 1회 2정(식전 또는 식간 복용)	220원	300정/병	
	나오미정 방기황기탕건조엑스 (7.52 → 1) 244mg	살색이 희고, 피로하기 쉬우며, 땀이 잘 나는 경향이 있는 다음 증상 : 비만 (근육에 긴장감이 없고 몰살진), 관절통, 부종	1일 3회, 1회 4정(식전 또는 식간 복용)	669905310 110원	360정/병	A08AX 일반 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품
	콜레스텐연질캡슐 Safflower oil 333.33mg (리놀산으로서 250mg) Tocopherol acetate 6.67mg Pyridoxine HCl 0.67mg	비만증, 당뇨병, 본태성 고콜레스테롤혈증에 의한 지질대사 개선	1일 3회, 1회 3캡슐 (식사 30분 전 복용)	669903770 130원	300캡슐/병	C10B 일반 218 동맥경화용제
	토피정 25mg Topiramate 25mg	간질, 편두통의 예방	간질 : 처음 1주일 동안 저녁에 1정씩 투여하고 1~2주 간격으로 1일 25또는 50mg 씩 증량하여 1일 2회 (단독요법으로서의 권장용량은 1일 100 ~ 200mg) 편두통의 예방 : 처음 1주일 동안은 저녁에 1정으로 투여를 시작하고 주간격으로 1정/ 일씩 증량	669905190 385원	30정/병 100정/병	N03AX11 전문 113 항전간제
	토피트정 Topiramate 100mg			669905500 880원		
	디프렌캡슐 10mg Fluoxetine HCl 11.2mg (As Fluoxetine 10mg)	우울증, 신경성 식욕과향진증, 강박반응성 질환, 월경전 불쾌장애	1일 60mg, 1일 투여량은 80mg를 초과하지 않는다.	669906140 220원	30캡슐/병 300캡슐/병	N06AB03 전문 117 정신신경용제
	디프렌캡슐 Fluoxetine HCl 22.4mg (As Fluoxetine 20mg)			669901000 424원 (급여, 비급여 동일)		

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	나렉스정 Naltrexone HCl 25mg	적정관리 프로그램과 병행하여 알코올 의존성 치료 및 외인성 아편류의 효과차단	1일 1회, 1회 2정	669906120 1,350원	30정/병 100정/병	N07BB04 전문 392 해독제
	히스탄에프정 16mg Betahistine HCl 16mg	메니에르병에 의한 어지러움, 이명, 청력소실	초기용량 : 1일 3회, 1회 1정 유지용량 : 1일 24 ~ 48mg	669904760 165원	30정/병 300정/병	N07CA01 전문 116 진훈제
	히스탄에프정 24mg Betahistine HCl 24mg			669904780 198원		
	파인에스정 Bromelain 45mg Caffeine anhydrous 20mg Diphenhydramine HCl 25mg	코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 증상의 완화	1일 3회, 1회 1정	669907540 198원	300정/병	R06AA52 일반 141 항히스타민제
	바이타비정 Folic acid 250ug Cyanocobalamin 500ug Pyridoxine HCl 50mg	다음경우의 비타민B6의 보급 - 임신 수유기 - 병중 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염, 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염)	만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 1정	669906110 130원	300정/병	A11JA 일반 313 비타민 B제
	에니플러스캡슐 Vit.C / Magnesium oxide / Crystalline cellulose / L-tyrosine	[비타민C] 결합조직 형성과 기능 유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [마그네슘] 에너지 이용에 필요, 신경과 근육기능 유지에 필요	1일 2회, 1회 1 캡슐	220원	300캡슐/병	건강기능식품

* 각 제품의 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.

이당류의 단당류 분해를 저해하는 탄수화물 흡수억제 효과

미그보스필름코팅정

(miglitol 50mg)

Miglitol reduced the body weight and BMI of Obese or T2DM patients


Anti-obesity effects

- ✓ Inhibition of carbohydrate absorption
- ✓ Stimulate GLP-1 secretion
- ✓ Activation of BAT(brown adipose tissue)



미그보스는 대사증후군 Patients 대상 12주 복용으로 5.1%의 체중 감량 효과를 보였습니다.

Miglitol, α -glycosidase inhibitor, reduces visceral fat accumulation and cardiovascular risk factors in subjects with the metabolic syndrome




General characteristics of studied patients. Mean \pm SD. p for trend: p values by repeated measures one-way ANOVA. ns: not significant, *p<0.05, †p<0.01, ‡p<0.001 vs baseline

	LSM (n=56)				LSM+M (n=55)			
	Baseline	4 weeks	12 weeks	p for trend	Baseline	4 weeks	12 weeks	p for trend
Body weight (kg)	71.8 \pm 9.4	69.3 \pm 9.5	70.2 \pm 9.1	ns	72.6 \pm 11.7	70.6 \pm 11.1 [†]	68.9\pm10.4[‡]	<0.0001
Body mass index (kg/m ²)	27.5 \pm 3.3	26.8 \pm 3.6*	26.9 \pm 3.2*	<0.01	27.8 \pm 3.5	27.1 \pm 3.3 [†]	26.4\pm3.0[‡]	<0.0001
Waist circumference (cm)	92.9 \pm 5.7	91.3 \pm 6.2	90.8 \pm 7.2*	0.039	94.5 \pm 8.6	93.0 \pm 8.3 [†]	91.2\pm7.3[‡]	<0.0001
Systolic blood pressure (mm Hg)	137 \pm 15	134 \pm 15	133 \pm 14	ns	142 \pm 15	134 \pm 12 [†]	133\pm14[‡]	<0.0001
Diastolic blood pressure (mm Hg)	85 \pm 11	82 \pm 9	81 \pm 8	ns	86 \pm 10	83 \pm 8 [†]	82\pm8[‡]	<0.0001

미그보스 12주 복용시 복부 내장지방이 15% 감소했습니다.

Miglitol treatment profoundly reduced VFA by 15% and SFA by 10%, respectively. In contrast, LSM alone could reduce VFA only by 4% and could not reduce SFA after treatment (determined by CT)





대한뉴팜 카카오채널