

PRODUCT LIST

WELL · BEING

“ New Platform for Life Care,
라이프케어의 새로운 장을 열어갑니다. ”



DH
NP

비타민제

분류	구분	제품명	제품	성분 / 함량	효능 / 효과	포장단위	코드
						용법용량	
316	전문	멀티비타주 [Multivita Inj.]		Ascorbic acid 100mg, Biotin 60µg, Cyanocobalamin 5µg, Dexpanthenol 15mg, Ergocalciferol 5µg(200IU), Folic acid 400µg, Niacinamide 40mg, Pyridoxine HCl 4.86mg, Riboflavin sodium 3.6mg, phosphate 3.6mg, Thiamine HCl 3.81mg, Tocopherol acetate 10mg, Vitamin A 3,300IU	1. 수액제로 영양을 공급받는 환자의 비타민 유지요법 2. 다음 환자의 비타민(비타민 K제외) 결핍 예방 - 외과수술시, 중증화상, 골절 및 기타외상 - 중증감염증, 혼수상태	10V	669906440
						[11세 이상의 소아 및 성인] 이 약에 주사용 증류수 5mL를 가볍게 흔들어 녹인 다음, 5분 이내에 정맥주사용 포도당 주사액, 생리식염 주사액 또는 이와 유사한 수액제 500~1,000mL에 혼합하여 1일 1회 점적 IV	
239	전문	펜타비타주 [Pentavita Inj.]		Dexpanthenol 500mg/2mL	판토텐산결핍증의 예방 및 치료, 판토텐산의 수요가 증대하고 식사로부터 섭취가 불충분한 때의 보급	2mL X 50A	669904691
						1회 20~100mg 1일 1~2 IM, IV 수술 후 장관 마비에는 1회 50~500mg 1일 1~3회 투여하고 필요시 6회까지 증가 가능	
312	전문	푸르민주 5mg [Furmine Inj. 5mg]		Fursultiamine HCl 54.6mg	비타민 B1 결핍증의 예방 및 치료, 비타민 B1의 수요가 증대하여 음식으로부터 섭취가 불충분한 때의 보급	10mL X 10A	669904210
						보통 성인 1일 5~100mg을 SC, IM, IV	
313	전문	헥사비타주 [Hexavita Inj.]		Pyridoxine HCl 50mg	비타민 B6 결핍증의 예방 및 치료, 비타민 B6의 수요가 증대하여, 식사로부터의 섭취가 불충분할 경우	2mL X 50A	669904680
						경구복용이 어려운 경우 성인 연산피리독신으로서 1일 10~100mg을 1~2회 분할 하여 IM, SC, IV	
314	전문	대한뉴팜 비타민씨 10g주 [DaehanNewpharm Vitamin C Inj.]		Ascorbic acid 10g	비타민 C 결핍증의 예방과 치료, 비타민 C의 요구량이 증가하는 경우	20mL X 10A	669900560
						1일 50~1,000mg을 1일 1회~수회 분할하여 SC, IM, IV	
311	전문	바이타디주 [Vita-D Inj.]		Cholecalciferol 7.5mg/1ml (300,000IU)	1. 비타민 D가 결핍된 고령자 및 청소년에서의 비타민D 결핍의 예방과 치료 2. 비타민 D가 결핍된 성인에서의 비타민D 결핍의 치료	1mL X 5A	669907081
						[성인] 콜레칼시페롤로서 200,000IU를 IM [청소년] 콜레칼시페롤로서 200,000IU를 IM [고령자] 콜레칼시페롤로서 100,000IU를 IM 연간투여량이 콜레칼시페롤 로서 600,000IU가 넘지 않도록 한다.	

근골격계용제

분류	구분	제품명	제품	성분 / 함량	효능 / 효과	포장단위	코드
						용법용량	
399	전문	엔피본주 [Enpibone Inj.]		ibandronate sodium monohydrate 3.375mg /3mL (3mg as ibandronate)	폐경 후 여성의 골다공증 치료	3mL/ 프리필드시린지(1관)	급여 669906741 (54,246원-2017.02.01)
						3mg을 3개월에 한번씩 15~30초 간 IV 환자들은 보조적으로 칼슘과 비타민 D를 섭취하도록 한다. 정기 투약일에 투약을 잊었을 경우 가능한 빨리 주사하고, 이로부터 3개월 간격으로 정기적으로 투약한다.	
399	전문	히아름 플러스주 [Hyalumplus Inj.]		Sodium hyaluronate 20mg	폐경 후 여성의 골다공증 치료	2mL/ 프리필드시린지(1관) 프리필드시린지(3관)	급여 669907351 (15,299원-2019.04.01)
						보통 성인 1주 1회, 1관을 3주간 연속하여 슬관절강 또는 견관절(견관절강, 견봉하활액포 또는 상완 이두근 장두견건초) 내에 투여하나, 증상에 따라 투여회수를 적절히 투여한다. 이 약은 관절 내에 투여하므로 엄격한 무균 조작 하에서 실시할 것	

진경제

분류	구분	제품명	제품	성분 / 함량	효능 / 효과	포장단위	코드
						용법용량	
124	전문	미네엠주 [Mine-M Inj.]		Magnesium sulfate 0.5g	경련, 자간, 전해질보급(저마그네슘혈증), 자궁경직(분만촉진)	5mL X 25A	669904701
						1~5g을 IM, IV 전해질보급을 위해서는 1일 2~4g을 수회 분할하여 IM, 매우 천천히 IV	

효소제

분류	구분	제품명	제품	성분 / 함량	효능 / 효과	포장단위	코드
						용법용량	
395	전문	리포라제주 [Liporase Inj.]		Hyaluronidase 1,500 IU	피하주사나 근육주사, 국소마취제 및 피하주입 시 침투력증가. 조직 내에 과다하게 존재하는 체액 및 혈액의 재흡수 촉진	10V	669904600
						[피하주입시(대량피하주사)] 1바이알을 주사용수나 생리식염주사액 1mL에 녹여서 피하주입을 시작하기 전에 해당부위에 주사	

무기질제제

분류	구분	제품명	제품	성분 / 함량	효능 / 효과	포장단위	코드
						용법용량	
339	전문	멀티트레이스주 [Multitrace Injection]		Zinc sulfate hydrate 43.9mg Cupric sulfate 15.7mg Manganese sulfate 3.08mg Chromic chloride 205µg Selenious acid 327µg/10mL	경정맥 영양보급시 미량원소 (아연, 구리, 망간, 셀레늄, 크롬)의 보급	10mL X 10V	669906881
						의사의 처방에 따라 사용되되, 혈장 미량 원소량을 확인하여 용량 조절의 지침으로 삼는다.	
322	전문	셀레네주 10mL [Selene Inj.]		Sodium selenite pentahydrate 1.66mg/10mL	영양공급으로 보충될 수 없는 셀레늄 결핍 환자에서 셀레늄 보급	10mL X 10V	669907071
						셀레늄으로서 1일 100µg을 IM, IV 필요한 경우 1일 200µg까지 증량 가능 치료가 적절한지를 확인하기 위하여 셀레늄의 혈중농도를 측정 해야함. 만약 이 약을 종합 비경구 영양요법 (TPN) 기본 주사에 추가로 투여할 경우 반드시 1일 용량은 셀레늄으로서 100µg을.	
322	전문	대한뉴팜 염화마그네슘주 10% [DHNP Magnesium Chloride Inj. 10%]		Magnesium chloride 1g/10mL	1. 토르사드 드 포인트 (Torsade de pointe)치료 2. 저마그네슘혈증을 동반한 급성 저칼륨혈증 치료 3. 전해질 불균형시 마그네슘 보충 4. 비 경구영양 공급시 마그네슘 보충 5. 자간전증(임신중독증) 위험의 예방 및 치료	10mL X 10A	669905890
						[토르사드 드 포인트 (Torsade de pointe) 치료] 마그네슘 8mmol (염화마그네슘 1.6g) 을 천천히 IV	
322	전문	징크에스주 5mL / 10mL [Zinc S Inj.]		Zinc sulfate hydrate 22mg(As zinc 5mg) / Zinc sulfate hydrate 44mg(As zinc 10mg)	비경구영양요법(TPN)시 아연 보충	5mL X 10V / 10mL X 10V	669905811 / 669905541
						의사의 처방에 따라 사용되되, 혈장 미량 원소량을 확인하여 용량 조절의 지침으로 삼는다.	

해열진통소염제

분류	구분	제품명	제품	성분 / 함량	효능 / 효과	포장단위	코드
						용법용량	
114	전문	비코라민주(2mL) [Bicolamin Inj.(2mL.)]		Hydroxocobalamin 5mg	급성신경염, 다발성 신경염, 좌골신경통, 류마티양 신경통, 경건완중후군, 척수근통, 견갑관절 주위염, 암 및 외상에 의한 신경통, 대상포진 및 편두통에 의한 신경통	2mL X 50A	669906481
						1일 1회 IM, IV	
114	전문	뉴포팜주 [Newfopam Inj.]		Nefopam HCl 20mg	급성통증의 대증요법, 특히 수술 후 통증	2mL X 10A	669906231
						1회 20mg을 IM, IV 필요한 경우 1일 120mg을 초과하지 않는 범위에서 6시간마다 반복 투여	
114	전문	크낙주2mL [Cnac Inj. 2ml]		Diclofenac-beta-dimethyl-aminoethanol 90mg	급성통증의 대증요법, 특히 수술 후 통증	2mL X 10A	급여 669903791 (1,044원-2017.02.01)
						다음 질환에 사용할 수 있다. 1. 류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염 2. 외상후·수술후 염증 및 등통, 급성통풍, 신 및 간산통	

기타약물

분류	구분	제품명	제품	성분 / 함량	효능 / 효과	포장단위	코드
						용법용량	
399	전문	이엔지주 [ENG Inj.]		Adenosine triphosphate disodium trihydrate 21.96mg (As Adenosine triphosphate disodium 20mg)	근무력증, 심부전, 만성감염에 있어서의 간기능 개선, 두부외상 후유증, 조절성 안정피로	2mL X 10A	669906040
						보통성인 1회 5~20mg을 1~2회 SC, IM, IV	
392	전문	리코리스주 [Licorice Inj.]		Ammonium Glycyrrhizinate 26.5mg, Glycine 200mg, Cysteine Hydrochloride Monohydrate 10mg	두드러기, 습진, 알레르기성 피부질환, 약물중독의 보조요법, 만성간질환의 간기능 개선	10mL X 50A	669904730
						1회 2~20mL, 1일 1회 IV, 만성간질환에는 1회 40~60mL, 1일 1회 IV 점적 IV증량하는 경우에는 1일 최대 100mL를 초과하지 않는다.	
399	전문	신델라주 [Cindella Inj.]		Thioctic acid 25mg	티옥트산의 수요가 증대되는 경우의 보급(격심한 육체노동시), Leigh증후군 (아급성괴사성뇌척수염), 중독성(스트렙토마이신, 가나마이신에 의한) 및 소음성(직업성)의 내이성 난청	5mL X 10A	669905780
						성인 1회 1회 10~25mg을 정맥내 주사	
399	전문	바이온주 [Bione Inj.]		Glutathione(reduced) 600mg	시스플라틴 또는 유사계열 화학요법에 의한 신경성질환의 예방	10V	662502980
						중증의 경우 1일 600~1200mg을 IM, 점적 IV	
399	전문	루치온주 600mg/1200mg [Luthione Inj.]		Glutathione(reduced) 600mg/1200mg	시스플라틴 또는 유사계열 화학요법에 의한 신경성질환의 예방	10V / 10V	662502980 / 669906030
						중증의 경우 1일 600~1200mg을 IM, 점적 IV	
490	전문	뉴디엔주 [Newdien Injection]		Polydeoxyribonucleotide sodium 5.625mg	피부이식으로 인한 상처의 치료 및 조직 수복	3mL X 10V	669906641
						1일 1바이알을 IM, SC	
399	전문	사메주 [SAME Inj.]		S-adenosyl- L-methionine sulfate 192mg (as S-adenosyl-Lmethionine 100mg)	우울증	5V(첨부용제 5A)	669907191
						S-아데노실-L-메티오닌으로서 1회 100~200mg, 1일 2회 15~20일간 IV, IM 이 약은 사용할 때 첨부된 용제에 용해하여 사용	
391	전문	헤폴리브주 [Hepoliv Inj.]		L-ornithine-L-aspartate 5g	다음의 중증의 간질환 해독 : 간성뇌증(혼수 전단계, 혼수포함)	10mL X 10A	669904470
						간성뇌증(혼수전단계, 혼수포함)에서 L-아스파르트산-L-오르니틴으로서 1일 40g(8एम플)까지 적정수액제에 혼합하여 점적주사할 수 있다. 증상에 따라 적절히 증감한다.	
392	전문	뉴제닐주 2mL / 5mL [Newzenil Inj.]		Flumazenil 0.2mg/0.5mg	다음의 중증의 간질환 해독 : 간성뇌증(혼수 전단계, 혼수포함)	2mL X 5, 10A / 5mL X 5, 10A	급여 669906301 (13292원-2020.01.01) / 급여 669906581 (8078원-2020.01.01)
						IV, 점적 IV 1. 마취시- 초회 권장 투여량으로 플루마제닐로서 0.2mg을 15초 이내에 IV 2. 중환자 치료시- 초회 권장 투여량은 플루마제닐로서 0.3mg을 IV (자세한 사용법은 설명서 참조)	

순환기계용제

분류	구분	제품명	제품	성분 / 함량	효능 / 효과	포장단위	코드
						용법용량	
219	전문	지타코주 [Gitako Inj.]		Ginkgo leaf extract 17.5mg	뇌혈액순환장애 및 뇌영양장애 (뇌혈관부전), 다음 증상을 수반하는 뇌기능장애: 지적 및 감각능력저하, 어지러움, 이명 등	5mL X 25A	669903401
						1일 5~10mL를 IM, IV 또는 2일마다 15mL IV	
219	전문	메조카틴주 [Mesocartin Inj.]		L-carnitine 2g/10mL	1. 1차성, 2차성 카르니틴결핍증 2. 허혈성심질환에 의한 심근대사 장애 : 협심증, 급성심근경색 3. 혈액투석중인 말기 신 질환자의 카르니틴 결핍증 치료	10mL X 10A	669905901
						1차성, 2차성 카르니틴 결핍증 허혈성 심질환에 의한 심근대사 장애 : 협심증, 급성 심근경색 [성인] 엘- 카르니틴으로서 1일 2~3g을 2~3회 분할하여 IM, IV	

항악성 종양제

분류	구분	제품명	제품	성분 / 함량	효능 / 효과	용법용량	포장단위	보험코드
421	전문/희귀	이스카도 M 0.01mg [Iscado M Injection. 0.01mg]		Viscum Album(Mali) Soluble Extract(1→5) 0.05mg/mL	종양의 치료, 종양수술 후 재발의 예방, 전암증병소 조혈 기관의 악성질환, 골수기능의 자극	1. 초기 단계 : 시리즈 0에서 부터 단계적인 용량증가, 주 2~3회 피하 주사 2. 유지단계 : -개별적으로 결정된 최적용법 용량으로 치료를 지속 -유지기간 동안 시리즈의 치료는 가장 높은 강도를 나타내는 용량, 또는 해당 종류의 묽음을 사용 하는 것으로 지속	1mL X 7A	비급여 053100040
421	전문/희귀	이스카도 M 0.01mg [Iscado M Injection. 0.01mg]		Viscum Album(Mali) Soluble Extract(1→5) 0.5mg/mL			1mL X 7A	비급여 053100100
421	전문/희귀	이스카도 M 1mg [Iscado M Injection. 1mg]		Viscum Album(Mali) Soluble Extract(1→5) 5mg/mL			1mL X 7A	비급여 053100050
421	전문/희귀	이스카도 M 10mg [Iscado M Injection. 10mg]		Viscum Album(Mali) Soluble Extract(1→5) 50mg/mL			1mL X 7A	비급여 053100010
421	전문/희귀	이스카도 M 20mg [Iscado M Injection. 20mg]		Viscum Album(Mali) Soluble Extract(1→5) 100mg/mL			1mL X 7A	비급여 053100090
421	전문/희귀	이스카도 Qu 0.01mg [Iscado Qu Injection.0.01mg]		Viscum album(Quercus) Soluble Extract(1→5) 0.05mg/mL			1mL X 7A	비급여 053100060
421	전문/희귀	이스카도 Qu 0.1mg [Iscado Qu Injection.0.1mg]		Viscum album(Quercus) Soluble Extract(1→5) 0.5mg/mL			1mL X 7A	비급여 053100080
421	전문/희귀	이스카도 Qu 1mg [Iscado Qu Injection.1mg]		Viscum album(Quercus) Soluble Extract(1→5) 5mg/mL			1mL X 7A	비급여 053100070
421	전문/희귀	이스카도 Qu 10mg [Iscado Qu Injection.10mg]		Viscum album(Quercus) Soluble Extract(1→5) 50mg/mL			1mL X 7A	비급여 053100020
421	전문/희귀	이스카도 Qu 20mg [Iscado Qu Injection.20mg]		Viscum album(Quercus) Soluble Extract(1→5) 100mg/mL			1mL X 7A	비급여 053100030

의료기기

분류	구분	제품명	제품	성분 / 함량	효능 / 효과	포장단위	코드
						용법용량	
클라겐 사용조직 보충제 (B04280 .04]	의료 기기	콜라플레오 [COLLAPLEO]		Attelo collagen 3%	내·외과적) 처치 및 수술 시 결손 또는 손상된 인대, 건, 근육, 생체막 등을 보충하기 위해 사용하는 클라겐 함유 물질	1.0ml/1s 22G X 2ea	8809369090712
						2주에 1회 3회 투여 (설명서 참조)	

단백아미노산제제

분류	구분	제품명	제품	성분 / 함량	효능 / 효과	포장단위	코드
						용법용량	
325	전문	프라세인엠주 [Placein M Inj.]		자하거추출물 2mL	갱년기 장애 증상의 개선	2mL X 10A	669904260
						1회 2mL, 1주일에 3회씩 2주간(총 6회) SC	

면역증강제

분류	구분	제품명	제품	성분 / 함량	효능 / 효과	포장단위	코드
						용법용량	
429	전문	티모신주 [Thymosin Inj.]		thymosin α1(alpha 1) 1.6mg	면역기능이 저하된 고령 환자의 인플루엔자 백신접종시의 보조요법	2A, 2V	669907271
						900µg/m2(1바이알)을 백신접종 첫 주부터 4주간 주 2회씩 SC, IM 첨부된 용제에 녹여 주사	

 대한뉴팜

본사(공장) | 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길66 TEL 031-350-6141
서울사무소 | 서울특별시 관악구 남현3길 61(남현동) TEL 02-581-2333
WWW.DHNP.CO.KR

KOSDAQ
코스닥상장법인