Product List

대한뉴팜 동물용의약품 리스트

따뜻함을 함께하는 대한뉴팜이 건강과 행복을 책임집니다.

CONTENTS

축산용

항생, 항균제

사료첨가제

대한 타이믹스/대한 타이셀파 6
네오플러산 /네오플러산 4% 7
네오플러산 80g/맥스티아 8

수용성 첨가제

네오크로 9
타이골드/암피신 10
아모펜/아모실린 11

주사제

엔로신 50주/엔로신 100주 12
엑셀 현탁주/엑센트플러스현탁주 13
DH 엑센트플러스/네오플러 300 주 14
마뽀샷 100/암피제트 주 15
아모파샷 주 16

액상제

엔로삭신액 16
엔로삭신 20% 액/네오플러액 골드 17
네오플러 20% 액 18

유방염 연고제

세파레겐-비유기 연고 18
시너제트 유방염 연고/에코제트 19

항콕시듐제 및 구충제

항콕시듐제

콕시멸/콕시멸-에스 21
콕시펜드/카우멘신 22
카루멘플러스/돼지용 피그록 23
송아지용 피그록 24

파리 구제제

라분믹스 24
미네라본 부록 25

구충제

대한 뉴멕틴프리믹스 25
그랜멕틴 펠렛/그랜멕틴 주사 26
그랜멕틴-에프 주사 27

일반 치료제

대사촉진제

스코피린 주/에너샷 29

해열진통제

아나파 액/아나파 주 30
테라펜-파워액/슈퍼 아스피린액 31
아스비타씨 32

철분제

그랩타론 주 32

면역증가제

이문부스터 33

발정 억제제

투플-에이 33

영양제

사료첨가용 영양제

네오비타린칼/카우믹스 35
카우믹스-젓소용/버퍼밀크 36
셀렌비타-P/슈퍼카우 37
비타플러스-원샷 38

액상제

비타링크 38
비타클릭/파워토코-C 39
파워C-200/파워가바-C 40

부록제

린칼 부록/린칼V 부록 41
비프 부록/황토미네랄 부록 42
카우멘신 43
미네랄 부록/미네라본 부록 44
송아지 기능성부록 45

생균제 및 효소, 효모제

라바자임 45
바이오에스비-골드/이문 디오더 46
에코 아이지/에코 스타 47
루멘닥터 48

영양제

기능성 보조사료

디씨에스 682 48
중조 프리믹스/에너지비타-펠렛 49
파워가바-C/에너지팩 50
말키스타/저마넷 51
대한 징크오닌 52

소독제

소독제

킹사이드 54
올크린업 55

백신

유방염 백신

히프라 스타박 57

수산용

항생, 항균제, 소독제

항생, 항균제

아쿠아테라/아쿠아테라 50% 60
아쿠아 아모실린/아쿠아 아모실린 30% 61
아쿠아-파워콜/아쿠아파워콜액 62
슈퍼 펜콜액/로알플로 50 63
슈퍼네오테라/아쿠아에리스로킹 64
대한 아쿠아에리스팜/아쿠아암피신 65
코코샷 66
소독제
이지워시 67

구충제

아쿠아프란텔/슈프란텔액 69
로알프란텔액/아쿠아하이드 70
아쿠아 트리클/오션닥터 71

간기능 개선제

아쿠아글루톤/아쿠아리버토닉 73
글루비타민헬스 산 74

영양제, 생균제

수산용바이오-씨/바이오에스비-골드 76
아쿠아 키올비타/아쿠아 라바자임 77
아스토코/아쿠아 헬스 78
파워토코-C/파워C-200 79

기타

양봉용

응애킬/대한 안티섹 82
비타킹비-액/쿠마킹 액 83

애완동물용

프라벤-엘 /프라벤-에스 85
하트 필락스 86

조달청 등록 품목

조달청 등록 품목 88

축산용

항생, 항균제
항콕시듐제 및 구충제
일반 치료제
영양제
소독제
백신

항생, 항균제

- **사료첨가제**

- 대한 타이믹스
- 대한 타이설파
- 네오플러산
- 네오플러산 4%
- 네오플러산 80g
- 맥스티아

- **수용성 첨가제**

- 네오크로
- 타이골드
- 암피신
- 아모펜
- 아모실린

- **주사제**

- 엔로신 50주
- 엔로신 100주
- 엑셀 현탁주
- 엑센트플러스현탁주
- DH 엑센트플러스
- 네오플러 300 주
- 마벨샷 100
- 암피제트 주
- 아모파샷 주

- **액상제**

- 엔로삭신액
- 엔로삭신20% 액
- 네오플러액 골드
- 네오플러20% 액

- **유방염 연고제**

- 세파레겐-비유기 연고
- 시너제트 유방염 연고
- 에코제트

대한 타이믹스 Daehan Tymix

세균성질병 예방 · 치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
타일로신인산염 (Tylosin phosphate) 100g
- 특 장 점
 - 양돈장의 정기적인 크리닝 제제로 적합합니다.
 - 광범위한 세균에 감수성이 높아 각종 질병의 예방제로 적합합니다.
- 효능 및 효과
 - 타이로신에 감수성이 있는 세균성 질병의 예방 및 치료
 - 돼 지 : 마이코플라즈마성 폐렴(*Mycoplasma hyopneumoniae*), 증식성 회장염(*Lawsonia intracellularis*), 돼지적리(*Serpulina hyodysentery*) 예방
 - 비육우 : 간농양(*Fusobacterium necrophorum*) 예방
- 용법 및 용량
 - 일일 사료 ton당 다음의 용량을 균일하게 혼합하여 경구투여
가. 돼지
 - (1) 예방 : - 어린돼지 : 본제 220~1,100g
 - 육성돈 비육돈 전기 : 본제 220~440g
 - (2) 치료 : 마이코플라즈마성 폐렴, 증식성 회장염 : 본제 1.1kg을 21일간 투여
 - 나. 비육우(큰 소 비육중기) : 본제 88~110g
- 주의사항 휴약기간 : 없음

대한 타이설파 Daehan Tysulfa

양돈용 세균성질병 예방 · 치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
타일로신인산염 (Tylosin phosphate) 110g
설파메타진나트륨 (Sulfamethazine sodium) 110g
- 특 장 점 양돈장의 골칫거리인 위축성비염, 유행성폐렴 등 세균성폐렴과 돈적리는 물론 회장염까지 한꺼번에 해결해 줍니다.
- 효능 및 효과
 - 타이로신과 설파메타진 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 예방 및 치료
 - 돼지 : 위축성 비염(*Bordetella bronchiseptica*) 감염시 증체유지와 사료 효율개선, 위축성 비염(*Bordetella bronchiseptica*)의 예방, 세균성 폐렴(*Pasteurella multocida*, *Actinomyces pyogens*) 치료
- 용법 및 용량
 - 위축성비염(예방) : 일일 사료 1톤당 본제 1kg을 균일하게 혼합하여 28일간 경구투여
 - 세균성 폐렴(치료) : 일일 사료 1톤당 본제 1kg을 균일하게 혼합하여 21일간 경구투여
- 주의사항 휴약기간 : 돼지 - 15일

네오플러산 Neoflor powder

양돈용 호흡기질병 전문치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
플로르페니콜 (Florfenicol) 20g
- 특 장 점
 - 돼지의 주요 호흡기질병 원인균에 대한 감수성이 매우 높아 타항생제에 비해 탁월한 항균력을 나타냅니다.
 - 클로람페니콜 감수성 세균은 물론 클로람페니콜 내성세균에까지 우수한 약효를 나타내며 인체에 부작용을 일으키지 않는 안전한 제제입니다.
 - 국내 흉막폐렴의 주요 혈청형(2형, 5형)에 대한 효능비교시험에서 타항생제에 비해 낮은 농도에서 뛰어난 치료효과가 입증되었습니다.
- 효능 및 효과
플로르페니콜 감수성 세균에 의한 돼지 호흡기질병의 예방 및 치료
- 용법 및 용량
양돈사료 톤당 1~2kg(0.1~0.2%)을 균일하게 혼합하여 7일간 투여합니다.
- 주의사항
휴약기간 : 3일

항생, 항균제
Product List

네오플러산 4% Neoflor powder 4%

양돈용 호흡기질병 전문치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
플로르페니콜 (Florfenicol) 40g
- 특 장 점
 - 돼지의 주요 호흡기질병 원인균에 대한 감수성이 매우 높아 타항생제에 비해 탁월한 항균력을 나타냅니다.
 - 클로람페니콜 감수성 세균은 물론 클로람페니콜 내성세균에까지 우수한 약효를 나타내며 인체에 부작용을 일으키지 않는 안전한 제제입니다.
 - 국내 흉막폐렴의 주요 혈청형(2형, 5형)에 대한 효능비교시험에서 타항생제에 비해 낮은 농도에서 뛰어난 치료효과가 입증되었습니다.
- 효능 및 효과
플로르페니콜 감수성이 있는 *Actinobacillus pleuropneumoniae*균에 의한 아래 질병의 예방 및 치료
- 돼지 : 흉막폐렴
- 용법 및 용량
양돈사료 톤당 500g~1kg(0.05~0.1%)을 균일하게 혼합하여 7일간 투여합니다.
- 주의사항
휴약기간 : 3일

네오플러산 80g Neoflor powder 80g

양돈용 호흡기질병 전문 치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
플로르페니콜 (Florfenicol) 80g
- 특 장 점
 - 돼지의 주요 호흡기질병 원인균에 대한 감수성이 매우 높아 타항생제에 비해 탁월한 항균력을 나타냅니다.
 - 클로람페니콜 감수성 세균은 물론 클로람페니콜 내성세균에까지 우수한 약효를 나타내며 인체에 부작용을 일으키지 않는 안전한 제제입니다.
 - 국내 흉막폐렴의 주요 혈청형(2형, 5형)에 대한 효능비교시험에서 타항생제에 비해 낮은 농도에서 뛰어난 치료효과가 입증되었습니다.
- 효능 및 효과
 - 플로르페니콜에 감수성이 있는 *Actinobacillus pleuropneumoniae*균에 의한 아래 질병의 예방 및 치료
 - 돼지 : 흉막폐렴
- 용법 및 용량
 - 양돈사로 톤당 본제 250~500g(0.025~0.5%)을 균일하게 혼합하여 7일간 투여한다.
- 주의사항
 - 휴약기간 : 돼지 - 3일

항생, 항균제
Product List

맥스티아 Maxtia

티아몰린, 클로르테트라사이클린 복합 항생제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
클로르테트라사이클린염산염 (Chlortetracycline Hydrochloride) 99g
티아몰린히드로겐푸마레이트 (Tiamulin Hydrogen Fumarate) ... 33g (역가)
- 특 장 점
 - 티아몰린과 CTC 복합 처방으로 항균 작용 상승효과
 - 각종 호흡기 및 소화기 원인 세균에 대한 강력한 항균효과
- 효능 및 효과
 - 클로르테트라사이클린 및 티아몰린에 감수성이 있는 다음의 세균성 질병의 치료
 - 가. 돼지
 - 흉막폐렴(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)
 - 파스튜렐라페렴(*Pasteurella multocida*)
 - 위축성비염(*Bordetella bronchiseptica*)
 - 매지적리(*Brachyspira hyodysenteriae*)
 - 나. 닭
 - 대장균증(*Escherichia coli*)
 - 만성호흡기병(*Mycoplasma gallisepticum*)
- 용법 및 용량
 - 가. 돼지
 - 1일 사료 톤당 본제 2~3kg을 균일하게 혼합하여 5~7일간 경구투여
 - 나. 닭
 - 1일 사료 톤당 본제 1~3kg을 균일하게 혼합하여 5일간 경구투여
- 주의사항
 - 휴약기간 : 돼지 - 15일, 닭 - 5일

네오크로 Neocro

세균성장염 및 호흡기질병 예방 치료제

- 원료약품 및 분량** (본제1kg 중)
 - 옥시테트라사이클린염산염 (Oxytetracycline HCl) 110 g (역가)
 - 네오마이신황산염 (Neomycine sulfate)..... 110 g (역가)
 - 비타민 A (Retinol) 1,000,000 IU
 - 비타민 D₃ (Cholecalciferol)..... 200,000 IU
 - 브롬헥신염산염 (Bromhexine HCl)..... 3 g

- 특 장 점**
 - 옥시테트라사이클린과 네오마이신 및 브롬헥신이 복합 처방되어 강력한 효과를 발휘합니다.
 - 항생제(옥시테트라사이클린, 네오마이신) 외에 비타민이 첨가되어 질병 예방 및 치료효과를 극대화시킵니다.

- 효능 및 효과**
 - 옥시테트라사이클린과 네오마이신 감수성 세균(*E.coli*, *Salmonella*, *Vibrio*, *Pasteurella*, *Mycoplasma* 등)에 의한 아래 질병의 예방 및 치료

대상동물	치 료	예 방
닭, 돼지, 소	- 세균성 장염 - 위축성 비염(AR), CRD, 마이코플라즈마성 폐렴, 기관지염 등의 호흡기 감염증 - 바이러스 질병에 수반되는 2차 세균 감염증	- 사료효율 개선, 성장촉진 - 각종 스트레스 방지 - 호흡기 질병 및 세균성 설사증 - 2차 세균감염증 - 크리닝 시

- 용법 및 용량**
 - 아래 용량을 1일 투여량으로 음수 또는 사료에 혼합하여 3~4일간 경구투여한다.

대상동물	치 료	예 방
닭	스트레스 방지, 성장촉진	음수 1L당 본제 0.3~4.6g 투여 또는 사료 톤당 0.5~1kg 투여
	세균성 장염, CRD 치료	음수 1L당 본제 0.6~9.1g 투여 또는 사료 톤당 1~2kg 투여
돼지	사료효율개선, 성장촉진	체중 10kg당 본제 1g 투여 (음수 1L당 본제 0.8~1g 투여) 또는 사료 톤당 0.5~1kg 투여
	세균성 장염, AR 치료	체중 10kg당 본제 2g 투여 (음수 1L당 본제 1.5~2g 투여) 또는 사료 톤당 0.5~1.5kg 투여
소	세균성 장염, 호흡기 질병 예방 및 치료	체중 50kg당 본제 9~18g 투여 (음수 1L당 본제 2.2~4.4g 투여) 또는 사료 톤당 0.5~1kg 투여

- 주의사항**
 - 휴약기간 : 닭 - 14일, 소 - 30일, 돼지 - 20일

항생, 항균제
Product List

타이골드 Ty-gold

CRD, SEP전문예방·치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
타이로신타르타르산 (Tylosin tartrate) 500 g(역가)
- 특 장 점
 - 만성호흡기병 및 복합만성호흡기병(CRD, CCRD)의 치료에 탁월합니다.
 - 돈적리 및 회장염의 예방·치료에도 효과적입니다.
- 효능 및 효과
 - 타이로신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
 - 닭 : 마이코플라즈마병(*Mycoplasma gallisepticum*)
 - 돼지 : 돼지적리(*Serpulina hyodysenteriae*)
- 용법 및 용량
 - 닭 : 일일 음수 1L당 본제 1g(타일로신으로서 500mg)의 비율로 희석하여 5일간 경구투여
 - 돼지 : 일일 음수 1L당 본제 0.5g(타일로신으로서 250mg)의 비율로 희석하여 5일간 경구투여
- 주의사항
휴약기간 : 닭 - 1일, 돼지 - 2일

항생, 항균제
Product List

암피신 Ampicin

광범위 수용성 항생제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
암피실린수화물 (Ampicillin Hydrate)100 g(역가)
- 효능 및 효과
 - 암피실린에 감수성이 있는 다음의 세균성 질병의 예방 및 치료
 - 가. 송아지 : 세균성 설사증
 - 나. 돼 지 : 세균성 설사증
 - 다. 닭 : 대장균증(*Escherichia coli*)
- 용법 및 용량
 - 다음의 용량을 음수 혼합하여 경구투여
 - 가. 송아지
1일 체중 100kg당 본제 4-15g(암피실린으로서 400-1500mg)
 - 나. 돼지
1일 체중 10kg당 본제 0.5-2g(암피실린으로서 50-200mg)
 - 다. 닭
1일 체중 10kg당 본제 1-2g(암피실린으로서 100-200mg)
- 주의사항
휴약기간 : 소·돼지 - 5일, 닭 - 3일

아모펜 Amophen

광범위 항생제, 해열 복합 처방

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
아목시실린수화물 (Amoxicillin Hydrate) 200 g (역가)
아세트아미노펜 (Acetaminophen) 200 g
- 특 장 점
 - 광범위 항생제인 아목시실린과 진통, 해열제인 아세트아미노펜의 합제로서 세균성 호흡기, 소화기 질병의 증상완화 및 치료에 효과가 우수합니다.
- 효능 및 효과
 - 아목시실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
가. 유효균종 : *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Escherichia coli*, *Hemophilus spp.*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*
나. 축종별 적응증
소(생후 5개월 이하), 돼지 : 폐렴, 대장균에 의한 설사증
- 용법 및 용량 체중 10kg당 본제 0.25g~0.5g을 음수나 사료에 혼합하여 3~5일간 투여
- 주의사항 휴약기간 : 돼지 - 15일, 소 - 20일

항생, 항균제
Product List

아모실린 Amocillin

광범위 반합성 페니실린계 항생제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
아목시실린수화물 (Amoxicillin Hydrate) 200 g (역가)
- 특 장 점
 - 광범위 항생제로서 호흡기 및 소화기 질병에 효과가 우수합니다.
 - 투여 1시간 후 최고 혈중농도에 도달하며 유효농도가 오랜시간 지속됩니다.
 - 경구 투여시 위산에 안정하며 사료 첨가 급여시에도 효과가 우수합니다.
- 효능 및 효과
 - 아목시실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
가. 유효균종 : *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Escherichia coli*, *Hemophilus spp.*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*
나. 축종별 적응증
1) 소(생후 5개월 이하) : 폐렴, 대장균에 의한 설사증
2) 돼지 : 폐렴, 대장균에 의한 설사증
3) 닭 : 대장균증
- 용법 및 용량 다음의 용량을 사료에 혼합하여 1일 1~2회 경구투여(단, 5일 이상 투여하지 말 것)
- 주의사항 휴약기간 : 닭·돼지 - 15일, 소 - 20일

대상동물	체중 kg당 본제 1일 투여용량	체중 kg당 아목시실린 1일 투여용량
소 (생후 5개월 이하)	폐렴 : 15~50mg 대장균 설사증 : 25~50mg	폐렴 : 3~10mg 대장균 설사증 : 5~10mg
돼지	15~50mg	3~10mg
닭	50~250mg	10~50mg

엔로신 50주 Enrocin 50 inj.

고효능 강력 항균제

- 원료약품 및 분량 (본제 1mL 중)
엔로플록사신 (Enrofloxacin) 50 mg

■ 효능 및 효과

대상동물	효능·효과	적응증
소 (송아지)	엔로플록사신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료	대장균중(설사, 패혈증, E.coli), 마이코플라즈마중(Mycoplasma bovis), 살모넬라중(Salmonella typhimurium), 파스튜렐라페렘(Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica)
돼지		대장균중(설사중, 장독혈중, E.coli), 마이코플라즈마성 페렘(Mycoplasma hyopneumoniae), 살모넬라중(Salmonella typhimurium, Salmonella derby), 파스튜렐라 페렘(Pasteurella multocida), 홍막페렘(Actinobacillus pleuropneumoniae)
개, 고양이		비뇨생식기 감염증(E.coli), 창상감염증

■ 용법 및 용량

대상동물	용법	용량 및 투약기간	
소(송아지)	피하주사	일반 세균성 질병	1일 체중 10kg당 0.5mL씩 3일 투여 (엔로플록사신으로서 2.5mg/kg bw/day)
		중증의 호흡기, 소화기 질병	1일 체중 10kg당 1mL씩 3~5일 투여 (엔로플록사신으로서 5mg/kg bw/day)
돼지	근육주사	살모넬라중	1일 체중 10kg당 1mL씩 5일 투여 (엔로플록사신으로서 5mg/kg bw/day)
개, 고양이	피하주사	일반 세균성 질병	1일 체중 kg당 0.1mL씩 5~10일 투여 (엔로플록사신으로서 5mg/kg bw/day)

- 주의사항
휴약기간 : 소, 돼지 - 20일, 우유 - 4일

엔로신 100주 Enrocin 100 inj.

고효능 강력 항균제

- 원료약품 및 분량 (본제 1mL 중)
엔로플록사신 (Enrofloxacin) 100 mg

■ 효능 및 효과

대상동물	효능·효과	적응증
소 (송아지)	엔로플록사신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료	대장균중(설사, 패혈증, E.coli), 마이코플라즈마중(Mycoplasma bovis), 살모넬라중(Salmonella typhimurium), 파스튜렐라페렘(Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica)
돼지		대장균중(설사중, 장독혈중, E.coli), 마이코플라즈마성 페렘(Mycoplasma hyopneumoniae), 살모넬라중(Salmonella typhimurium, Salmonella derby), 파스튜렐라 페렘(Pasteurella multocida), 홍막페렘(Actinobacillus pleuropneumoniae)
개, 고양이		비뇨생식기 감염증(E.coli), 창상감염증

■ 용법 및 용량

대상동물	용법	용량 및 투약기간	
소(송아지)	피하주사	일반 세균성 질병	1일 체중 10kg당 0.25mL씩 3일 투여 (엔로플록사신으로서 2.5mg/kg bw/day)
		중증의 호흡기, 소화기 질병	1일 체중 10kg당 0.5mL씩 3~5일 투여 (엔로플록사신으로서 5mg/kg bw/day)
돼지	근육주사	살모넬라중	1일 체중 10kg당 0.5mL씩 5일 투여 (엔로플록사신으로서 5mg/kg bw/day)
개, 고양이	피하주사	일반 세균성 질병	1일 체중 kg당 0.05mL씩 5~10일 투여 (엔로플록사신으로서 5mg/kg bw/day)

- 주의사항
휴약기간 : 소, 돼지 - 20일, 우유 - 4일

엑셀 헨탁주 Excell injectable suspension

광범위, 강력 항균제

- 원료약품 및 분량 (본제 1mL 중)
세프티오퍼나트륨 (Ceftiofur Sodium) 50 mg (역가)
- 특 장 점
 - 도축전 휴약기간, 납유정지기간이 짧습니다.
 - 부드럽게 주입되며 바닥에 달라붙는 케이킹현상이 없어 사용전 가볍게 흔들어 편리하게 사용할 수 있습니다.
 - 혈중 치료농도에 빠르게 도달하면서도 오래 지속됩니다.
 - 적은 용량, 1일 1회 투여로 동물에 스트레스를 줄여줍니다.
- 효능 및 효과
 - 세프티오퍼에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
 - 소 : *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus* 에 의한 호흡기 질병(수송열, 세균성 폐렴)의 치료
 - 돼지 : *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella choleraesuis*, *Streptococcus suis* 에 의한 호흡기 질병(홍막폐렴, 파스튜렐라성 폐렴, 일반 세균성 폐렴) 치료
- 용법 및 용량
 - 소 : 체중 50kg당 1mL(세프티오퍼로서 50mg)를 1일 1회 3일간 근육주사 단, 증상이 호전되지 않을 경우 5일까지 투여할 수 있음
 - 돼지 : 체중 10kg 당 0.6~1mL(세프티오퍼로서 30~50mg)를 1일 1회 3일간 근육주사
- 주의사항
휴약기간 : 소 - 3일, 돼지 - 1일, 우유 - 12시간

항생, 항균제
Product List

엑센트플러스헨탁주 Accent Plus Suspension

양돈전용 장기 지속형 호흡기 질병 치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1mL 중)
결정성세프티오퍼유리산 (Ceftiofur Crystalline Free Acid) ... 100 mg
- 특 장 점
 - 가장 최근에 개발된 제제로 강력한 살균작용 및 광범위한 작용범위를 지닌 신 항균물질
 - 장기 지속형 제제로 약물이 장시간에 걸쳐 방출
 - 치료 혈중 농도에 도달 후 일정시간동안 지속
- 효능 및 효과
 - 세프티오퍼에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
 - 돼지 : *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *P. multocida*, *H. parasuis*, *S. suis* 에 의한 돼지 호흡기질병(SRD)
- 용법 및 용량
 - 돼지 : 가. 체중 20kg 당 1mL(세프티오퍼로서 100mg)를 1일 1회 근육주사 단, 한부위에 2mL 이상 투여하지 말 것.
나. 3~5일 내에 호전되지 않으면 수의사가 다시 진단하도록 한다.
- 주의사항
휴약기간 : 돼지 - 14일

DH 엑센트플러스 DH Accent Plus inj.

짧은 휴약기간, 강력하고 광범위한 치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1g 중)
세프티오퍼 나트륨 (Ceftiofur sodium) 1,000 mg
- 특징점
 - 동물전용 항생제로 빠른 약효를 발휘하며, 교차 내성 발현이 낮은 제품입니다.
 - 동결건조 제형으로 뛰어난 용해성과 사용이 편리합니다.
 - 짧은 휴약기간으로 빠른 출하 및 납유가 가능합니다.

- 효능 및 효과
 - 세프티오퍼에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료

대상동물	효능 및 효과
소	<i>Mannheimia haemolytica</i> , <i>Pasteurella multocida</i> , <i>Haemophilus somnus</i> 에 의한 호흡기 질병 (수송열, 세균성 폐렴)의 치료 <i>Fusobacterium necrophorum</i> , <i>Bacteroides melaninogenicus</i> 의 2가지 주요 병원성 혐기성 균에 의한 급성 기간부관(부제형, 우상피부염)치료
돼지	<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> , <i>Pasteurella multocida</i> , <i>Salmonella choleraesuis</i> , <i>Streptococcus suis</i> 에 의한 호흡기 질병(홍막폐렴, 파스튜렐라성 폐렴, 일반 세균성 폐렴) 치료

대상동물	용법 및 용량
소	본제 1g(역가)을 주사용 증류수 20mL에 용해시켜, 체중 50kg당1mL(세프티오퍼로서 50mg)를 1일 1회 3일간 근육주사 단, 증상이 호전되지 않을 경우 5일까지 투여할 수 있음
돼지	본제 1g(역가)을 주사용 증류수 20mL에 용해시켜, 체중 10kg 당 0.6~1mL(세프티오퍼로서 30~50mg)를 1일 1회 3일간 근육주사

- 주의사항
휴약기간 : 소 - 3일, 돼지 - 1일, 우유 - 12시간

네오플러 300주 Neoflor 300 inj.

안전하고 효과적인 플로르페니콜 주사제

- 원료약품 및 분량 (본제 1mL 중)
플로르페니콜 (Florfenicol) 300 mg
- 특 장 점
 - 돼지의 흉막폐렴(2형, 5형), 파스튜렐라성 폐렴, 마이코플라즈마성 폐렴과 살모넬라, 연쇄상구균에 의한 감염증의 치료까지 각종 세균성 질병에 강력하게 작용합니다.
 - 소의 전염성 각결막염(IBK)의 치료에 특히 효과적입니다.

- 효능 및 효과
 - 소 : 본제에 감수성이 있는 파스튜렐라균, 헤모필루스균(*Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida* 및 *Haemophilus somnus*) 등으로 인한 소 호흡기질환(BRD)의 치료
 - 돼지 : 본제에 감수성이 있는 액티노바실러스균, 마이코플라즈마(*Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae*) 등의 감염증에 대한 치료

- 용법 및 용량
 - 소 : 체중 15kg당 본제 1mL를 목부위에 근육으로 주사하고 처음 투여 48시간 후 동량을 목부위에 근육으로 1회 추가 주사합니다.
 - 돼지 : 체중 10kg당 본제 0.5mL를 목부위에 근육으로 주사하고 처음 투여 48시간 후 동량을 목부위에 근육으로 1회 추가 주사합니다.

- 주의사항
 - 휴약기간 : 소 - 28일, 돼지 - 14일
 - 본제는 30% 고농도 제제이기 때문에 점조도가 있으므로 19개이지 주사침을 사용하여 주십시오. 소에 주사시 주사용량이 10mL가 넘을 경우 2곳으로 나누어 주사하십시오.

마뿔샷 100 Mappul-shot 100

고농도 마보플록사신 항균 치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1mL 중)
마보플록사신 (Marbofloxacin) 100 mg
- 특 장 점
 - 주사 후 혈장에 빠르게 분포하여 신속한 처치가 가능합니다.
 - 짧은 휴약기간으로 비육후기에도 사용가능한 제품입니다.
- 효능 및 효과
 - 마보플록사신에 감수성이 있는 세균에 의한 호흡기 질환의 치료
 - 가. 소 : 파스튜렐라성폐렴(*Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*), 마이코플라즈마성폐렴(*Mycoplasma bovis*), 대장균(*E. coli*)성 급성 유행염
 - 나. 돼지 : 홍막폐렴(*Actinobacillus pleuropneumonia*), 기관지폐렴(*Bordetella bronchiseptica*), 파스튜렐라성폐렴(*Pasteurella multocida*)
- 용법 및 용량
 - 가. 소(근육 또는 피하주사)
 - 호흡기 치료 : 체중 50kg당 본제 1mL의 비율(체중 1kg당 마보플록사신 2mg) 1일 1회, 3~5일
 - 급성 유행염의 치료 : 체중 50kg당 본제 1mL의 비율(체중 1kg당 마보플록사신 2mg)로 1일 1회 3일간.
 - 나. 돼지(근육주사)
 - 돼지 체중 50kg당 본제 1mL의 비율(체중 1kg당 마보플록사신 2mg)로 1일 1회, 3~5일간
- 주의사항
휴약기간 : 소 - 6일, 우유 - 36시간, 돼지 - 4일

항생, 항균제
Product List

암피제트 주 Ampiject

국내최초 암피실린 동결건조 주사제

- 원료약품 및 분량 (본제 1g 중)
암피실린나트륨 (Ampicillin sodium) 1,000 mg (역가)
- 특 장 점
 - 국내 최초의 암피실린 동결건조 주사제입니다.
 - 뛰어난 용해도로 각종 해열제, 소염제, 대사 촉진제 등에도 잘 희석되어 복합 감염증을 편리하게 치료할 수 있는 제품입니다.
 - 농가 사용의 편리함을 위해 동물용 연속주사기에 맞춘 특수 용기로 제작되었습니다.
- 효능 및 효과
 - 암피실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 예방 및 치료
 - 소, 돼지, 말 : 폐렴, 기관지염, 세균성 설사증
- 용법 및 용량
 - 본제 1g 당 주사용수 10mL의 비율로 희석하여 다음의 용량을 1일 1회 내지 2회 근육 또는 정맥 주사한다.
 - 소, 돼지, 말 : 1일 체중 100kg 당 5~10mL(암피실린으로서 500~1,000mg)
 - * 식용 말에는 사용을 금합니다.
- 주의사항
휴약기간 : 소 - 28일(우유 3일), 돼지 - 7일

아모파샷 주 Amopashot

속효성 아목시실린 분말 주사제

- 원료약품 및 분량 (본제 1g 중)
아목시실린나트륨 (Amoxicillin sodium) 1,000 mg(역가)
- 특 장 점
 - 뛰어난 용해도로 각종 해열제, 소염제, 대사 촉진제 등에도 잘 희석되어 복합 감염증을 편리하게 치료할 수 있는 제품입니다.
 - 농가 사용의 편리함을 위해 동물용 연속주사기에 맞춘 특수 용기로 제작되었습니다.
- 효능 및 효과
 - 아목시실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
 - 가. 소, 돼지
 - 그람 양성균 및 *Pasteurella spp.*에 의한 호흡기 감염과 *Enterobacteriaceae*에 의한 소화기 감염의 치료
- 용법 및 용량
 - 가. 본제 1g에 주사용 증류수 9mL를 첨가하여 체중 10kg당 1mL를 1일 1회 3일간 근육주사
 - 나. 증상이 심한 경우 1일 2회 주사(단, 한부위의 1회 최대 주사량이 20mL이상 투여되지 않도록 한다.)
- 주의사항
휴약기간 : 소, 돼지 - 25일

엔로삭신액 Enroxacin Oral

양계 전용 액상 강력 항생 항균제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
엔로플록사신 (Enrofloxacin)..... 100 g
- 특 장 점
 - 항균력이 특히 강력하며 안전성이 높습니다.
 - 빨리 흡수되고 오래 지속된다. : 경구투여시 장에서 다량이 빠르게 흡수됨은 물론 목표장기인 호흡기관, 수란기관 등에 골고루 잘 분포하여 뚜렷한 효과를 발휘합니다.
- 효능 및 효과
 - 엔로플록사신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
 - 닭 : 대장균증(*E.coli*), 마이코플라즈마증(*Mycoplasma gallisepticum*), 살모넬라증(*Salmonella typhimurium*, *Salmonella pullorum*), 전염성 코라이자(*Haemophilus paragallinarum*)
- 용법 및 용량
 - 음수 1L당 엔로플록사신 50mg이 되도록 일일 음수 100L당 본제 50mL의 비율로 희석하여 3일간 경구투여합니다. (살모넬라증은 5일간 투여)

※ 질병 치료시 본제 1일 투여량(1,000수 기준)

주령	1	7	14	21	28	35	42
투여량(mL)	15	30	60	90	120	140	160

<산란계>

주령	1	2	3	4	5	6	7	8~9	10~12	13~16	17
투여량(mL)	15	20	30	40	45	50	55	60	65	70	75
- 주의사항
휴약기간 : 닭 - 12일

엔로삭신 20% 액 Enroxacin 20% Oral

양계 전용 액상 강력 합성 항균제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
엔로플록사신 (Enrofloxacin) 200 g

- 효능 및 효과
 - 엔로플록사신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
 - 닭 : 대장균증(*E.coli*), 마이코플라즈마증(*Mycoplasma gallisepticum*), 살모넬라증(*Salmonella typhimurium*, *Salmonella pullorum*), 전염성 코라이자(*Heaemophilus paragallinarum*)

대상동물	용 법	용 량 및 투 여 기간
닭	경구투여	음수 1L당 enrofloxacin 50mg이 되도록 일일 음수 100L 당 본제 25mL의 비율로 희석하여 3일간 경구투여(살모넬라증에는 5일간 투여)

- 주의사항
휴약기간 : 닭 - 12일

항생, 항균제
Product List

네오플러액 골드 Neoflor oral sol. Gold

양돈용 살모넬라증, 대장균증 치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
플로르페니콜 (Florfenicol)..... 100 g

- 특 장 점
 - 내성세균에도 강력한 항균력을 발휘합니다.
 - 폐조직등 체조직 분포가 우수하며 생체이용률이 높습니다.
 - 재생불량성빈혈 등 부작용이 없는 안전한 제제입니다.
 - 수용액제로 급수기 막힘이 생기지 않습니다.

- 효능 및 효과
 - 닭(산란계 제외) : 대장균증의 치료
 - 돼지 : 흉막폐렴 치료

- 용법 및 용량
 - 닭 : 1일 체중 kg당 0.2mL(플로르페니콜로서 20mg)를 음수에 첨가하여 5일간 경구투여합니다.
 - 돼지 : 1일 체중 10kg당 1mL(플로르페니콜로서 100mg)를 음수에 첨가하여 5일간 경구투여합니다.

- 주의사항
휴약기간 : 닭 - 5일, 돼지 - 16일

네오플러20% 액 Neoflor 20% oral sol

양계용 살모넬라증, 대장균증 치료제

- 원료약품 및 분량** (본제 1L 중)
 플로르페니콜 (Florfenicol) 200 g
- 특 장 점**
 - 내성세균에도 강력한 항균력을 발휘합니다.
 - 폐조직 등 체조직 분포가 우수하며 생체이용률이 높습니다.
 - 재생불량성빈혈 등 부작용이 없는 안전한 제제입니다.
 - 수용액제로 급수기 막힘이 생기지 않습니다.
- 효능 및 효과**
 - 가금 : 살모넬라증 및 대장균증의 치료
 - 돼지 : 흉막폐렴, 파스튜렐라성 폐렴, 마이코플라스마성 폐렴 등 호흡기 질환, 살모넬라증, 연쇄상구균증의 예방 및 치료
- 용법 및 용량**
 - 가금 : 물 1L 당 본제 0.5mL의 비율로 음수에 희석하여 5일간 투여, 또는 체중 kg당 0.1mL(플로르페니콜로서 20mg)을 음수에 첨가하여 5일간 투여
 - 돼지 : 물 1L당 본제 0.5mL의 비율로 음수에 희석하여 5일간 투여, 또는 체중 10kg당 본제 0.5mL(플로르페니콜로서 100mg)을 음수에 첨가하여 5일간 투여
- 주의사항** 휴약기간 : 닭 - 5일, 돼지 - 16일

항생, 항균제
Product List

세파레겐-비유기 연고 Cefalegen

비유기 유방염 전문 치료제

- 원료약품 및 분량** (본제 1시린지(10mL) 중)
 세팔렉신수화물 (Cefalexin Hydrate) 100 mg(역가)
 겐타마이신황산염 (Gentamicin Sulfate) 70 mg(역가)
 덱사메타손포스페이트디나트륨 (Dexamethasone Disodium Phosphate) 1 mg
- 특 장 점**
 - 유방염에 뛰어난 효과를 나타내는 복합 항생제 처방으로 치료효과 상승
 - 휴약기간과 색소방출시간이 같아 납유에 영향을 미치지 않습니다.
 - 소염제 함유로 항염증 효과가 같이 작용합니다.
- 효능 및 효과**
 - 세팔렉신과 겐타마이신에 감수성이 있는 포도상구균속(*Staphylococcus spp.*) 및 연쇄상구균속(*Streptococcus spp.*) 등에 의한 소, 염소, 양 등의 급성 또는 만성 유방염의 치료
- 용법 및 용량**
 - 유방염에 감염된 분방을 따뜻한 물로 세척후 유즙을 완전히 짜낸 다음 아래의 용량을 유두내로 매 12~24시간의 간격으로 3~5일간 주입한다.
 - 소 : 1분방당 1시린지(10mL)
 - 염소, 양 : 1분방당 1/2시린지(5mL)
- 주의사항** 휴약기간 : 4일

시너지트 유방염 연고 Synerject Imm

강력한 젖소 유방염 치료제

- 원료약품 및 분량** (본제 1시린지(5g) 중)

페니실린G프로카인 (Procaine Penicillin G)	100,000 IU
스트렙토마이신황산염 (Streptomycin Sulfate)	100 mg
네오마이신황산염 (Neomycin Sulfate)	100 mg
프레드니솔론 (Prednisolone)	10 mg
- 특 장 점**
 - 페니실린G, 스트렙토마이신, 네오마이신이 복합 처방되어 강력하고 광범위한 항균활성을 갖고 있습니다.
 - 유방염에 따른 염증 치료를 위한 항염증제 첨가로 유방염 치료 효과를 극대화 하였습니다.
- 효능 및 효과**
 - 페니실린G, 스트렙토마이신 네오마이신에 감수성이 있는 세균에 의한 유방염의 치료 가. 유효균종
 - 1) 그람양성균 : *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus epidermis*, *Staphylococcus aureus*
 - 2) 그람음성균 : *Haemophilus spp.*, *Escherichia coli*
- 용법 및 용량** 분방당 1시린지를 1일 1회 주입
- 주의사항** 휴약기간 : 소 - 10일, 우유 - 3일

항생, 항균제
Product List

에코제트 연고 Ecoject ointment

천연 생약 유방염 연고제

- 원료약품 및 분량** (본제 1시린지(10mL) 중)

오레가노 오일 (Oregano oil 10%)	9 mL
---------------------------	------
- 특 장 점**
 - 휴약기간 0일로 잔류 및 내성문제가 없는 천연 생약 유방염 연고
 - 국내 임상실험을 통한 효과검증 완료
 - 특허 출원(10-2015-0020676) 완료
- 효능 및 효과**
 - 황색포도상구균(*Staphylococcus aureus*) 및 대장균(*E.coli*)에 의한 젖소의 유방염 치료
 - 우유 내 체세포 수 감소
- 용법 및 용량**
 - 유방염에 감염된 분방을 따뜻한 물로 세척 후 유즙을 완전히 짜낸 다음, 우두 내로 1분방당 1시린지(10mL)를 1일 2회 3일간 주입한다.
- 주의사항** 휴약기간 : 없음

항콕시듦제 및 구충제

- 항콕시듦제
 - 콕시멸
 - 콕시멸-에스
 - 콕시펜드
 - 카우멘신
 - 카루멘플러스
 - 돼지용 피그콕
 - 송아지용 피그콕
- 파리 구제제
 - 라본믹스
 - 미네라본 부록
- 구충제
 - 대한 뉴멕틴프리믹스
 - 그랜멕틴 펠릿
 - 그랜멕틴 주사
 - 그랜멕틴-에프 주사

콕시멸 Coccimuel

육용계 콕시툼병 예방·치료제

- 원료약품 및 분량** (본제 1L 중)
 설파퀴녹살린나트륨 (Sulfaquinoxaline sodium) 100 g
 트리메토프림 (Trimethoprim) 33.4 g
 살리실산나트륨 (Sodium salicylate) 100 g
 비타민 K3 (Menadione sodium bisulfite) 400 mg
- 특 장 점**
 - 세계최초의 복합상승 처방의 새로운 콕시툼병예방·치료제입니다.
 - 음수투여에 아주 적합한 용해성이 탁월한 “액제”입니다.
 - 국내임상시험에서 탁월한 효능을 인정받은 제품입니다.
 - 콕시툼병 발생시 나타나는 장출혈, 통증 및 발열 등을 효과적으로 치유하는 성분이 처방되어 회복이 신속합니다.
 - 추천용량의 50배를 투여하여도 안전한 제제입니다.
 - 안정성이 뛰어납니다 • 휴약기간이 짧습니다.(7일)
- 효능 및 효과** • 육용계용 콕시툼병의 예방 및 치료
- 용법 및 용량** • 음수 1L당 본제 0.75mL 비율로 희석하여 3일간 연속투여한 다음 2~3일간 일반음수를 급여하고 필요에 따라 음수 1L당 본제 0.75mL 비율로 희석하여 2~3일간 투여합니다.
 ※육계일령별 콕시멸 투여량(1,000수기준 1일투여량)

주령	1	7	14	21	28	35	42
투여량(mL)	50	90	180	250	330	400	450
- 주의사항** 휴약기간 : 7일

항콕시툼제 및 구충제
Product List

콕시멸-에스 Coccimuel-S

양계용 강력 콕시툼증 치료제

- 원료약품 및 분량** (본제 1L 중)
 디클라주릴 (Diclazuril) 5g
- 특 장 점**
 - 효과가 확실한 콕시툼병 치료제입니다.
 - 내성이 거의 없고 투약기간이 짧습니다.
 - 물에 대한 용해성이 우수하여 급수기 막힘이 거의 없습니다.
 - 안전성이 높으며 투여시 부작용이 없습니다.
- 효능 및 효과** 닭(육계)의 *E.tenella*, *E.maxima*, *E.acervulina* 등에 의한 콕시툼증의 치료
- 용법 및 용량** 음수 1L당 본제 0.25~0.5mL(0.05~0.1mL/체중 kg/일) 비율로 희석하여 2일간 연속 투여합니다.
- 주의사항** 휴약기간 : 닭 - 5일

콕시펜드 Coccipend

양계용 강력 콕시듐증 치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
디클라주릴 (Diclazuril) 2g
- 특 장 점
 - 효과가 확실한 콕시듐증 치료제입니다.
 - 내성이 거의 없고 투약기간이 짧습니다.
 - 안전성 및 항콕시듐 예방 효과가 인정되어 사료첨가제로 오랫동안 사용합니다.
- 효능 및 효과 닭(육계)의 *E.tenella*, *E.maxima* 등에 의한 콕시듐증의 예방 및 치료
- 용법 및 용량 사료 톤당 본제 500g을 첨가 급여합니다. (디클라주릴로서 1ppm)
- 주의사항 휴약기간 : 닭 - 5일

카우멘신 Cowmensin

소의 콕시듐증 예방 및 증체율·사료효율 개선

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
모넨신 나트륨 (Monensin Sodium) 800mg
- 특 장 점
 - 휘발성지방산 중 프로피온산 함량 증가를 통해 이산화탄소, 메탄가스 생성 감소
 - 비육우의 성장촉진, 사료효율 개선 증체량 개선
 - 소의 콕시듐증 예방 및 젖소 우유 생산량 증가
- 효능 및 효과

대상동물	용 법	적응증
비육우	비육우의 성장촉진, 사료효율개선, 증체량 개선	-
	소의 콕시듐증 예방	<i>Eimeria bovis</i> , <i>Eimeria zuernii</i>
젖소	우유 생산량(산유량) 증가	-
- 용법 및 용량

대상동물	용 법	용 량 및 투 여 기 간
비육우	경구투여	적당한 장소에 방치하여 소 1두당 1일 100~250g 정도 섭취하게 한다. (모넨신으로서 1두당 1일 80~200mg 섭취)
젖소		
- 주의사항 휴약기간 : 도축 전 소 - 3일(고기)

카루멘플러스 Carumen Plus

최초의 펠렛형 모넨신 첨가제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
모넨신나트륨 (Monensin sodium)30 g (역가)
- 특 장 점
 - 모넨신은 미국 FDA에서 승인한 비육촉진, 콕시듐 예방, 산유량 증가, 사료비 절감효과를 나타내는 원료입니다.
 - 펠렛형 제품으로 급여 용이, 기호성이 우수하며 개별급여를 통해 균등한 급여가 가능합니다.
 - 저온펠릿 공법을 통해 원료역가가 유지될 수 있도록 하였습니다.
- 효능 및 효과
 - 가. *Eimeria bovis*와 *Eimeria zuernii*에 의한 소의 콕시듐증(coccidiosis)예방
 - 나. 소의 사료효율 개선 및 증체량 개선, 성장 촉진
 - 다. 젖소 : 산유량 증가
- 용법 및 용량

본제를 사료에 아래 농도로 혼합하여 경구투여한다.

대상동물	투여 시기	투여용량(g/사료 ton)
고기 소	큰 송아지(번식용), 전기 및 중기(비육용)	183~1,100
젖소	큰 송아지 및 비유기	367~733
- 주의사항

휴약기간 : 소 - 3일

항콕시듐제 및 구충제
Product List

돼지용 피그콕 Pigcoc

자돈 콕시듐병 예방 및 치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
톨트라주릴 (Toltrazuril) 50g
- 특 장 점
 - 단 1회 투여로 돼지 콕시듐병을 예방 및 치료할 수 있습니다.
 - 콕시듐 면역형성을 억제하지 않으며, 투여가 간편한 제품입니다.
- 효능 및 효과

콕시듐 감염에 의한 자돈의 설사 예방 및 치료
- 용법 및 용량

3~7일령의 자돈에 1mL씩 1회 경구투여
- 주의사항

휴약기간 : 자돈 - 70일

송아지용 피그콕 Pigcoc

송아지 콕시듐병 예방 및 치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1 L 중)
톨트라주릴 (Toltrazuril) 50 g
- 특 장 점 1회 주입제 타입(10mL)로 투여가 편리한 송아지 전용 항콕시듐제입니다.
- 효능 및 효과 콕시듐 감염에 의한 송아지의 설사 예방 및 치료
- 용법 및 용량 송아지 (5~6주령) 체중 10kg 당 3mL를 1회 경구투여
- 주의사항 휴약기간 : 송아지 - 70일

라본믹스 Rabon Mix

양돈용 파리유충 구제제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
테트라클로르빈포스 (Tetrachlorvinphos) 45.6 g
- 특 장 점
 - 미국환경보호청(EPA)와 식품의약품국(FDA)에서 승인된 파리유충구제제입니다.
 - 경구투여시 거의 흡수되지 않고 분변내로 배출되며 탁월한 파리유충 구제효과를 보입니다.
 - 내성을 유발하지 않고 고기나 우유에 잔류되지 않는 안전한 제제입니다.
- 효능 및 효과 가축의 분변내에서 파리유충의 살멸
- 용법 및 용량
 - 소 : 체중 100kg당 본제 3.4g을 사료에 첨가하여 급여합니다.
 - 돼지
 - 비육돈 : 사료 톤당 본제 1kg을 균등히 혼합하여 급여합니다.
 - 종 돈 : 사료 톤당 본제 2kg을 균등히 혼합하여 급여합니다.

미네라본 부록 Minerabon Block

미량광물질공급 및 파리유충구제 부록

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)

테트라클로르비포스 (Tetrachlorvinphos)	10.0 g
염화나트륨 (Sodium chloride)	561 g
요오드칼슘 (Calcium iodate)	0.25 g
황산철 (Ferrous sulfate)	6.6 g
황산아연 (Zinc sulfate)	0.3 g
황산망간 (Manganese sulfate)	0.65 g
산화마그네슘 (Magnesium oxide)	6.25 g
황산동 (Cupric sulfate)	0.3 g
황산코발트 (Cobaltous sulfate)	0.3 g
아셀렌산나트륨 (Sodium selenite)	0.1 mg
- 특 장 점**
 - 기존의 미네랄 부록에 파리유충을 살멸시키는 성분을 추가한 기능성 부록입니다. (하절기 미네랄 공급 및 파리발생 억제용 부록)
 - 분변을 통한 파리의 발생을 억제함으로써 근본적으로 파리를 구제합니다.
 - 일반 분무용 살충제와 병용하여 사용하면 더욱 효과적입니다.
 - 미국 FDA 및 EPA 허가품목으로서 가축에게는 해가 전혀 없습니다.
- 효능 및 효과**

파리유충의 구제 및 소, 염소, 양, 사슴 등에 염분 및 무기물(요오드, 철, 아연, 망간, 마그네슘, 동, 코발트, 셀레늄, 나트륨, 칼슘) 등의 보급
- 용법 및 용량**

가축이 할아먹기 쉬운 장소에 설치하여 자유롭게 섭취하게 합니다.

항콕시도메제 및 구충제
Product List

대한 뉴멕틴프리믹스 Daehan Newmectin Premix

내·외부 종합 구충제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)

이버멕틴 (Ivermectin)	6.12 g
-------------------	--------
- 특 장 점**

뛰어난 기호성과 주사 스트레스 완화를 통해 증체를 및 사료효율 개선
- 효능 및 효과**

대상동물	효능 및 효과	적응증
돼지	선충류(Ascaris suum, Ascarops strongylina, Hyostrangy rubidus, Oesophgostomum spp.) 및 돈폐충(Metastrongylus apri), 돈신충(Stephanurus dentatus), 이(Hematopinus suis), 개선충(Sarcoptes scabiei)의 구제	내·외부 기생충 질병 발생 시
- 용법 및 용량**

대상동물	용법	용량 및 투약기간		
		사료섭취량	역개(ppm)	사료 톤당 혼합량
여린돼지(~40kg)	사료혼합 경구투여	50g/kg(체중)	2.0	333g
육성돈(40~100kg)		42g/kg(체중)	2.4	400g
모돈(200kg)		2.0kg/일	10.0	1.67kg
		2.5kg/일	8.0	1.33kg
		3.0kg/일	6.7	1.1kg
웅돈(250kg)		2.5kg/일	10.0	1.67kg
		3.0kg/일	8.3	1.39kg
- 주의사항**
 - 마지막 투약 후 28일이 지난 후 도축, 출하하십시오.
 - 분만 전 28일 이전에는 투약하지 마십시오.

그랜멕틴 펠릿 Granmectin Pellet

내·외부 종합 구충제

■ 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
이버멕틴 (Ivermectin) 6g(역가)

■ 특 장 점 펠릿제형으로 뛰어난 기호성과 주사 스트레스 완화를 통해 증체율 및 사료효율 개선

■ 효능 및 효과

대상동물	효능 및 효과	적응증
소	선충류, 폐충, 쇠가축파리, 이, 진드기, 소음(Sarcoptes scabiei)의 구제	내·외부 기생충 질병 발생 시
돼지	선충류(Ascaris suum, Ascarops strongylin, Hyostrangylus rubidus, Oesophagostomum spp.) 및 돈배충(Metastrongylus apri), 돈선충(Stephanurus dentatus), 이(Hematopinus suis), 개선충(Sarcoptes scabiei)의 구제	

■ 용법 및 용량

가. 소 : 체중 30kg 당 본제 1g(이버멕틴으로서 0.2mg/kg bw)의 비율로 사료에 골고루 혼합하여 7일간 연속하여 경구투여
나. 돼지 : 사료 톤당 다음의 비율로 사료에 혼합하여 경구투여

대상동물	사료섭취량	역가(ppm)	사료 톤당 혼합량
어린돼지(~40kg)	50g/kg	2.0	333g
육성돈(40~100kg)	42g/kg	2.4	400g
	2.0kg	10.0	1.67kg
	2.5kg	8.0	1.33kg
모돈(200kg)	3.0kg	6.7	1.1kg
	2.5kg	10.0	1.67kg
웅돈(250kg)	3.0kg	8.3	1.39kg

■ 주의사항

- 휴약기간 : 소(고기) - 21일, 돼지 - 28일
- 분만 전 28일 이전에는 투약하지 마십시오.

그랜멕틴 주사 Granmectin injection

내·외부 종합 기생충 구제제

■ 원료약품 및 분량 (본제 1mL 중)
이버멕틴 (Ivermectin) 10mg

■ 특 장 점

- 소, 돼지 내·외부 기생충 박멸에 뛰어난 효과를 발휘하는 제품으로 선충류, 폐충류, 선충류 및 외부 기생충까지 한번에 구제할 수 있습니다.
- 연 2회(봄, 가을) 단 한번의 주사로 간편한 구충이 가능합니다.

■ 효능 및 효과

돼지, 소의 내·외부 기생충의 구제

■ 용법 및 용량

가. 돼지 : 체중 33kg당 본제 1mL를 경부(귀 뒤) 피하주사
나. 소 : 체중 50kg당 본제 1mL를 견갑부(어깨 뒤) 피하주사

■ 주의사항

휴약기간 : 소 - 35일, 돼지 - 28일

그랜멕틴-에프 주사 Granmectin-F injection

소 간질충 및 내·외부 종합 구충제

- 원료약품 및 분량 (본제 1mL 중)
 이버멕틴 (Ivermectin) 10 mg
 클로르실론 (Clorsulon) 100 mg
- 특 장 점 • 소 전용 구충제로 간질충까지 한 번에 구제할 수 있는 제품입니다.
- 효능 및 효과 소의 위장관 내 기생하는 선충류, 간질충, 안충, 폐충, 이, 쇠파리, 구더기, 진드기의 구제
- 용법 및 용량 소 체중 50kg 당 본제 1mL를 견갑부(어깨뒤)에 피하주사
- 주의사항 휴약기간 : 소 - 35일

항콕시듬제 및 구충제
Product List

일반치료제

- 대사촉진제
스코피린 주
에너샷
- 해열진통제
아나파 액
아나파 주
테라펜-파워액
슈퍼 아스피린액
아스비타씨
- 철분제
그랩타론 주
- 면역 증가제
이뮤부스터
- 발정억제제
투플-에이

스코피린 주 Spcopyrin Inj.

생식기, 소화기 전문 속효성 해열, 진통, 진경제

- 원료약품 및 분량** (본제 1mL 중)
 브롬화부틸스코폴라민 (Scopolamine butylbromide) 4 mg
 디피론 (Dipyron) 500 mg
- 특 장 점**
 - 분만 후 경련과 고통을 완화시키고 식욕을 촉진시켜주며 자궁이완제로 사용이 가능합니다.
 - 분만 후 처져있는 가축, 여름철 식욕부진 가축의 원기회복을 시켜줍니다.
- 효능 및 효과**

대상동물	효능 및 효과	적응증
소, 송아지	장염 및 소화기 이상에 기인하는 통증의 보조치료	설사, 식도경색, 산통, 기능적 고창증 등
돼지, 개, 고양이		설사, 장염
말		설사, 산통, 복통, 식도경색, 분만 후 산통
- 용법 및 용량**

대상동물	용법	용량	대상동물	용법	용량
소	정맥주사	20~25mL	개	정맥, 근육,	1~2.5mL
송아지		5~10mL	고양이		피하주사
돼지	근육주사	5~10mL			
자돈		1~2mL			
말		20~30mL			
- 주의사항** 휴약기간 : 소, 돼지 - 12일, 우유 - 4일

일반치료제
Product List

에너샷 Enershot

속효성 에너지 생산 및 식욕촉진제

- 원료약품 및 분량** (본제 1mL 중)
 L-카르니틴 (L-Carnitine)..... 300 mg
- 특 장 점**
 - 소의 분만 전, 후 에너지 대사 장애로 인한 간기능 저하와 지방간 예방
 - 간기능 저하로 인해 발생하는 대사장애, 면역기능 장애 등의 질병 예방
 - 고농도 카르니틴 주사제로 빠른 효과 발현
- 효능 및 효과** 소의 식욕회복, 병후 및 수술 후 회복 촉진
- 용법 및 용량**
 - 가. 정맥 내 혹은 근육 내로 주사한다.
 - 나. 치료 첫날 33.3mL를 정맥 내로 주사한다.
 - 다. 효과를 유지하기 위한 요법으로 매일 10mL를 3일간 주사한다.

아나파 액 Anapa liq.

해열, 진통, 소염, 진해 거담 치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
 페닐부타존 (Phenylbutazone) 50g
 브롬헥신염산염 (Bromhexine HCl) 10g
- 특 장 점
 - 페닐부타존에 의한 항염증, 해열, 진통 작용으로 뛰어난 호흡기 질환 보조 치료제
 - 염산브롬헥신의 점해 용해성 거담 작용을 통한 호흡기 질환의 보조 치료제
- 효능 및 효과
 - 돼지 : 폐렴, 기관지염, 비염, 후두염, 편도염 등 염증성 질환의 보조 치료
 - 닭 : 비염, 후두기관염, 기관지폐렴, 폐렴 등 호흡기의 염증성 또는 감염성 질환의 보조치료
- 용법 및 용량
 - 돼지 : 음수 1L당 본제 0.5mL를 혼합하여 7일간 투여
 - 닭 : 음수 1L당 본제 0.5mL를 혼합하여 7일간 투여
- 주의사항
 휴약기간 : 돼지 - 7일, 닭 - 5일

일반치료제

Product List

아나파 주 Anapa Inj.

해열, 진통, 소염 치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1mL 중)
 톨페남산 (Tolfenamic acid) 80mg
- 특 장 점
 - 톨페남산의 해열, 소염작용은 페닐부타존의 10배, 진통작용은 인도메타신의 2배
 - 기존 톨페남산 제품의 2배 농도 제품으로 적은 용량 투여에 따른 주사 스트레스 해소
- 효능 및 효과
 - 해열, 진통, 소염의 목적으로 아래 적응증의 보조약으로 사용한다.
 - 소 : 호흡기 질병 관련 급성 염증 및 급성 유방염 치료 시 보조약
 - 돼지 : 자궁염, 유방염, 유방염증으로 인한 무유증의 치료 시 보조약
- 용법 및 용량

구분	소		돼지	
	투여량	주사 방법	투여량	주사 방법
호흡기 질병	0.5mL/20kg(증상에 따라 48시간 후 추가 접종)	근육주사	0.5mL/20kg	근육주사
유방염	0.5mL/10kg	정맥주사		
- 주의사항
 - 휴약기간 : 돼지 - 14일, 소 - 14일
 - 다른 비스테로이드성 항염제를 24시간 이내 또는 동시에 투여하지 마십시오.

테라펜-파워액 Teraphen-Power

양돈용 고농도 해열·진통제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
아세트아미노펜 (Acetaminophen)..... 500g
- 특 장 점
• 안전한 진통해열제인 아세트아미노펜 고농도 제품으로 각종 질병 시 증상완화 및 치료 효과가 우수합니다.
- 효능 및 효과
돼지 : 해열, 진통(발열, 동통을 동반한 각종 질병 시)
- 용법 및 용량
돼지 체중 10kg 당 본제 0.3~0.6mL을 음수에 희석하여 3~5일간 경구투여

일반치료제
Product List

슈퍼 아스피린액 Super Aspirin

고농도 해열·진통제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
아스피린 (Aspirin) 500g
- 특 장 점
• 고농도 해열, 진통제로 각종 질병으로 인한 발열, 동통에 효과적입니다.
- 효능 및 효과
• 닭, 돼지, 소의 해열 및 진통
- 용법 및 용량
 - 1) 가금 : 체중 1kg 당 본제 0.025mL을 음수에 희석하여 6시간 간격으로 2~3일간 투여
 - 2) 돼지 : 체중 10kg 당 본제 0.2mL을 음수에 희석하여 6시간 간격으로 2~3일간 투여
 - 3) 소 : 체중 10kg 당 본제 0.5~1mL을 음수에 희석하여 6시간 간격으로 2~3일간 투여
 - 4) 군 단위 적용 시 : 음수 1L 당 본제 0.5~1mL을 음수에 혼합하여 투여함.
 - 5) 음수 희석 시 주의사항 : 본 제품은 고농도인 특성상 음수 혼합시 물탱크에 넣기 전 별도의 통에 예비 혼합하면 안되고, 반드시 물탱크에 직접 물을 저어 주면서 서서히 부어 완전히 희석되도록 할 것.
(물탱크에 넣기 전 별도 예비 희석 금지)

아스비타씨 Asvita-C

고농도 해열, 진통 사료첨가제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)
 아세틸살리실산 (Acetylsalicylic acid) 600g
 비타민 C (Vitamin C) 66.6g
- 특 장 점**
 - 항생제와 복합 투여시 항생제 치료효과를 상승시켜줍니다.
 - 빠른 질병회복 및 사료섭취욕구를 촉진시켜줍니다.
- 효능 및 효과** 닭, 돼지, 송아지의 열성, 동통성 질병의 진통, 해열
- 용법 및 용량**
 - 체중 kg 당 1일 본제 0.05~0.0665g를 사료나 음수에 혼합하여 2~3일간 투여
 가. 닭 : 음수 1L당 본제 0.5g 비율로 용해하여 경구투여
 나. 돼지
 - 체중 50kg 미만 : 1일 본제 0.5~3g 경구투여
 - 체중 50kg~150kg : 1일 본제 3~8g 경구투여
 - 체중 150kg 이상 : 1일 본제 8~80g 경구투여
 - 다. 송아지
 - 체중 50kg 미만 : 1일 본제 0.5~3g 경구투여
 - 체중 50~150kg : 1일 본제 3~8g 경구투여

그렙타론 주 Gleptaron inj.

자돈의 철분 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

- 원료약품 및 분량** (본제 1mL 중)
 그렙토페론 (Gleptoferron) 200 mg (Fe 로서)
- 특 장 점** 뛰어난 철분 흡수율로 1회 주사로 충분하며, 원상으로 자돈 철분 걱정을 해결합니다.
- 효능 및 효과**
 - 자돈
 - 철분 결핍성 빈혈의 예방과 치료
- 용법 및 용량**
 - 자돈에 근육주사로 다음과 같이 적용한다.
 - 빈혈 예방 시 출생 후 3일 이내에 마리당 1mL씩 1회 투여
 - 빈혈 치료 시 증상이 나타날 때 마리당 1mL씩 1회 투여
- 주의사항** 이전에 본제에 과민반응이나 쇼크를 일으킨 일 있는 동물에는 사용하지 마십시오.

이문부스터 Immune Booster

백신 접종 후 항체 역가 증가

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
유칼립투스 유 (Eucalyptus oil) 20 mL
- 특 장 점
 - 항체 역가 증가 효과를 가진 천연 유칼립투스는 닭의 백신 접종 후 나타나는 면역력 감소에 따른 성장문제를 해결해 줍니다.
 - 사료효율 개선 및 성장촉진 효과에 뛰어납니다.
- 효능 및 효과
닭 : 성장촉진 및 사료효율 개선, 면역증력 증진 및 백신 접종 후 항체 역가 증가
- 용법 및 용량
 - 닭
 - 성장촉진 및 사료효율 개선 : 음수에 본제를 1,000배 희석하여 투여
 - 면역증력 증진 및 백신 접종 후 항체 역가 증가 : 음수에 본제를 500 ~ 1,000배 희석하여 투여
- 주의사항
휴약기간 : 없음

일반치료제
Product List

투풀-에이 Twopul-A

축우용 발정억제제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
멜렌제스트롤아세테이트 (Melengestrol acetate) 220 mg
- 특 장 점
 - 미국FDA에서 승인한 효능 및 안전성이 입증된 비육촉진제
 - 비육우의 뛰어난 사료효율 및 증체율 개선
 - 최초의 펠릿제형 멜렌제스트롤 첨가제로 특허출원(10-2010-00008604) 완료
- 효능 및 효과
처녀우(heifer)의 발정억제 및 증체율 향상, 사료효율 개선 목적
- 용법 및 용량
처녀우 두당 본제 1.14~2.27g (melengestrol acetate로서 0.25~0.5mg)
- 주의사항
휴약기간 : 소 - 도축 2일전(48시간)

영양제

- 사료첨가용 영양제
 - 네오비타린칼
 - 카우믹스
 - 카우믹스-젖소용
 - 버퍼밀크
 - 셀렌비타-P
 - 슈퍼카우
 - 비타플러스-원샷
- 액상제
 - 비타링크
 - 비타클릭
 - 파워토코-C
 - 파워C-200
 - 파워가바-C
- 부록제
 - 린칼 부록
 - 린칼V 부록
 - 비프 부록
 - 황토미네랄 부록
 - 카우멘신
 - 미네랄 부록
 - 미네라본 부록
 - 송아지 기능성부록
- 생균제 및 효소, 효모제
 - 라바자임
 - 바이오에스비-골드
 - 이뮤ن 디오더
 - 에코 아이지
 - 에코 스태프
 - 루멘닥터
- 기능성 보조사료
 - 디씨에스 682
 - 중조 프리믹스
 - 에너비타-펠렛
 - 파워가바-C
 - 에너팍
 - 밀키스타
 - 저마넷
 - 대한 징크오닌

네오비타린칼 Neovita-Rincal

종합 비타민, 미네랄, 인산칼슘제제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)

비타민 A	180,000 IU
비타민 D3	36,000 IU
인	100 g
칼슘	320 g
나트륨	30 g
칼륨	300 mg
철	3 g
마그네슘	600 mg
망간	60 mg

- 특 장 점**
 - 분말제와 펠렛 제형의 두 가지가 있습니다.
 - 기호성과 이용률이 우수합니다.
 - 인, 칼슘, 비타민 및 미네랄이 균형있게 처방되었습니다.
 - 구루병, 골연증을 비롯한 성장지연, 비유, 번식장애의 손실을 막으며 광물질 결핍에 따른 문제점을 해결해 줍니다.

- 효능 및 효과**

비타민 A 및 비타민 D3와 미네랄(망간, 철, 마그네슘, 칼슘, 인 등)의 보급 및 이로 인한 결핍증의 예방

- 용법 및 용량**
 - 소 사료에 0.4~0.6%의 비율로 균등히 혼합하여 급여합니다.
(사료 1kg당 본제 4~6g의 비율)

영양제

Product List

카우믹스 Cow-Mix

젖소 및 비육우 전문 종합영양제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)

비타민 A	2,500,000 IU	비타민 D3	500,000 IU
비타민 E	1,000 IU	망간	4,000 mg
철	5,600 mg	아연	1,500 mg
구리	375 mg	요오드	140 mg
코발트	100 mg	마그네슘	3,000 mg

- 특 장 점**
 - 펠렛제형으로 섭취가 용이하며 손실이 없습니다.
 - 구루병, 골연증을 비롯한 성장지연, 비유, 번식장애의 손실을 막아주며, 유량 증가, 유지방향상, 이등유개선, 케토시스예방 등의 효과가 있습니다.

- 효능 및 효과**

가축의 성장촉진, 사료효율 개선, 비육 및 비육의 향상, 항병력 증강, 이상유 예방, 산욕마비 및 스트레스 예방, 골연증 예방

- 용법 및 용량**

적응증	투여량
성장촉진 사료효율 개선	송아지, 망아지(0~3개월)6g 임신우(말), 착유우(말)13~23g 비육우 15~25g
배합사료에 첨가시	사료 kg당 본제 2~3g을 혼합투여
항병력 증강, 스트레스예방 질병 및 이상유 예방, 산욕마비 및 골연증 예방	사료 kg당 본제 4~15g을 혼합투여 (평상시 용량의 2~5배)

카우믹스-젖소용 Cow mix-DC

젖소 전문 종합 비타민, 미네랄 영양제

원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)			
비타민 A	2,650,000 IU	비타민 D3	530,000 IU
비타민 E	1,050 IU	황산철	5,600 mg
산화마그네슘	3,000 mg	황산망간	4,000 mg
인산칼슘	80 g	탄산칼슘	256 g
황산구리	375 mg	황산코발트	100 mg
황산아연	1,500 mg	요오드산칼슘	140 mg
염화칼륨	300 mg	염화나트륨	30 g

- 특 장 점**
- 펠릿제형으로 섭취가 용이하며 손실이 없습니다.
 - 특히 받은 수용성 유화제가 첨가되어 우유 중 유지방과 유단백 함량을 높여줍니다.
 - 임신 분만기에 꼭 필요한 영양소를 균형있게 처방하여 산욕마비 및 이상유를 예방합니다.

효능 및 효과 소의 성장촉진, 사료효율개선, 비육 및 비유의 향상, 항병력 증강, 이상유 예방, 산욕마비 및 스트레스 예방, 골연증 예방

용법 및 용량 소 사료에 0.4~0.6%의 비율로 균등히 혼합하여 급여

버퍼밀크 Buffer Milk

종합 비타민, 미네랄, 버퍼제

원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)			
중탄산나트륨	300 g	산화마그네슘	150 g
비타민 A	250,000 IU	비타민 D3	50,000 IU
비타민 E	100 mg	비타민 B1	100 mg
망간	2,700 mg	철	3,000 mg
아연	1,000 mg	구리	270 mg
요오드	50 mg	코발트	5 mg
염화나트륨	10 g		

- 특 장 점**
- 완충효과가 우수한 중조와 산화마그네슘이 이상적으로 복합처방 되었습니다.
 - 중조와 산화마그네슘이 함께 처방되어 중조 단독 첨가로 인한 혈중 마그네슘의 저하를 막아 줍니다.
 - 비육초기에 사용할 때에는 더욱 우수한 유지지방향상, 유량증가의 효과를 가져옵니다.
 - 제1위의 정상적인 pH유지와 미생물균총의 균형을 유지시켜 줍니다.

효능 및 효과

- 소
 - 유지방 및 유량 개선
 - 요결석예방
 - 1위의 산성증 방지, 소화율 향상, 성장촉진, 식욕증진
 - 광물질 공급을 통한 신체조건의 개선

용법 및 용량 성우(500kg기준) : 두당 1일 150~400g을 사료에 혼합하여 투여합니다.

셀렌비타-P Selenvita-P

비타민E와 셀레늄 결핍 예방 및 치료

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)
 비타민 E (Vitamin E) 20,000 IU
 셀레늄이스트 (Selenium yeast) 60 mg
- 특 장 점**
 - 비타민 E와 셀레늄 복합 처방으로 수태율 개선과 산과 질환을 예방 및 치료합니다.
 - 항산화효과에 따른 고급육 생산, 면역 강화효과를 가져다줍니다.
 - 펠릿제형으로 섭취가 용이하며 기호성이 우수합니다.
- 효능 및 효과**

비타민 E와 셀레늄 결핍에 의한 질병의 예방, 성장촉진 및 사료효율 개선, 항병력 증강, 육질개선, 수정율 개선, 조류의 부화율 증진
- 용법 및 용량**

닭, 돼지, 소 사료에 본제 1~4kg을 사료 1톤에 고르게 혼합하여 투여한다.
(셀레늄으로서 0.06~0.24ppm)

영양제

Product List

37

슈퍼카우 Super Cow

축우 전문 종합 비타민, 미네랄 영양제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)

비타민 A 2,500,000 IU	비타민 D3 500,000 IU
비타민 E 1,000 IU	황산망간 4,000 mg
황산철 5,600 mg	요오드산칼슘 140 mg
황산구리 375 mg	황산아연 1,500 mg
황산코발트 100 mg	산화마그네슘 3,000 mg
베타카로틴 100 mg	
- 특 장 점**
 - 축우에 꼭 필요한 비타민, 미네랄이 균형있게 처방되어 있습니다.
 - 성장지연 및 비유기 영양장애를 예방하여 산육마비 및 이상유를 예방하는 효과가 탁월합니다.
 - 비유량 증가 및 사료효율을 개선하여 생산성을 극대화시킵니다.
- 효능 및 효과**

소의 성장촉진, 사료효율의 향상, 비육(유)의 향상, 항병력 증강, 이상유 예방, 임신마비, 스트레스 예방, 골연중 예방, 번식능력 개선, 수정율 향상
- 용법 및 용량**

다음 양을 농후사료에 섞어서 급여한다.

적 용 증	사료 첨가량(율)
성장촉진 사료효율 개선	송아지(0~3개월) 6g 임신우, 착유우 13~23g 비육우 15~25g
배합사료에 첨가시	0.2 ~ 0.3%
항병력 증강, 스트레스 예방, 이상유 예방, 임신마비 골연중 예방, 번식능력개선, 수정율 향상	0.4 ~ 1.5% (평상시 용량의 2~5배)

비타플러스-원샷 Vitaplus-oneshot

한우, 번식우 전문 종합 비타민 영양제

■ 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)

비타민 A	5,000,000 IU 이상
비타민 B1	1,000 mg 이상
비타민 B2	500 mg 이상
비타민 B12	0.6 mg 이상
비타민 D3	1,000,000 IU 이상
비타민 E	7,500 IU 이상
콜린	15,000 mg 이상
나이아신	5,000 mg 이상
라이신	5,000 mg 이상
메치오닌	5,000 mg 이상

- 특 장 점
- 닭, 돼지, 젓소, 한육우, 개가 필요로 하는 비타민과 아미노산이 가장 이상적이고 과학적인 방법으로 조합되어 있습니다.
 - 각종 질병 및 스트레스 예방, 항병력 강화에 영향을 미쳐 생산성 향상에 도움을 줍니다.

- 효능 및 효과
- 가. 닭, 돼지, 젓소, 한육우, 개의 각종 비타민 결핍증 예방 및 간기능 강화 효과에 도움
 나. 닭, 돼지, 젓소, 한육우, 개의 항병력 강화로 폐사율 감소 및 면역력 증가 효과에 도움
 다. 질병 감염시 회복 촉진과 증체를 향상 및 사료효율 개선에 도움
 라. 이등 등과 같은 환경변화 시 스트레스 예방효과에 도움

- 용법 및 용량
- 사료 톤당 본제 1~2kg 혼합 투여

영양제

Product List

비타링크 Vita Link

종합비타민 수용액

■ 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)

비타민 A	4,000,000 IU	비타민 B9	100 mg
비타민 D3	800,000 IU	비타민 B12	1 mg
비타민 E	1,600 mg	d-판테놀	5,000 mg
비타민 C	1,000 mg	니코틴아미드	5,000 mg
비타민 K3	1,000 mg	DL-메치오닌	10,000 mg
비타민 B1	2,000 mg	L-라이신	1,000 mg
비타민 B2	1,000 mg	염화콜린	50,000 mg
비타민 B6	1,000 mg		

- 특 장 점
- 물에 대한 용해도가 뛰어납니다.
 - 비타민의 함량보존력(안정성)이 우수합니다.
 - 경구투여시 소장을 통한 체내 흡수력이 우수합니다.
 - 투여허실이 없이 경제적입니다.

- 효능 및 효과
- 가축, 닭의 건강증진, 산란율 및 사료효율향상

- 용법 및 용량
- 닭 : 음수 또는 사료에 0.04~0.05%(음수 1L 또는 사료 1kg당 본제 0.4~0.5mL)로 혼합하여 투여합니다.
 - 돼지
 - 자돈 : 1일 두당 0.5~1mL - 중돈 : 1일 두당 1~2mL - 성돈 : 1일 두당 2~4mL
 - 소
 - 송아지 : 1일 두당 2~4mL - 젓소 : 1일 두당 10~20mL - 비육우 : 1일 두당 6~10mL

비타클릭 Vita Click

비타민 A D3E 수용액

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
 - 비타민 A (Retinol) 55,000,000 IU
 - 비타민 D3 (Cholecalciferol) 5,000,000 IU
 - 비타민 E (Tocopherol) 20,000 IU
- 특 장 점
 - 물에 대한 용해도가 뛰어납니다.
 - 비타민 함량 보존력(안정성)이 우수합니다.
 - 경구투여시 소장을 통한 체내 흡수력이 우수합니다.
 - 투여허실이 없이 경제적입니다.
- 효능 및 효과

허약 가축의 비타민 공급, 발육 촉진, 수태율 향상, 뇌연화증시 비타민 공급
- 용법 및 용량
 - 닭
 - 가. 5~6주령 - 2,000수당 100mL를 물에 용해하여 2일간 계속 급여합니다.
 - 나. 중 주 - 1,000수당 100mL를 물에 용해하여 2일간 계속 급여합니다.
 - 다. 산 란 계 - 800수당 100mL를 물에 용해하여 2일간 계속 급여합니다.
 - 소, 말 : 200mL
 - 양, 돼지 : 5mL
 - 소동물 : 2~4mL를 1일량으로 물이나 사료에 혼합해 2~3일간 계속 투여합니다.

영양제

Product List

파워토코-C Powertoco-C

비타민 E, C 액상 제제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
 - 비타민 E (Tocopherol acetate) 100,000 IU 이상
 - 비타민 C (Ascorbic acid) 200 g 이상
- 특 장 점
 - 특히 번식기관(생식기관)에 효과가 좋은 복합영양제입니다.
 - 종계, 종돈의 번식장애의 예방 및 수정율 및 부화율을 향상시켜 줍니다.
 - 성장율 향상 및 항병력 증강의 효과도 있습니다.
- 효능 및 효과
 - 가금 : 부화율 및 산란율 향상, 뇌연화증의 완화, 육질개선 및 사료효율 개선
 - 돼지 : 수태율 및 번식능력 향상, 자돈의 조기 이유 및 발육촉진, 육질개선, 사료효율 개선
- 용법 및 용량
 - 돼지 : 체중 50kg 당 본제 2~3mL의 비율로 1일 음수량에 녹여 경구투여
 - 가금 : 1,000수당 본제를 아래 용량만큼 음수량에 균등하게 혼합하여 급여

구 분	효능 및 효과	급 여 량	
육계, 산란계	사료효율개선 및 육질개선	매일 투여시	50mL
		4일 간격	200mL
산란계, 종계	산란율 및 부화율 개선	매일 투여시	50mL
		4일 간격	200mL
육추, 육계	뇌연화증의 완화	10~100mL

파워C-200 Power C-200

비타민 C 공급 및 더위 스트레스 완화제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
비타민 C (Ascorbic acid) 200 g
- 특 장 점
 - 각종 스트레스에 효과가 우수합니다.
 - 여름철 고온 스트레스에 효과가 우수합니다.
- 효능 및 효과
 - 가금 및 돼지 : 비타민 C의 공급, 면역력 강화, 열스트레스 감소, 번식능력 향상 및 산란계의 난각질 개선
- 용법 및 용량
 - 돼지 : 체중 50kg 당 본제 1~2mL의 비율로 1일 음수량에 혼합하여 급여합니다.
 - 가금 : 1,000수당 본제를 아래 용량만큼 1일 음수량에 혼합하여 급여합니다.

주령	1~2	3~4	5~6	7~8	9~10	11~13	14주령 이상
투여량(g)	산란계 8~25mL 육계 8~32mL	16~34mL 22~62mL	22~45mL 37~85mL	27~58mL 53~100mL	32~70mL 65~110mL	38~83mL	45~105mL

파워가바-C Power GABA-C

스트레스 억제 및 면역기능 촉진제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
비타민 C 10 g 이상
- 특 장 점
 - 천연 스트레스 억제제 가바첨가로 이동 및 더위 스트레스를 억제시켜줍니다.
 - 천연물질 사용으로 부작용, 잔류, 내성 문제가 없습니다.
 - 가바가 첨가된 최초의 액상제제 개발로 특허 출원(10-2016-0042737) 완료
- 효능 및 효과
 - 이동 스트레스, 여름철 더위 스트레스 완화, 백신 투여 스트레스 완화, 면역기능 촉진, 밀사로 인한 카니발리즘 완화, 간기능 활성화, 해독작용에 도움
- 용법 및 용량
 - 물 1톤당 본제 500~1,000mL 비율로 희석하여 투여

린칼 부록 Rincal Block

종합비타민, 미네랄, 인산, 칼슘부록

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)

비타민 A 250,000 IU	비타민 D ₃ 50,000 IU
칼슘 150 g	인 100 g
철 5 g	아연 2.5 g
망간 2 g	마그네슘 2 g
나트륨 30 mg	칼륨 300 mg
코발트 6 mg	요오드 6 mg
염화나트륨 380 g	

- 특 장 점**
 - 임신, 분만 및 비유종인 가축에서 가장 부족되기 쉬운 영양분(비타민, 미네랄 등)을 골고루 처방한 발명특허 제4014호의 제품입니다.
 - 기호성이 우수합니다.

- 효능 및 효과**
 - 비유량 증진, 케토시스 및 이등유의 예방·치료
 - 발육부진, 번식장애, 난소 및 자궁의 위축, 수정을 저하, 골연증 등의 예방 및 치료

- 용법 및 용량**

가축이 할아먹기 쉬운 장소에 설치하여 자유롭게 섭취하게 합니다.
(소 1두당 1일 60~100g 정도)

영양제

Product List

린칼 V 부록 Rincal V Block

비타민 AD₃, 미네랄, 인산, 칼슘부록

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)

칼슘 130 g	
인 10 g	
비타민 A 300,000 IU	
비타민 D ₃ 60,000 IU	
철 5,000 mg	
아연 2,500 mg	
망간 2,000 mg	
코발트 6 mg	
마그네슘 2,000 mg	
요오드 6 mg	
칼륨 300 mg	
염화나트륨 적량	

- 특 장 점**

임신, 분만 및 비유종인 가축에서 가장 부족되기 쉬운 영양분(비타민, 미네랄등)을 골고루 처방한 기호성이 우수한 부록입니다.

- 효능 및 효과**

비유량 증진, 케토시스 및 이등유의 예방, 발육부진, 골연화증의 예방, 번식장애, 난소 및 자궁의 위축, 수정을 저하 예방 및 치료

- 용법 및 용량**

적당한 장소에 방치하여 소 1두당 1일 60~100g정도 섭취하게 합니다.

비프 부록 Beef Block

비육우용 염분 · 무기질 · 염화암모늄 공급제

영양제

Product List

42

■ 원료약품 및 분량

(본제 1kg 중)	
소금 (Sodium chloride)	850 g
마그네슘 (Magnesium oxide)	2,000 mg
아연 (Zinc sulfate)	500 mg
망간 (Manganese sulfate)	100 mg
코발트 (Cobaltous sulfate)	20 mg
스테아린산칼슘 (Calcium stearate)	5,000 mg
염화암모늄 (Ammonium chloride)	80 g

■ 특 장 점

- 염분, 무기질 및 염화암모늄이 균형 있게 배합된 영양 보급제로서 가축의 영양을 유지시켜 줍니다.
- 염화암모늄이 처방되어 있어 요석증 예방효과가 뛰어납니다.
- 육질개선효과가 뛰어납니다. (축산연구소에서 2년간 시험)

■ 효능 및 효과

소, 염소, 양, 사슴 등에 염분, 무기물(마그네슘, 아연, 망간, 코발트, 칼슘 및 나트륨) 및 염화암모늄 등의 보급

■ 용법 및 용량

가축이 핥아먹기 쉬운 장소에 설치하여 자유롭게 섭취하게 합니다.

황토미네랄 부록 Hwangto Mineral Block

미량광물질, 황토 및 소금 부록

■ 원료약품 및 분량

(본제 1kg 중)	
비타민 A	1,000,000 IU
비타민 D3	25,000 IU
요오드	150 mg
망간	200 mg
코발트	100 mg
철	2,000 mg
아연	300 mg
구리	300 mg
마그네슘	5 g
칼슘	60.0 g
셀레늄	0.04 mg
규조토	적량
염화나트륨	적량

■ 특 장 점

- 황토의 특장점
 - 장내 가스, 수분 흡착으로 설사 방지 및 장염 예방
 - 장내 사료 통과 시간을 증가시켜 소화율 증진, 재귀발정일 단축

■ 효능 및 효과

말 및 반추가축(소, 염소, 양, 사슴 등)에 염분 및 무기물(칼슘, 인, 마그네슘, 철, 코발트, 요오드, 망간, 아연, 셀레늄)등의 보급, 미량 광물질 부족증 예방

■ 용법 및 용량

가축이 핥아먹기 쉬운 장소에 설치하여 한 마리당 20~80g씩 자유롭게 섭취하게 한다.

카우멘신 Cowmensin

사료효율 개선, 증체율 개선

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
모넨신 나트륨 (Monensin Sodium) 800 mg
- 특 장 점
 - 휘발성지방산 중 프로피온산 함량 증가를 통해 이산화탄소, 메탄가스 생성 감소
 - 비육우의 성장촉진, 사료효율 개선 증체량 개선
 - 소의 콕시듐증 예방 및 젖소 우유 생산량 증가

대상동물	용 법	적응증
비육우	비육우의 성장촉진, 사료효율개선, 증체량 개선	<i>Eimeria bovis</i> , <i>Eimeria zuernii</i>
젖소	소의 콕시듐증 예방	
젖소	우유 생산량(산유량) 증가	

대상동물	용 법	용량 및 투여기간
비육우	경구투여	적당한 장소에 방치하여 소 1두당 1일 100~250g 정도 섭취하게 한다. (모넨신으로서 1두당 1일 80~200mg 섭취)
젖소		

- 주의사항 휴약기간 : 도축 전 소 - 3일(고기)

영양제
Product List

미네랄 부록 Mineral Block

미량광물질 및 소금 부록

■ 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)

요오드	150 mg	망간	200 mg
황	4,000 mg	코발트	100 mg
철	2,000 mg	아연	100 mg
니켈	50 mg	구리	100 mg
마그네슘	3,000 mg	칼슘	2,000 mg
셀레늄	40 µg	염화나트륨	적량

■ 특 장 점

- 한국의 토양과 사료성분을 고려하여 설계된 부록제입니다.
- 타사제품(수입제품)에 비해 각종 미네랄의 함량이 극히 높습니다.
- 기호성이 우수합니다.

■ 효능 및 효과

소에 염분 및 무기물(요오드, 망간, 코발트, 철, 아연, 구리, 마그네슘, 나트륨, 인, 칼슘) 등의 보급

■ 용법 및 용량

가축이 활아먹기 쉬운 장소에 설치하여 일일 1두당 20~80g씩 자유롭게 섭취하게 합니다.

미네라본 부록 Minerabon Block

미량광물질공급 및 파리유충구제 부록

■ 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)

테트라클로르빈포스 (Tetrachlorvinphos)	10.0 g
염화나트륨 (Sodium chloride)	561 g
요오드칼슘 (Calcium iodate)	0.25 g
황산철 (Ferrous sulfate)	6.6 g
황산아연 (Zinc sulfate)	0.3 g
황산망간 (Manganese sulfate)	0.65 g
산화마그네슘 (Magnesium oxide)	6.25 g
황산동 (Cupric sulfate)	0.3 g
황산코발트 (Cobaltous sulfate)	0.3 g
아셀렌산나트륨 (Sodium selenite)	적량

■ 특 장 점

- 기존의 미네랄 부록에 파리유충을 살멸시키는 성분을 추가한 기능성 부록입니다. (하절기 미네랄 공급 및 파리발생 억제용 부록)
- 분변을 통한 파리의 발생을 억제함으로써 근본적으로 파리를 구제합니다.
- 일반 분무용 살충제와 병용하여 사용하면 더욱 효과적입니다.
- 미국 FDA 및 EPA 허가품목으로서 가축에게는 해가 전혀 없습니다.

■ 효능 및 효과

파리유충의 구제 및 소, 염소, 양, 사슴 등에 염분 및 무기물(요오드, 철, 아연, 망간, 마그네슘, 동, 코발트, 셀레늄, 나트륨, 칼슘) 등의 보급

■ 용법 및 용량

가축이 활아먹기 쉬운 장소에 설치하여 자유롭게 섭취하게 합니다.

송아지 기능성부록

송아지 옹모발달 촉진 영양제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)
 바실러스 서브틸리스 (*Bacillus subtilis*)..... 1.0X10⁹ CFU 이상
 클로스트리디움 부티리쿰 (*Clostridium bytyricum*) ... 1.0X10⁹ CFU 이상
 비타민 A 30,000 IU 이상
 비타민 D₃..... 6,000 IU 이상
- 특 장 점**
 - 루멘컬처 함유로 미생물의 성장을 극대화 시켜 송아지 반추위 발달에 특화된 제품입니다.
 - 블록제형으로 급여가 편리합니다.
- 효능 및 효과**
 - 가. 이유 및 거세 스트레스 예방에 도움
 - 나. 수송 스트레스 예방 및 뉘은 변에 도움
 - 다. 어린송아지 반추위 옹모 발달촉진에 도움
 - 라. 면역기능 촉진에 도움
 - 마. 사료효율 및 증체량 향상에 도움
- 용법 및 용량** 송아지 생후 2개월부터 본제를 자유로이 핥아 먹게 급여

영양제

Product List

라바자임 Labazyme

복합 생균효소제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)
 락토바실러스 에시도필루스 (*Lactobacillus acidophilus*)..... 2.75×10¹⁰ CFU 이상
 스트렙토코카스 페시움 (*Streptococcus faecium*).....8.25×10¹⁰ CFU 이상
 바실러스 서브틸리스 (*Bacillus subtilis*) 1.1×10¹⁰ CFU 이상
 프로테아제 (Protease)..... 2,750 CSU 이상
 아밀라제 (Amylase) 5,500 SLU 이상
 셀룰라제 (Cellulase) 27.5 FPU 이상
- 특 장 점**
 - 가축의 장내세균총을 바르게 확립시켜 성장촉진, 사료효율개선 및 설사 방지의 효과가 뛰어납니다.
 - 유산균, 고초균 등의 생균은 유해병원성균(살모넬라균, 대장균 등)을 경쟁적으로 배제하므로 유해세균의 집락형성을 억제합니다.
 - 우수한 유산균 3종에 소화효소까지 함유되어 있으므로 성장촉진 및 설사 예방 효과가 뛰어납니다.
- 효능 및 효과**
 - 송아지, 돼지, 가금에 있어서
 - 1) 설사의 예방 및 치료
 - 2) 발육촉진, 체중증가
 - 3) 장내 병원성 세균의 발육 억제
 - 4) 항생제 내성 병원균의 발육 억제
 - 5) 가축 분변 내 악취 제거
- 용법 및 용량**
 - 아래 용량을 사료에 골고루 혼합하여 투여합니다.
 - 젓소 및 비육우 : 사료 톤당 2kg
 - 돼 지 : 사료 톤당 2kg
 - 닭 : 사료 톤당 0.5kg

바이오에스비-골드 BioSB-Gold

고농축 복합 활성효모 · 생균제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
 활성효모균 (Saccharomyces cerevisiae) 3.0×10¹¹ CFU 이상
 바실루스 서브틸리스 (Bacillus subtilis) 4.0×10⁹ CFU 이상
 효모 배양물 (Biomass Metabolites) 적량

- 특 장 점
 - 기존의 이스트컬취에 생균(Bacillus subtilis)이 다량 함유된 복합 생균, 이스트컬취입니다.
 - 일반영양소(단백질, 지방, 비타민군, 아미노산류 등)외에도 미지성장인자(UGF)라는 물질이 함유되어 있어 가축의 성장촉진 효과가 우수합니다.
 - 가축의 장내 암모니아가스의 생성을 억제시켜 분변상태를 개선시키고 악취를 감소시켜 사육환경을 개선시켜 줍니다. 사료첨가시 사료의 기호성을 높여줍니다.

■ 효능 및 효과

대상동물	성장시기별	효능 및 효과
가 금	병아리, 산란계, 육계	성장촉진, 산란율 증가, 가축 분변 내 악취제거
돼 지	자돈, 육성돈, 비육돈, 모돈	성장촉진, 소화촉진, 육성을 향상, 가축 분변 내 악취제거
소	송아지, 비육우, 착유우	성장촉진, 우질 및 육질개선, 사료효율 개선, 유량증가, 설사예방, 가축 분변 내 악취제거

■ 용법 및 용량

축 종	구 분	사료톤당 첨가량	축 종	구 분	사료톤당 첨가량
젖 소	송아지	1~2kg	비육우	송아지	1~2kg
	건우기	1kg		육성우	1kg
	비유기	1kg		성 우	1kg
돼 지	자 돈	1~2kg	닭	육 계	1kg
	육성, 비육돈	1~2kg		산란계	1~2kg
	모돈, 중돈	1kg			

이문 디오더 Immune Deodor

IgY 항체 함유 면역 증강제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
 바실루스 서브틸리스 (Bacillus subtilis) 10,000,000,000 CFU
 아스코르브산 (Ascorbic acid) 100 g
 난황분말 (Yolk Powder) 적량

- 특 장 점
 - 특수원료인 난황항체(IgY)가 첨가되어 면역 증강 및 장기능 개선에 뛰어난 효과를 발휘합니다.
 - 난황항체, 생균 및 비타민 C의 복합첨가로 효과를 극대화 시켰습니다.

- 효능 및 효과
 - 소, 돼지, 닭 : 면역증강, 장기능 개선, 정장작용, 분변의 악취감소, 고온스트레스 예방

- 용법 및 용량
 - 사료 톤당 본제 1~2kg을 혼합하여 급여

에코 아이지 Eco-Ig

IgY 항체 함유 설사 예방 및 치료제

- 원료약품 및 분량** (본제 10g 중)
 바실러스 서브틸리스 (Bacillus subtilis) 10,000,000 CFU
 아스코르브산 (Ascorbic acid) 10 mg
 비타민 B₆ (Pyridoxine hydrochloride) 10 mg
 난황분 (Yolk Powder) 적량
 프락토올리고당 (Fructo-oligosaccharide) 적량
- 특 장 점**
 - 짜먹이는 면역증강제로 투여가 편리합니다.
 - 설사원인체에 대한 특이난황항체(IgY) 함유로 설사방지에 탁월한 제품입니다.
 - 프락토올리고당 첨가로 유익균 증식에 효과적입니다.
- 효능 및 효과**
 - 송아지, 염소 : 면역기능 촉진, 장내 유익균 증식, 장기능 개선, 정상작용, 질병 발생시 영양공급
- 용법 및 용량**
 - 가. 출생 직후
 - 송아지 : 출생 직후 24시간 이내에 10g~15g(1시린지)을 1회 급여
 - 염 소 : 출생 직후 24시간 이내에 2g~3g을 1회 급여
 - 나. 장기능 개선 및 정상 작용에 이용 시
 - 송아지 : 1회 10g~15g(1시린지)을 2~3일간 급여
 - 염 소 : 1회 2g~5g을 2~3일간 급여

영양제
Product List

에코 스탱 Eco-Stop

IgY 항체 함유 면역 증강제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)
 바실러스 서브틸리스 (Bacillus subtilis) 1,000,000,000 CFU
 아스코르브산 (Ascorbic acid) 10 g
 난황분 (Yolk Powder) 적량
- 특 장 점**
 - 특수원료인 난황항체(IgY)가 첨가되어 면역 증강 및 장기능 개선에 뛰어난 효과를 발휘합니다.
 - 난황항체, 생균 및 비타민 C의 복합첨가로 효과를 극대화 시켰습니다.
- 효능 및 효과**
 - 송아지, 성우, 자돈, 양 : 면역 기능 촉진, 장기능 개선, 정상작용, 비타민 C 공급
- 용법 및 용량**
 - 대상 가족의 1일 투여량을 물이나 대용유에 타서 2~3일간 급여

대상축종		1일 투여량
소	송아지	25g
	성우	50g
자돈		10g
양		10g

루멘닥터 Rumen Doctor

고농도 루멘컬취(50%이상) 함유 복합생균제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)

루멘컬취	50 % 이상
바실러스균 (B. subtilis)	1.0×10 ⁷ cfu/g 이상
클로스트리듐균 (Cl. butyricum)	1.0×10 ⁷ cfu/g 이상
키토산	1.0 % 이상
발효배양물	적량
- 효능 및 효과**
 - 강력한 반추위활성 및 정장에 의한 식체, 소화불량 개선
 - 식욕부진, 분만우 제1위 무력증 개선
 - 연변, 설사, 송아지 설사의 개선
- 용법 및 용량**
 - 성 우 : 두당 1일 20~100g을 3~5일간 급여합니다.
 - 송아지 : 두당 1일 5~10g을 3~5일간 급여합니다.

디씨에스 682 DCS 682

방선균에서 유래한 천연 항생제 대체제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)

효모배양물 (사카로미세스 세르비시에)	3.0×10 ⁹ CFU 이상
비타민 B ₁	100 mg 이상
사카린나트륨	0.44 g 이상
CS 682	적량
- 특 장 점**
 - 방선균에 유래한 천연 화합물로서 포도상구균(슈퍼박테리아)에 탁월한 항균력을 가지고 있는 진정한 항생제 대체제입니다.
 - 자돈 및 육계 투여시 사료효율을 약 10% 이상 개선시키는 효과가 있습니다.
 - 면역력 증가 및 항염증 작용도 가지고 있습니다.
- 효능 및 효과**
 - 성장율 향상, 사료효율 개선 및 항병력 증강
 - 활성 효모균에 의한 면역증가 효과 및 환경 개선제로 사용이 가능합니다.
- 용법 및 용량**

사료 톤당 본제 1kg의 비율로 잘 혼합하여 투여합니다.

중조 프리믹스

중조, 마그네슘, 비타민 종합 처방제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)

비타민 A	75,000 IU 이상
비타민 D ₃	15,000 IU 이상
비타민 B ₁	50 mg 이상
비타민 E	50 mg 이상
중조	300 g 이상
산화마그네슘	150 g 이상

- 특 장 점**
 - 완충효과가 뛰어난 중조와 산화마그네슘이 혼합되어 중조 단독 첨가로 인한 혈중 마그네슘 저하를 막아줍니다.

- 효능 및 효과**
 - 가. 유지방 및 유량개선에 도움,
 - 나. 요결석 예방 및 제1위 산성증 방지에 도움
 - 다. 소화율향상, 성장촉진, 식욕증진에 도움
 - 라. 비타민 공급

- 용법 및 용량** 성우(500kg 기준) 두당 1일 150~400g을 사료에 혼합하여 투여한다.

영양제

Product List

에너비타-펠릿 Enervita-Pellet

비타민 종합 영양제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)

비타민 A	2,500,000 IU 이상
비타민 D ₃	500,000 IU 이상
비타민 E	1,000 IU 이상
비타민 B ₁	500 mg 이상
비타민 B ₆	200 mg 이상
비타민 B ₁₂	2.5 mg 이상
판토텐산	1,000 mg 이상
엽산	50 mg 이상

- 특 장 점**
 - 가축의 종합 비타민 영양제로 펠릿 제형으로 투여가 간편하며, 기호성이 우수합니다.

- 효능 및 효과**
 - 오리, 닭, 소, 돼지의 각종 비타민, 미네랄 결핍증 예방에 도움
 - 오리, 닭, 소, 돼지의 항병력 강화에 도움을 주어 폐사율 감소 및 면역증강 효과에 도움
 - 질병 감염 시 회복촉진과 증체를 향상 및 사료효율 개선에 도움
 - 이동 등과 같은 환경변화 시 스트레스 예방 효과에 도움

- 용법 및 용량** 사료 톤당 본제 1~2kg 혼합투여

파워가바-C Power GABA-C

스트레스 억제 및 면역기능 촉진제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
비타민 C 10g 이상
- 특 장 점
 - 천연 스트레스 억제제 가바첨가로 이동 및 더위 스트레스를 억제시켜줍니다.
 - 천연물질 사용으로 부작용, 잔류, 내성 문제가 없습니다.
 - 가바가 첨가된 최초의 액상제제 개발로 특허 출원(10-2016-0042737) 완료
- 효능 및 효과
이동 스트레스, 여름철 더위 스트레스 완화, 백신 투여 스트레스 완화, 면역기능 촉진, 밀사로 인한 카니발리즘 완화, 간기능 활성화, 해독작용에 도움
- 용법 및 용량
물 1톤당 본제 500~1,000mL 비율로 희석하여 투여

에너팍 Ener-park

젖소용 유량 증가제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
나이아신 12g 이상
엽화콜린 45g 이상
DL-메치오닌 10g 이상
글리세린 지방산 에스테르 300g 이상
- 특 장 점
 - 케토시스 발생없이 빠르게 에너지를 공급하는 고능력우용 첨가제입니다.
 - 젖소의 비유초기 에너지원인 글리세린 공급으로 신속하게 에너지 보충이 가능하여 확실한 유량 증가효과를 가져다줍니다.
- 효능 및 효과
젖소의 비유초기 빠른 에너지 공급, 케토시스 발생 억제, 유량증가, 소와 돼지의 간기능 개선
- 용법 및 용량
가. 사료 톤당 1~2kg의 비율로 균등히 혼합하여 급여한다.
나. 혹서기에는 사료 톤당 2~3kg의 비율로 권장한다.
다. 두당 1일 25~50g 급여

밀키스타 Milkystar

IgG 함유 송아지용 대용유

- 원료약품 및 분량**
 - 성분등록사항
 - 조단백 20% 이상 조지방..... 10% 이상
 - 칼슘 0.6% 이상 인 0.9% 이하
 - 조섬유 3% 이하 조회분..... 12% 이하
 - 비타민 A 25,000 IU/kg 이상
 - 사용 원료
 - : 탈지(전지)분유, 농축유장단백(WPC), 유장분말, 유당, 영양제, 생균제 등
- 특 장 점**
 - 허약한 송아지한테 추가 영양소 공급이 필요한 경우 등에 섭취시켜 증체 효과와 면역증강효과를 가져다줍니다.
 - 농축유장단백사용으로 유당의 소화 이용률이 탁월합니다.

■ **용법 및 용량** 1두기준, 1회급여량(2회급여권장)을 나타내는 표

일령	대용유 앵그램	물의 앵리터	일령	대용유 앵그램	물의 앵리터
0~7일	초유급여		5~6주	300	2.4
1~2주	200	1.6	7~8주	300	2.4
3~4주	250	2	9~10주	250	2

- 반드시 초유를 급여하고 하루 2~3회 급여(개체 상태에 따라 급여량 조절 필요)
- 위 표는 1두 기준이며 1회 급여량을 나타내며 3분 이상 저어 완전용해 후 급여
- 45°C 온수에 용해 후 식혀서 급여하고 사용 후 간병암소에 밀봉하여 잘 보관한다.
- 생후 10일경부터는 인공유 및 양질의 고품사료(건초)를 소량씩 자유 급여시킨다.

영양제

Product List

저마넷 Germanet

축사 습기 악취 제거 보조제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)
 - 해초추출물 (Marine orgin) 6.6% 이상
 - 미네랄, 식물성추출물, 아로마물질, 유카추출물..... 적량
- 특 장 점**
 - 해초추출물의 강력한 습기 제거 효과에 따른 소화기, 호흡기 질병 발생을 억제합니다.
 - 유카추출물, 에센셜 오일에 의한 면역증가 및 해충 발생을 억제합니다.
- 효능 및 효과**
 - 축사내 강력한 습기 제거, 소화기, 호흡기 질병 발생 억제
 - 모든의 생산성 향상, 파리 및 해충 발생 억제
 - 자돈 체온 유지
- 용법 및 용량**
 - 소 : 젖소, 성우 - 축사내 마리당 300g씩 매주 2~3회 살포
 송아지 - 송아지 1마리당 1일 130g씩 살포
 (㎡당 80g씩 깔짚 위에 매주 2~3회 살포)
 - 돼지: 모돈(경산) - 1일 50g씩 모돈사 바닥, 분만 장소 및 모돈 둔부에 골고루 살포
 모돈(미경산) - 1일 70g씩 돈사 바닥에 골고루 살포
 분만사 - 분만 전 축사 내, 온열 장판위에 골고루 살포
 자돈 - 분만 직 후, 포유시 둔방에 골고루 살포
 - 가금: 닭 - ㎡당 40g씩 1주일에 2회 살포(2~5주간)
 오리 - ㎡당 30~50g씩 매일 살포(1~12주간)
- 주의사항** 동물용이니 사람에게 사용하지 마십시오.

대한 징크오닌 Daehan Zinconine

체세포 감소 및 유질 개선제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
 황산 아연 (Zinck Sulfate) 50 g 이상
- 특 장 점

 - 체세포 감소 효과가 탁월한 아연 중 유기태 아연으로 처방하여 생체내 흡수율을 기존 무기태 아연과 비교하여 월등하게 높여 체세포 감소 및 유질을 개선시켜 줍니다.
 - 유방염 예방 및 번식 성적 향상에도 탁월한 효과를 가지고 있습니다.
- 효능 및 효과

체세포수 감소, 유질 개선, 유방염 증상 개선, 부제병 및 발굽 질환 개선, 영양공급, 성장촉진, 육질 개선 등이 가능합니다.
- 용법 및 용량

사료 톤당 본제 1~2kg의 비율로 잘 혼합하여 투여합니다.

소독제

- 소독제
 킹사이드
 올크린업

킹사이드 Kingcide

차세대 광범위 강력 구제역 소독제

소독제

Product List

- 원료약품 및 분량** (본제 1L 중)
 글루타르알데하이드 (Glutaraldehyde) 150 g
 디메틸코코벤질암모늄염 (Dimethylcocobenzylammonium chloride) 100 g

- 특 장 점**
 - 각종 세균은 물론 바이러스, 곰팡이 등을 살멸시키는 광범위한 소독력을 가지고 있습니다.
 - 강력한 소독력과 높은 침투성이 있습니다.
 - 소독력이 장기간 지속됩니다.

- 효능 및 효과**
 - 본제에 감수성이 있는 병원체의 살멸, 소독
 - 세 균 : 일반세균 (*Salmonella typhymurium*)
 - 바이러스 : 조류인플루엔자바이러스, 뉴캐슬병바이러스, 돼지콜레라바이러스, 구제역바이러스
 - 축사 및 축산 기구의 소독

- 용법 및 용량**
 - 아래 표의 배율로 희석하여 소독한다.
 - 소독 대상이 충분히 젖도록 고르게 살포한다.

소독 대상	권장희석배수					
	대상질병명	일반세균	특정 바이러스			
		<i>Salmonella typhymurium</i>	조류 인플루엔자	뉴캐슬	돼지콜레라	구제역
시험결과	경수(경)	1:220	1:3000	1:2000	1:2500	1:80
	유기물(유)	1:120	1:500	1:300	1:800	
유기물이 적은 소독대상	축사공간, 기구, 일반 차량 등 [일반세균(경) + 특정(경)]	1:220	1:220	1:220	1:220	1:80
유기물이 많은 소독대상	축사바닥, 오물, 사체, 농장차량 및 운반용구 등 [일반세균(유) + 특정(유)]	1:120	1:120	1:120	1:120	

※ 권장희석배수의 표기 : 일반세균(*S. typhymurium*)과 특정세균, 특정바이러스의 경수와 유기물에서의 시험결과를 비교하여 높은 농도를 권장희석배수로 정함.

- 주의사항** 다른 소독제와 섞어 사용하지 마십시오.

올크린업 Allclean-up

삼중염과 NaDCC의 이중 소독효과

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)
 - Triple salt 500 g
 - Malic Acid 150 g
 - Sodium Dichloroisocyanurate 50 g
 - Sodium Hexamethaphosphate 150 g
 - Sulfamic Acid 50 g
 - Sodium Chloride 15 g
 - Amaranth Color 1 g
 - Lemon peel perfume 5 g
 - Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate 적량

- 특 장 점**
 - 각종 세균은 물론 바이러스, 곰팡이 등을 살멸시키는 광범위한 소독력을 가지고 있습니다.

- 효능 및 효과**
 - 본제에 감수성이 있는 병원체의 살멸, 소독
 - 세 균 : 일반세균(*Salmonella typhymurium*)
 - 바이러스 : 조류인플루엔자바이러스, 뉴캐슬병바이러스, 돼지콜레라바이러스, 구제역바이러스, 돼지유행성설사바이러스(PED)
 - 축사 및 축산 기구의 소독

- 용법 및 용량**
 - 아래 표의 비율로 희석하여 소독한다.
 - 소독 대상이 충분히 젖도록 고르게 살포한다.

소독 대상	대상질병명		권장희석배수					
			일반세균	특정 바이러스				
	시험결과	<i>Salmonella typhymurium</i>	조류 인플루엔자	뉴캐슬	돼지콜레라	구제역	돼지유행성 설사(PED)	
	경수(경)	1:2500	1:2000	1:2000	1:2500	1:1300	1:400	
	유기물(유)	1:45	1:250	1:150	1:200		1:150	
유기물이 적은 소독대상	축사공간 및 기구, 일반 차량 등	[일반세균(경) + 특정(경)]	1:2500	1:2000	1:2000	1:2500	1:1300	1:400
유기물이 많은 소독대상	축사바닥, 오물, 사체, 농장차량 및 운반용구 등	[일반세균(유) + 특정(유)]	1:45	1:250	1:150	1:200		1:150

※권장희석배수의 표기 : 일반세균(*S. typhymurium*)과 특정세균, 특정바이러스의 동시에 소독하고자 할 경우 가장 고농도를 권장합니다.

- 주의사항**
 - 다른 소독제와 섞어 사용하지 마십시오.

소독제
Product List

백신

- 유방염 백신
히프라 스타박

히프라 스타박 Startvac

젖소 유방염 백신

- 원료약품 및 분량 (2mL/1두분)

불활화 *Escherichia coli* J5..... >50 RED^{60*}
 Slime Associated Antigenic Complex (SAAC)를 발현하는 불활화
Staphylococcus aureus (CP8) >50 RED^{80**}
 파라핀액 적량
 벤질알코올 외 [부기] 적량
 (*RED⁶⁰ : 60% 토끼에서 유효한 용량, **RED⁸⁰ : 80% 토끼에서 유효한 용량)
- 특 장 점

 - 황색포도상구균, 대장균군, CNS에 의한 유방염 예방 불활화 혼합백신
 - EMA(유럽의약청)에 최초로 등록된 유방염 백신으로 안전성과 효능이 모두 입증되었습니다.
- 효능 및 효과

 - 젖소(경산우 및 미경산우)
 - 재발성 유방염이 있는 젖소군에서 건강한 젖소의 집단면역화를 위해, *S. aureus*, coliforms, coagulase-negative staphylococci(CNS)에 의한 준임상형 및 임상형 유방염의 발생 감소 및 임상증상 완화
 - 완벽한 면역프로그램은 1차 접종 후 약 13일부터 3차 접종 후 약 78일 까지 면역을 유도한다. (분만 후 130일까지)
- 용법 및 용량

아래의 접종 프로그램에 따라 젖소(경산우 및 미경산우) 1두당 2mL를 경부 근육주사한다.

 - 1) 기본접종
 - 1차 접종 : 분만예정일 45일전
 - 2차 접종 : 1차 접종 후 1달(분만예정일 약 10일전)
 - 3차 접종 : 2차 접종 후 2달(분만 후 약 50일)
 - 2) 추가접종
 - 완벽한 면역화를 위해 매 분만 시 기본접종과 동일하게 3회 재접종한다.

백신

Product List

수산용

항생, 항균제, 소독제

구충제

간기능 개선제

영양제 및 생균제

항생, 항균제, 소독제

- 항생, 항균제, 소독제

아쿠아테라

아쿠아테라 50%

아쿠아 아모실린

아쿠아 아모실린 30%

아쿠아-파워콜

아쿠아파워콜액

슈퍼 펜콜액

로얄플로 50

슈퍼네오테라

아쿠아에리스로킹

대한 아쿠아에리설팜

아쿠아암피신

코코샷

이지워시

아쿠아테라 Aquatera

광범위 세균성 질병 예방 · 치료제

■ 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
옥시테트라사이클린염산염 (Oxytetracycline HCl) 240 g(역가)

■ 효능 및 효과
 • 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
 가. 송어(연어과어류) : 아가미부식병(*Flavobacterium columnare*), 비브리오병(*Vibrio anguillarum*), 절창병(*Aeromonas salmonicida*), 궤양병(*Hemophilus piscium*), 세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*), 슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*)
 나. 잉 어 : 비브리오병(*Vibrio anguillarum*), 솔방울병(*Aeromonas hydrophila*)
 다. 방 어 : 류결절증(*Photobacterium damsela subsp. piscicida*)
 라. 메 기 : 세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*), 슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*)
 마. 뱀장어 : 지느러미적병(*Aeromonas punctata*)
 바. 참 돔 : 비브리오병(*Vibrio anguillarum*)

■ 용법 및 용량

1. 경구투여시(사료 혼합)

어종	질병명	본제로서 투약량 (g/어종 10당)	옥시테트라사이클린 염산염 투약량 (g/어종 10당)	투약기간(일)	어종	질병명	본제로서 투약량 (g/물 10당)	옥시테트라사이클린 염산염 투약량 (g/어종 10당)	투약기간(일)	
송어	아가미부식병	345	82.7	10	잉어	비브리오병	42~208	10~50	3~7	
	비브리오병	42~208	10~50	3~7		솔방울병	208~417	50~100	5	
	절창병	230~345	55.1~82.7	10		방어	류결절증	125~292	30~70	5
	궤양병	230~345	55.1~82.7	10		메기	세균성출혈성패혈증	230~345	55.1~82.7	10
	세균성출혈성패혈증	230~345	55.1~82.7	10		슈도모나스병	230~345	55.1~82.7	10	
	슈도모나스병	230~345	55.1~82.7	10		뱀장어	지느러미적병	42~208	10~50	3~7
					참돔	비브리오병	42~208	10~50	3~7	

2. 약욕시

어종	질병명	본제로서 투약량 (g/물 10당)	옥시테트라사이클린염산염 투약량 (g/물 10당)	투약기간(일)
참돔	비브리오병	104	25	30~60

■ 주의사항

휴약기간 : 송어·메기·뱀장어 - 30일 방어·참돔 - 20일(참돔 약욕시 5일) 잉어 - 25일

아쿠아테라 50% Aquatera 50%

광범위 세균성 질병 예방 · 치료제

■ 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
옥시테트라사이클린염산염 (Oxytetracycline HCl) 500 g(역가)

■ 효능 및 효과
 • 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
 가. 송어(연어과어류) : 아가미부식병(*Flavobacterium columnare*), 비브리오병(*Vibrio anguillarum*), 절창병(*Aeromonas salmonicida*), 궤양병(*Hemophilus piscium*), 세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*), 슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*)
 나. 잉 어 : 비브리오병(*Vibrio anguillarum*), 솔방울병(*Aeromonas hydrophila*)
 다. 방 어 : 류결절증(*Photobacterium damsela subsp. piscicida*)
 라. 메 기 : 세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*), 슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*)
 마. 뱀장어 : 지느러미적병(*Aeromonas punctata*)
 바. 참 돔 : 비브리오병(*Vibrio anguillarum*)

■ 용법 및 용량

1. 경구투여시(사료 혼합)

어종	질병명	본제로서 투약량 (g/어종 10당)	옥시테트라사이클린 염산염 투약량 (g/어종 10당)	투약기간(일)	어종	질병명	본제로서 투약량 (g/물 10당)	옥시테트라사이클린 염산염 투약량 (g/어종 10당)	투약기간(일)	
송어	아가미부식병	165	82.7	10	잉어	비브리오병	20~100	10~50	3~7	
	비브리오병	20~100	10~50	3~7		솔방울병	100~200	50~100	5	
	절창병	110~165	55.1~82.7	10		방어	류결절증	60~140	30~70	5
	궤양병	110~165	55.1~82.7	10		메기	세균성출혈성패혈증	110~165	55.1~82.7	10
	세균성출혈성패혈증	110~165	55.1~82.7	10		슈도모나스병	110~165	55.1~82.7	10	
	슈도모나스병	110~165	55.1~82.7	10		뱀장어	지느러미적병	20~100	10~50	3~7
					참돔	비브리오병	20~100	10~50	3~7	

2. 약욕시

어종	질병명	본제로서 투약량 (g/물 10당)	옥시테트라사이클린염산염 투약량 (g/물 10당)	투약기간(일)
참돔	비브리오병	50	25	30~60

■ 주의사항

휴약기간 : 송어·메기·뱀장어 - 30일 방어·참돔 - 20일(참돔 약욕시 5일) 잉어 - 25일

아쿠아 아모실린 Aqua Amocillin

광범위 어류 전용 페니실린계 항생제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
아목시실린수화물 (Amoxicillin Hydrate) 200g (역가)
- 특 장 점
 - 그람 양성 및 그람 음성균에 넓은 광범위 항생제입니다.
 - 유결절증에 탁월한 효과를 가지고 있습니다.
- 효능 및 효과
 - 아목시실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
가. 방어 : 류결절증(*Photobacterium damsela subsp. piscicida*)
- 용법 및 용량
 - 어체중 톤당 본제 100~200g(아목시실린으로서 20~40g)을 사료에 균일하게 혼합하여 1일 1~2회 나누어 4~7일간 경구투여
- 주의사항
 - 휴약기간 : 방어 - 7일

항생, 항균제
Product List

아쿠아 아모실린 30% Aqua Amocillin 30%

광범위 어류 전용 페니실린계 항생제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
아목시실린수화물 (Amoxicillin Hydrate) 300g (역가)
- 특 장 점
 - 그람 양성 및 그람 음성균에 넓은 광범위 항생제입니다.
 - 유결절증에 탁월한 효과를 가지고 있습니다.
- 효능 및 효과
 - 아목시실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
가. 방어 : 류결절증(*Photobacterium damsela subsp. piscicida*)
- 용법 및 용량
 - 어체중 톤당 본제 67~133g(아목시실린으로서 20~40g)을 사료에 균일하게 혼합하여 1일 1~2회 나누어 4~7일간 경구투여
- 주의사항
 - 휴약기간 : 방어 - 7일

아쿠아-파워콜 Aqua-powercol

광범위 합성 항균제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
플로르페니콜 (Florfenicol) 25g
- 특 장 점
 - 독성이 낮으므로 안심할 수 있습니다.
 - 강력하면서도 잔류기간이 짧습니다.
 - 각종 내성균, 복합감염에 대한 작용이 우수합니다.
- 효능 및 효과
 - 아래의 질병 감염 어류의 폐사를 저하
 - 방어, 농어 : 유결절증 및 연쇄구균증
 - 뱀 장 어 : 에드워드병
- 용법 및 용량
어체중 1kg 당 본제 0.4g(플로르페니콜로서 10mg)을 1일량으로 통상 5일간 투여합니다.
- 주의사항
휴약기간 : 방어, 농어 - 5일 / 뱀장어 - 7일

아쿠아 파워콜액 Aqua Powercol Liquid

수산용 세균성 질병 치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
플로르페니콜 (Florfenicol) 100g(역가)
- 특 장 점
 - 광범위 항생제로 어류의 세균성 질병 치료에 탁월한 액상제품입니다.
- 효능 및 효과
 - 플로르페니콜에 감수성이 있는 병원균(에로모나스균, 에드워드균, 파스튜렐라균, 비브리오균, 스트렙토코카스균)에 의한 아래 질병의 치료
 - 방어, 농어 : 연쇄구균증, 유결절증
 - 뱀 장 어 : 에드워드병
 - 연 어 : 절창병, 비브리오병
- 용법 및 용량
어체중 kg 당 본제 0.1mL(플로르페니콜로서 10g)을 사료에 혼합하여 통상 5일간 투여
- 주의사항
휴약기간 : 방어, 농어 - 5일, 뱀장어 - 7일, 연어 - 14일

슈퍼 펜콜액 Super Fencol

수산용 세균성 질병 치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
플로르페니콜 (Florfenicol) 200 g
- 특 장 점
광범위 항생제로 어류의 세균성 질병 치료에 탁월합니다.
- 효능 및 효과
 - 플로르페니콜에 감수성이 있는 병원균(에르모나스균, 에드워드균, 파스튜렐라균, 비브리오균, 스트렙토코커스속균)에 의한 아래 질병의 치료
 - 방 어 : 유결절증 및 연쇄상구균
 - 뱀 장 어 : 에드워드병
 - 송어, 연어 : 절창병, 비브리오병
- 용법 및 용량
 - 어체중 1톤당 50mL(플로르페니콜로서 10g)을 1일량으로 5일간 사료에 혼합 투여한다.
- 주의사항
휴약기간 : 방어 - 5일, 뱀장어 - 7일, 송어·연어 - 14일

항생, 항균제
Product List

로얄플로 50 Royal Flor 50

수산용 세균성 질병 치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
플로르페니콜 (Florfenicol) 50 g
- 특 장 점
광범위 항생제로 어류의 세균성 질병 치료에 탁월합니다.
- 효능 및 효과
 - 플로르페니콜에 감수성이 있는 병원균(에르모나스균, 에드워드균, 파스튜렐라균, 비브리오균, 스트렙토코커스속균)에 의한 다음 질병 예방 및 폐사율 감소
 - 방 어 : 유결절증 및 연쇄상구균
 - 뱀장어 : 에드워드병
 - 연 어 : 절창병, 비브리오병
- 용법 및 용량
 - 어체중 kg 당 본제 0.2g(플로르페니콜로서 10mg)을 1일량으로 사료에 혼합 하여 통상 5일간 투여한다.
- 주의사항
휴약기간 : 방어 - 5일, 뱀장어 - 7일, 연어 - 14일

슈퍼네오테라 Super NeoTera

광범위 세균성 질병 예방·치료제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)
 옥시테트라사이클린염산염 (Oxytetracycline HCl) 200 g
 네오마이신황산염 (Neomycin sulfate) 200 g
- 특 장 점**
 - 옥시테트라사이클린과 네오마이신이 복합 처방되어 광범위하고 강력한 어류의 세균성 질병 치료제입니다.
- 효능 및 효과**
 - 옥시테트라사이클린 및 네오마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
 가. 방어, 참돔 : 비브리오병(*Vibrio anguillarum*),
 연쇄상구균증(*Streptococcus sp.*), 유결절증(*Pasteurella piscicida*),
 아가미부식병(*Flexibacter columnaris*)
 나. 송어 : 아가미부식병(*Flexibacter columnaris*),
 절창병(*Aeromonas salmonicida*), 비브리오병(*Vibrio anguillarum*),
 궤양병(*Haemophilus sp.*)
 다. 뱀장어 : 비브리오병(*Vibrio anguillarum*),
 아가미부식병(*Flexibacter columnaris*),
 지느러미적점병(*Aeromonas hydrophila*),
 적점병(*Pseudomonas anguilliseptica*)
- 용법 및 용량**
 - 1) 경구투여시 : 어체중 톤당 본제 125~185g을 사료에 혼합 또는 흠착시켜 투여
 - 2) 약 욕 시 : 물 1톤당 본제 62.5g을 용해시켜 30~60분간 또는 12.5g을 용해시켜 24~48시간 동안 약욕
- 주의사항**

휴약기간 : 방어, 참돔, 뱀장어, 송어 - 30일

항생, 항균제
Product List

아쿠아에리스로킹 Aqua Erythro-king

어류의 연쇄상 구균증 전문치료제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)
 에리트로마이신티오시아네이트 (Erythromycin thiocyanate) 200 g(역가)
- 특 장 점**
 - 어류의 연쇄상 구균증 및 세균성 질병에 탁월한 효과를 가지고 있습니다.
 - 각종 내성균, 복합감염에 대한 작용이 우수합니다.
- 효능 및 효과**
 - 에리트로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
 - 연어과어류(송어) : 세균성신장병(*Renibacterium salmoninarum*), 연쇄구균증(*Streptococcus sp.*)
 - 방어 : 연쇄구균증(*Lactococcus garvieae*)
- 용법 및 용량**
 - 세균성 신장병 : 어체중 1톤당 본제 200~500g/일(에리트로마이신으로서 40~100g 역가)을 사료에 혼합하여 21일간 경구투여
 - 연쇄구균증 : 어체중 1톤당 본제 125~200g/일(에리트로마이신으로서 25~40g 역가)을 사료에 혼합하여 5일간 경구투여
- 주의사항**

휴약기간 : 연어과어류(송어) - 30일, 방어 - 14일

대한 아쿠아에리설팜 Daehan Aqua Erysulfam

어류의 연쇄상 구균증 복합 전문치료제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
에리트로마이신티오시아네이트 (Erythromycin thiocyanate) ... 180g (역가)
설파디아진나트륨 (Sulfadiazine Sodium) 150g (역가)
트리메토프림 (Trimethorim) 30g
- 특 장 점
 - 어류의 연쇄상 구균증 및 세균성 질병에 탁월한 효과를 가지고 있습니다.
 - 각종 내성균, 복합감염에 대한 작용이 우수합니다.
 - 디아미노피리미딘계 항균제인 트리메토프림과 설파제인 설파디아진나트륨을 1:5의 비율로 혼합된 복합 처방약제로 효과가 뛰어납니다.

- 효능 및 효과 에리트로마이신, 설파디아진, 트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료

대상어류	투여효과 및 예방
방 어	연쇄상구균증(<i>Streptococcus sp.</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>)
넙 치	연쇄상구균증(<i>Streptococcus sp.</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 에드워드병(<i>Edwardsiella tarda</i>)
조피볼락	연쇄상구균증(<i>Streptococcus sp.</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>)
송어 (연어과어류)	세균성신장병(<i>Renibacterium salmoninarum</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus sp.</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 세균성아가미병(<i>Flavobacterium blanchiphilum</i>), 부식병(지느러미부식병, <i>Flavobacterium cloumnare</i>)
뱀장어	기적병(지느러미적병, <i>Aeromonas hydrophila</i>), 부식병(아가미부식병, <i>Flavobacterium cloumnare</i>), 궤양병(<i>Haemophilus sp.</i>), 연쇄상구균증(<i>Streptococcus sp.</i>)
잉어	솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>), 궤양병(<i>Haemophilus sp.</i>)

- 용법 및 용량 어체중 1톤당 본제 62.5~175g/일을 사료에 고르게 혼합하여 5~7일간 경구투여

- 주의사항 휴약기간 : 방어, 넙치, 조피볼락, 송어(연어과어류), 뱀장어, 잉어 - 30일

항생, 항균제
Product List

아쿠아암피신 Aqua Ampicin

광범위 수용성 항생제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
암피실린수화물 (Ampicillin hydrate)..... 100g (역가)
- 특 장 점
 - 많은 어병 원인균인 그람음성 간균에도 강력한 항균력을 발휘합니다.
 - 위산에 안정하여 경구 투여시 높은 체내농도를 유지하여 치료 효과가 우수합니다.
 - 물에 대한 용해성이 뛰어나 사용하기 편리합니다.
- 효능 및 효과 암피실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료
 - 방어 : 류결절증(*Photobacterium damsela subsp. piscicida*)
- 용법 및 용량 일일 어체중 톤당 본제 50~200g(암피실린으로서 5~20g)을 사료에 균일하게 혼합하여 1일 1~2회 5일간 경구투여
- 주의사항 휴약기간 : 방어 - 5일

코코샷 Cocoshot

수산전용 속효성 주사제

- 원료약품 및 분량 (본제 1g 중)
아목시실린 나트륨 (Amoxicillin sodium) 1,000 mg
- 특 장 점
 - 주사제로 약효의 발현이 빠르고, 식욕 저하 병어에 적용시 효율적입니다.
 - 아목시실린은 반합성 페니실린계 항생제로 전세계 어류 양식국가에서 사용중인 안전한 항생제입니다.
- 효능 및 효과
 - 아목시실린에 감수성이 있는 아래 세균성 질병 예방 및 치료
 - 1) 대 상 어 종 : 넙치(Olive flounder)
 - 2) 세균성질병 : 연쇄구균증(*Streptococcus iniae*, *S.parauberis*)
- 용법 및 용량
 - 본제 1g당 주사용수 10mL의 비율로 희석하여 다음의 용량을 1일 1회 등 근육 주사
 - 1) 넙치 : 어체중 kg당 본제 0.4mL(아목시실린으로서 40mg)
- 주의사항
휴약기간 : 넙치 - 20일

이지워시 Easy wash

강력한 수산용 방역 소독제

- 원료약품 및 분량 (본제 1정(20g) 중)
차아염소산칼슘 (Calcium hypochlorite)..... 14g
- 특 장 점
 - 국내최초 차아염소산칼슘 수산용 소독제입니다.
 - 정제로 제조되어 보관이 용이하며, 효력이 오래 유지됩니다.
 - 별도의 과정 없이 수도 호스에 장착하여 바로 소독이 가능합니다.
- 효능 및 효과

가. 본제에 감수성이 있는 병인체의 살멸 및 소독

1) 세 균 : 비브리오(*Vibrio anguillarum*), 연쇄상구균(*Streptococcus iniae*)
2) 바이러스 : RSIV(*Red sea bream iridovirus*),
VHSV(*Viral hemorrhagic septicemia virus*)

나. 건조된 수조, 양식장 건조된 수조, 배관, 뜰채, 그물, 물차 등의 살균 및 소독
- 용법 및 용량

적정 비율대로 물에 희석하여 잘 섞은 뒤 모든 표면과 바닥에 분무한다.

소독 대상		권장희석배수						
		대상질병명	일반세균		특정 세균		특정 바이러스	
			Salmonella typhimurium (일반세균)	Vibrio anguillarum	Streptococcus iniae	RSIV ¹	VHSV ²	
시험결과	경수(경)	1:14,000	1:15,000	1:16,000	1:23,000	1:18,000		
	유기물(유)	1:12,000	1:13,000	1:14,000	1:20,000	1:16,000		
유기물이 적은 소독대상	양어장 공간 및 양어기구, 일반차랑, 운전석 내부, 도로 등 [일반세균(경)+ 특정(경)]	14,000배 (물 280L당 1정)	15,000배 (물 300L당 1정)	16,000배 (물 320L당 1정)	23,000배 (물 460L당 1정)	18,000배 (물 360L당 1정)		
유기물이 많은 소독대상	소독조(발판), 출입구, 양어장바닥, 양어 운반기구 (양어장용, 양어 운송, 분뇨, 사료 등), 발생 주변, 발생지 농장 [일반세균(유)+ 특정(유)]	12,000배 (물 240L당 1정)	13,000배 (물 260L당 1정)	14,000배 (물 280L당 1정)	20,000배 (물 400L당 1정)	16,000배 (물 320L당 1정)		
※단, 일반세균(<i>S.typhimurium</i>)과 특정 세균, 특정 바이러스를 동시에 소독하고자 할 경우 경수조건 (유기물이 적은 소독대상)과 유기물조건(유기물이 많은 소독대상)에서의 시험결과를 비교하여 낮은 희석배수(높은 소독제 농도)의 사용을 권장합니다.								

소독제

Product List

구충제

- 구충제
 - 아쿠아프란텔
 - 슈프란텔액
 - 로알프란텔액
 - 아쿠아하이드
 - 아쿠아 트리클
 - 오션닥터

아쿠아프란텔 Aquaprantel

아가미흡충증에 탁월한 구충제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
프라지퀀텔 (Praziquantel) 500 g
- 특 장 점
 - 타구충제들과의 비교시험결과 고효능, 저독성이 확인된 프라지퀀텔 50%의 고농도 약제입니다.
 - 어류에 치명적인 아가미흡충증, 피부흡충증에 대한 효과가 특히 우수합니다.
 - 약물투여로 인한 스트레스를 해결해줍니다.
 - 타 약제에 내성을 가진 기생충 감염시에도 적합한 제제입니다.
- 효능 및 효과
 - 관상어류(금붕어-유금붕어, 열대어-Astronotus)에 기생하는 기생충(흡충류, 편충류)의 구제
 - 조피볼락(우럭)의 아가미흡충증 치료
- 용법 및 용량
 - 관상어류
 - 경구투여 : 본제 300mg을 사료 100g에 섞어 하루 2번씩 5일간 경구투여 한다.
 - 약 욕 : 본제 40mg을 물 1L에 넣어 녹인 후 2시간동안 약욕한다. 2주후 재약욕 한다.
 - 조피볼락(우럭)
 - 경구투여 : 여체중 kg당 본제 0.2~0.4g을 사료에 혼합하여 2일 간격으로 1~3회 경구투여 한다.
 - 약 욕 : 물 1L당 본제 0.1~0.2g을 잘 용해한 약물에 대상어류를 4분간 약욕시킨다.
- 주의사항
휴약기간 : 조피볼락(우럭) - 10일

구충제

Product List

슈프란텔액 Suprantel

아가미흡충증에 탁월한 액상 구충제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
프라지퀀텔 (Praziquantel)..... 130 g
- 특 장 점
 - 고농도 액상제로 약물투여로 인한 스트레스를 해결해 줍니다.
 - 타 약제에 내성을 가진 기생충 감염시에도 적합한 제제입니다.
 - 어류에 치명적인 아가미흡충증, 피부흡충증에 대한 효과가 특히 우수합니다.
- 효능 및 효과
 - 프라지퀀텔에 감수성이 있는 기생충에 의한 다음 어류 질병의 치료
 - 우럭(조피볼락) : 아가미 흡충증(*Microcotyle sebastis*)
- 용법 및 용량
 - 경구투여 : 여체중 1톤당 본제 700mL~1,500mL를 사료에 혼합하여 2일 간격으로 1~3회 경구투여
 - 약 욕 : 물 1톤당 본제 300mL~700mL를 잘 용해한 약물에 대상어류를 침지하여 4분간 약욕
- 주의사항
휴약기간 : 조피볼락(우럭) - 10일

로얄프란텔액 Royal Prantel

아가미흡충증에 탁월한 액상 구충제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
프라지판텔 (Praziquantel) 100 g
- 특 장 점
 - 타 약제에 내성을 가진 기생충 감염시에도 적합한 제제입니다.
 - 어류에 치명적인 아가미흡충증, 피부흡충증에 대한 효과가 특히 우수합니다.
- 효능 및 효과
 - 프라지판텔에 감수성이 있는 기생충에 의한 다음 어류 질병의 치료
 - 우럭(조피볼락) : 아가미 흡충증(*Microcotyle sebastis*)
- 용법 및 용량
 - 경구투여 : 어체중 kg 당 본제 1~2mL를 사료에 혼합하여 2일 간격으로 1~3회 경구투여
 - 약 욕 : 물 1L당 본제 0.5~1mL를 잘 용해한 약물에 대상어류를 침지하여 4분간 약욕
- 주의사항
휴약기간 : 조피볼락(우럭) - 10일

아쿠아하이드 Aquahide

수산 전문 기생충 구제제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
포르말린 (Formaldehyde 37%) 999 mL
식용색소 황색 4호 1.0 g
- 특 장 점
 - 국립수의과학원에서 연구하고 농림수산검역본부(국립수의과학검역원)에서 허가 받은 수산용 전문 기생충 구제제입니다.
 - 낚치 외부기생충 원충류 및 무지개 송어와 연어 등의 수생균 구제에 탁월합니다.
 - 포르말린에 대한 약제 안전성이 확인되어 정식으로 허가 승인된 제제입니다.
- 효능 및 효과
 - 낚치 : 외부 기생성 원충류(*Ichthyobodo sp.*, *Scuticociliatida*)의 구제
 - 어란(무지개 송어 및 연어) : 수생균(*Saprolegnia spp.*)의 구제
- 용법 및 용량
 - 어류

어 종	약욕시 투여량 (mL/물 1톤)	배출 방법
낚 치	100~200mL, 1시간 (<i>Scuticociliatida</i> 감염의 경우 3~4일간 연속 투여)	처리 용수의 20배 이상 희석하여 배출
 - 어란의 수생균 구제

어 종	약욕시 투여량 (mL/물 1톤)	배출 방법
무지개송어 및 연어	1,000~2,000mL, 15분	처리 용수의 200배 이상 희석하여 배출
- 주의사항
휴약기간 : 100도일(100/수온°C) (예시, 수온이 20°C 일때 휴약기간은 5일)
본제를 처리한 어란은 식용금지

아쿠아 트리클 Aqua Tricle

수산용 외부기생충 전문구제제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
트리클로로폰 (Trichlorfon) 800g
- 특 장 점
 - 어류의 물이, 닳벌레, 아가미, 피부흡충 등의 외부기생충 구제에 효과적입니다.
 - 기생충으로 인한 어류의 폐사율을 감소시킵니다.
- 효능 및 효과
어류의 외부기생충 및 물이, 물벼룩 등의 구제
- 용법 및 용량
 - 연못에서의 치료
 - (1) 잉어, 뱀장어
 - Argulus, Lerneae : 물 2,000~4,000L에 본제 1g을 살포한다.
 - Dactylogyrus, Gyrodactylus, Leaches : 물 1,500~3,000L에 본제 1g을 살포한다.
 - Trichodina : 물 400L에 본제 1g을 살포한다.
 - (2) 잉어
 - Trichodina를 제외한 모든 외부기생충 : 물 4,000L에 본제 1g을 살포한다.
 - 단기간 탱크에서의 치료
 - 잉어의 Argulus, Dactylogyrus 및 Gyrodactylus : 물 1L에 본제 25~30g을 희석한다.
- 주의사항
휴약기간 : 5일

구충제

Product List

오션닥터 Ocean Doctor

수산전용 기생충 구제제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
과산화수소수 (Hydrogen peroxide) 350g
 - 특 장 점
 - 국립수산과학원에서 인정한 수산생물 전용 기생충 구제제입니다.
 - 수산생물 기생성 미생물에 대한 구제효과가 뛰어납니다.
 - 효능 및 효과
넙치 : 스키테카충(Scuticociliatida)의 구제
 - 용법 및 용량
어 종	약욕시 투여량(mL/물 1톤)	배출 기준
넙 치	100~200mL, 1시간
(필요시 3일후 1회 반복투여)	처리 용수의 20배 이상
희석하여 배출
- 주의사항
휴약기간 - 3일

간기능 개선제

- 간기능 개선제
아쿠아글루톤
아쿠아리버토닉
글루비타민헬스 산

아쿠아글루톤 Aqua Gluton

복합 간기능 개선제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
 글루타온 (Glutathione)..... 20g
 DL- 메치오닌 (DL-Methionine)..... 300g
- 특 장 점
 - 양식 어류의 식이성 간장 장애 개선제
 - 글루타치온 2.0% 이상과 아미노산인 메치오닌 30%이상 함유된 복합 간기능 개선제
 - 지방대사장애 예방 및 치료 효과 우수하여 생존률 및 항병력 증가 및 증체를 향상
- 효능 및 효과
 넙치, 방어, 잉어, 향어 등 양식어류의 간기능 개선 및 변패사료에 의한 Ceroid증 예방 및 치료
- 용법 및 용량
 사료 톤당 본제 0.5~1kg을 혼합하여 7일 이상 급여합니다. 또는 어체중 톤당 본제 0.25~1kg을 기준으로 하여 7일 이상 경구투여 합니다.

간기능 개선제
Product List

아쿠아리버토닉 Aqua Livertonic

간세포 상해 방지를 통한 간기능 개선제

- 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
 글루타온 (Glutathione)..... 20g
- 특 장 점
 - 양식 어류의 식이성 간장 장애 개선제
 - 지방대사장애 예방 및 치료 효과 우수하여 생존률 및 항병력 증가 및 증체를 향상
- 효능 및 효과
 넙치, 방어, 잉어, 향어 등 양식어류의 간기능 개선 및 변패사료에 의한 Ceroid증 예방, 항병력 증강
- 용법 및 용량
 어체중 1톤당 본제 0.5~1kg을 기준으로 하여 7일이상 경구투여 한다.

글루비타민헬스 산 Gluvitamin Health

수산전용 간기능 개선 및 종합 영양제

■ 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)

비타민 A (Vitamin A)	1,500,000 IU
비타민 D3 (Cholecalciferol)	300,000 IU
비타민 C (Ascorbic acid)	10,000 mg
비타민 E (Tocopherol acetate)	10,000 mg
판토텐산칼슘 (Calcium pantothenate)	5,000 mg
비타민 B1 (Thiamine hydrochloride)	2,000 mg
비타민 B2 (Riboflavin)	2,000 mg
비타민 B6 (Pyridoxine Hydrochloride)	1,500 mg
비타민 K3 (Menadione)	1,000 mg
폴산 (Folic acid)	1,000 mg
비타민 B12 (Cyanocobalamin)	10 mg
비오틴 (Biotin)	10 mg
니코틴산아미드 (Nicotinamide)	10,000 mg
이노시톨 (Inositol)	10,000 mg
DL-메치오닌 (DL-Methionine)	10,000 mg
L-리신염산염 (L-Lysine hydrochloride)	10,000 mg
산화마그네슘 (Magnesium oxide)	10,000 mg
황산철 (Ferrous sulfate)	10,000 mg
황산망간 (Manganese sulfate)	7,000 mg
황산아연 (Zinc sulfate)	5,000 mg
황산구리 (Cupric sulfate)	1,000 mg
황산코발트 (Cobaltous sulfate)	200 mg
글루타티온 (Glutathione)	200 mg
포도당 (Glucose) 등	적당량

■ 효능 및 효과 어류의 비타민, 아미노산(메치오닌, 리신, 글루타티온), 무기질의 보충, 성장 촉진 및 식욕 증진, 사료효율 개선, 면역력 증가 및 폐사율 감소, 항스트레스 효과

■ 용법 및 용량 사료 톤당 본제 2~5kg 비율로 잘 혼합하여 투여 (EP 사료의 경우 고품사료에 균일하게 흡착시켜 투여)

영양제 및 생균제

- 영양제 및 생균제
 - 수산용바이오-씨
 - 바이오에스비-골드
 - 아쿠아 키올비타
 - 아쿠아 라바자임
 - 아스토코
 - 아쿠아 헬스
 - 파워토코-C
 - 파워C-200

수산용바이오-씨 Bio-C

자연산 식물유로 코팅된 안정화 비타민C

■ 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
아스코르빈산 (Ascorbic acid) 200g

■ 특 장 점
• 어류의 면역기능을 증진시켜 줍니다.
• 소화력을 증진시켜 생산성을 향상시켜 줍니다.
• 유기화합물에 의한 독성을 감소시켜 줍니다.
• 어류의 비타민 C 결핍증의 예방 및 치료

■ 효능 및 효과 물고기, 새우 등 양식어류(넙치, 우럭, 참돔, 줄돔 등)의 비타민 C 결핍증 예방 및 치료, 면역력 증강, 스트레스 감소, 성장 촉진 및 사료효율 개선

■ 용법 및 용량 아래 용량을 사료 1톤에 고르게 혼합하여 투여합니다.

어 종	사료 톤당 제품 투여량	어 종	사료 톤당 제품 투여량
틸라피아(역돔)	0.5 ~ 1.25kg	송 어	0.75 ~ 1.25kg
넙 치	1.25 ~ 2.5kg	뽕장어	0.75 ~ 1.25kg
새 우	0.75 ~ 1.25kg	연 어	0.75 ~ 1.25kg
잉 어	0.75 ~ 1.25kg	메 기	0.75 ~ 1.25kg

바이오에스비-골드 Bio SB-Gold

활성효모 · 생균제

■ 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)
활성효모균 (Saccharomyces cerevisiae) 3.0×10¹¹ CFU 이상
바실루스 서브틸리스 (Bacillus subtilis) 4.0×10⁹ CFU 이상
효모배양물 (Biomass Metabolites) 적량

■ 특 장 점
• 어류의 성장촉진 효과가 뛰어납니다.
• 소화율 향상 및 사료효율개선에 효과적 입니다.
• 미국에서 개발된 효모 추출물을 사용하여 생체 이용률이 높습니다.
• 효모 배양물 첨가로 베타글루칸, 만난올리고당등과 같은 면역 증가 물질을 통해 질병 예방 및 면역력을 증가시켜 줍니다.

■ 효능 및 효과 성장촉진, 소화촉진, 사료효율 개선

■ 용법 및 용량 사료 1톤당 1~5kg 용량을 사료에 균일하게 혼합하여 투여합니다.

아쿠아 키올비타 Aqua chiol vita

수산전용 면역증강제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)

비타민 B1 (Thiamine hydrochloride)	1,000 mg
비타민 B2 (Riboflavin)	500 mg
비타민 B6 (Pyridoxine)	500 mg
비타민 B12 (Cyanocobalamin)	1,000mcg
비타민 B9 (Folic acid)	100 mg
키토올리고당	50 g
포도당	적량

- 특 장 점**
 - 키토올리고당과 비타민 합제로 어류의 면역기능 촉진에 뛰어난 효과를 발휘합니다.
 - 키토올리고당 첨가로 어류의 체내 흡수율을 증가시킵니다.
 - 면역기전 활성화 및 면역세포 부활작용으로 치어의 생존율 및 성장을 촉진시키며, 질병예방에 효과적입니다.

- 효능 및 효과**

비타민 결핍증에 의한 어류의 질병의 예방 및 치료, 면역력 증강, 성장촉진, 스트레스 예방, 사료효율 개선 등

- 용법 및 용량**
 - 사료 톤당 본제 1~4kg을 혼합하여 투여하십시오.
 - 질병 발생시는 증량 투여하십시오.

영양제 및 생균제
Product List

아쿠아 라바자임 Aqua Labazyme

복합 생균 효소제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)

Lactobacillus acidophilus	2.75×10 ¹⁰ CFU
Streptococcus faecium	8.25×10 ¹⁰ CFU
Bacillus subtilis	1.1×10 ¹⁰ CFU
프로테아제 (Protease)	2,750 CSU
아밀라제 (Amylase)	5,500 SLU
셀룰라제 (Cellulase)	27.5 FPU
포도당	적량

- 특 장 점**
 - 생균과 효소를 복합 처방하여 어류의 소화흡수를 촉진과 사료효율 개선에 탁월합니다.
 - 어류의 질병예방 및 면역력을 증강시켜줍니다.
 - 수질환경 개선효과를 가져다줍니다.

- 효능 및 효과**
 - 1) 소화흡수 촉진
 - 2) 사료효율 개선
 - 3) 폐사율 감소

- 용법 및 용량**
 - 양어 : 사료 톤당 본제 0.5~2.5kg을 균등히 혼합하여 투여한다.

아스토코 Astoco

고농도 비타민 C, E 함유 복합생균제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)
 바실러스 서브틸리스 (Bacillus subtilis) 1.0X10⁹ CFU
 아스코르브산 (Ascorbic acid) 200 g
 비타민 E (Tocopherol acetate) 200,000 IU
- 특 장 점**
 - 어류의 면역기능을 증진시켜 줍니다.
 - 생균제 복합 처방되어 소화력을 증진시키며 생산성을 향상시켜 줍니다.
 - 어류의 비타민 C와 비타민 E 결핍증의 예방 및 치료
- 효능 및 효과**
 - 어류의 비타민 C, E 결핍증 예방, 면역력 증강, 스트레스 감소, 장내 정상 미생물총 균형유지, 성장촉진, 증체율 향상
- 용법 및 용량** 일일 어체중 톤당 본제 40~80g을 사료에 첨가하여 투여합니다.

아쿠아 헬스 Aqua Health

수산용 복합 비타민 영양제

- 원료약품 및 분량** (본제 1kg 중)
 비타민 A 2,500,000 IU 이상
 비타민 B2 600 mg 이상
 비타민 B12 880 mg 이상
 비타민 D3 500,000 IU 이상
 비타민 E 1,000 mg 이상
 판토텐산 1,300 mg 이상
 이노시톨 2,000 mg 이상
 콜린 30,000 mg 이상
 나이아신 2,500 mg 이상
 비오틴 30 mg 이상
- 효능 및 효과**
 1. 어류의 각종 비타민 결핍증 예방에 도움
 2. 간 기능 강화 효과에 도움
 3. 어류의 항병력 강화로 폐사율 감소에 도움
 4. 질병 감염시 회복 촉진과 증체율 향상, 사료효율 개선에 도움
 5. 이동 및 수온변화 등과 같은 환경변화시 스트레스 예방 효과에 도움
- 용법 및 용량** 양어용 배합사료나 생사료에 본제 0.3~0.5%(사료톤당 3~5kg) 혼합 투여

파워토코-C Powertoco-C

비타민 C 및 비타민 E 공급제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
비타민 E (Tocopherol acetate) 100,000 IU 이상
비타민 C (Ascorbic acid) 200 g 이상
- 특 장 점
 - 어류의 면역기능을 증진시켜 줍니다.
 - 생균제 복합 처방되어 소화력을 증진시키며 생산성을 향상시켜 줍니다.
 - 어류의 비타민 C와 비타민 E 결핍증의 예방 및 치료
 - 안정화된 비타민 C, E 액상 처방으로 조제되어 사용하기 편리합니다.
 - 성장을 향상 및 항병력 증강의 효과도 있습니다.
- 효능 및 효과
 - 양식어류의 비타민 C, E 결핍의 예방 및 보충
 - 증체율 향상 및 사료효율 개선, 사료 산패 방지에 도움
 - 폐사율 감소 및 항병력 강화에 도움
- 용법 및 용량 사료 톤당 본제 1~5L의 비율로 잘 혼합하여 투여합니다.

영양제 및 생균제
Product List

파워C-200 Power C-200

안정화 비타민 C 공급제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
비타민 C (Ascorbic acid) 200 g 이상
- 특 장 점
 - 어류의 면역기능을 증진시켜 줍니다.
 - 소화력을 증진시켜 생산성을 향상시켜 줍니다.
 - 유기화합물에 의한 독성을 감소시켜 줍니다.
 - 어류의 비타민 C 결핍증의 예방 및 치료
 - 안정화된 비타민 C를 액상화하여 사용하기 편리합니다.
- 효능 및 효과
 - 양식어류의 비타민 C 공급
 - 수정율 및 부화율 향상에 도움
 - 증체율 및 사료효율 개선에 도움
 - 스트레스 감소 및 항병력 증가에 도움
- 용법 및 용량 사료 톤당 본제 0.5~1.5L의 비율로 잘 혼합하여 투여합니다.

양봉용

애완동물용

양봉용

- 양봉용
응애킬
대한 안티섹
비타킹비-액
쿠마킹 액

응애킬 Eung Ae kill

꿀벌 응애 구제제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
 시트르산수화물 (Citric acid Hydrate) 17g
 프로폴리스 (Propolis) 2.5g
 백당 242g
- 효능 및 효과 꿀벌 응애(*Varroa sp*) 방지 및 구충
- 용법 및 용량
 - 사용 전에 본제를 따뜻하게(약 25~30℃)하여 잘 흔들어 준 후 투여
 - 외부 기온이 12℃ 이상이고, 벌들이 활동할 때는 모든 벌 무리가 귀소한 후 저녁 무렵에 투여
 - 외부 기온이 12℃ 이상이고, 벌들이 활동하지 않는 시기에는 따뜻한 시간대에 투여
 - 소비와 소비 사이에 벌이 많이 모여 있는 벌 무리 위쪽에 약액을 흘리는 방식으로 투여

대상동물	용량 및 투약 기간	
	사용시기	사용량 (소비 1매당 본제 1mL를 기준으로 투여)
꿀벌	산란기	6~7일 간격으로 한번씩 연속 4회 투여
	비 산란기	1회 투여

- 주의사항 휴약기간 : 없음

대한 안티섹 Antisec

꿀벌 석고병, 응애 구제제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
 티몰 (Thymol) 21g
- 특 장 점
 - 꿀벌 석고병(Chalk Brood)의 예방 치료 • 꿀벌 진드기(*Varroa*) 확산 방지
- 효능 및 효과
 - 사용약액 조제 방법
 - 사용약액을 조제하기 직전에 원액(본제)을 잘 흔들어 준다.
 - 50% 설탕 시럽 조제 : 설탕과 물을 1:1로 혼합하여 만든다.
 - 사용약액 조제 : 본제와 50% 설탕 시럽을 아래와 같은 비율로 혼합하여 사용약액을 만든다.

구분	조 제 방 법		사용약액	투여방법
	원액(본제)	50% 설탕시럽		
예방용(1%)	10mL	990mL	1,000mL	사양방식
치료용(2%)	20mL	980mL	1,000mL	사양방식
치료용(5%)	50mL	950mL	1,000mL	분무 및 흘림

- 용법 및 용량
 - 예방을 목적으로 할 때에는 예방용(1%) 사용약액을 1회에 소비 1매당 50mL 씩을 사양방식으로 매일 또는 격일제로 10회 투여
 - 치료를 목적으로 할 때에는 치료용(2%) 사용약액을 1회에 소비 1매당 50mL 씩을 사양방식으로 매일 또는 격일제로 10회 투여
 - 유밀기에는 약액을 벌들이 잘 먹지 아니하므로 치료용(5%) 사용약액을 1회에 소비 1매당 5mL 씩을 분무나 흘림방식으로 매일 또는 격일제로 10회 투여
- 주의사항 본제는 항생제를 대체하는 약제이므로 항생제와 함께 사용하지 마십시오.

비타킹비-액 Vitaking Bee-Liquid

양봉용 종합 비타민 영양제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
 - 비타민 C 300 mg 이상
 - 비타민 E 100 mg 이상
- 특 장 점
 - 육아기, 번식기에 필요한 비타민 제제가 함유되어 있는 제품입니다.
 - 사양액에 혼합 희석이 가능할 뿐만아니라 화분에 혼합이 편리한 액상제품입니다.
- 효능 및 효과
 - 비타민 결핍에 의한 벌의 영양보충, 산란촉진에 도움
 - 항병력 강화, 면역력 증가효과, 활력증진에 도움
- 용법 및 용량
 - 사양액 1L(시럽)에 10~20mL를 혼합하여 투여한다.
 - 화분 1kg에 본제 10~20mL를 혼합하여 투여한다.

양봉용

Product List

쿠마킹 액 Coumaking

꿀벌 응애 구제제

- 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)
 - 쿠마포스 (Coumaphos)32g
- 특 장 점
 - 양봉농가의 치명적 피해를 입히는 외래해충 ‘작은벌집딱정벌레’ 구제에 효과적입니다.
- 효능 및 효과
 - 꿀벌의 응애 구제
- 용법 및 용량
 - 가. 희석 농도 : 본제 1mL당 물 50mL비율 (본제 : 물 = 1 : 50)
 - 나. 사용 시기 : 이른 봄(산란개시 전까지) 및 가을철(월동전) 꿀벌 유충의 수가 적을 때 투약한다.
 - 다. 사용방법
 - 벌통 1통(소비 12매)당 본제 희석액 50mL를 각 소비 사이(소비 상단 측면)에 골고루 점적하여 준다.
 - 24시간 후 죽은 진드기가 바닥으로 떨어진지의 여부를 확인하고 생존이 확인될 경우, 일주일 후 다시 한 번 투약을 실시한다.
 - 2개 이상의 벌통인 경우에는 각 벌통당 희석액 50mL를 투약한다.
 - 소규모 벌통(소비가 6매 이하인 경우)에는 본제 희석액 25mL를 투약한다.
- 주의사항
 - 휴약기간 : 6주(42일)

애완동물용

- 애완동물용
프라벤-엘
프라벤-에스
하트필락스

프라벤-엘 Praben-L

애완용 광범위 구충제

- 원료약품 및 분량** (본제 1정 중)
 플루벤다졸 (Flubenazole)..... 240 mg
 프라지관텔 (Praziquantel) 40 mg
 비타민 A (Vitamin A)..... 4,000 IU
- 특 장 점**
 - 종합 광범위 구충제로서 각종 내부 기생충에 대한 구충 효과가 탁월합니다.
 - 독성이 없어 안전합니다.
 - 유충 및 충란 사멸 효과가 뛰어납니다.
- 효능 및 효과**
 - 개 : 회충, 십이지장충, 편충, 촌충의 구제
 - 고양이 : 회충, 촌충의 구제
- 용법 및 용량**
 - 개의 회충, 십이지장충, 편충, 촌충의 구제, 고양이의 회충, 촌충의 구제를 위해 체중 4kg 이상의 동물에 체중에 따라 아래와 같이 1일 1회 1~2일간 경구투여한다.

체중 (kg)	4kg ~ 8kg	8kg ~ 10kg	10kg 이상
투여정수	1정	2정	체중 5kg당 1정 비율로 투여
- 주의사항**
 - 수의사(약사)의 지시나 처방에 따라 사용할 것
 - 4주령 미만의 강아지나 6주령 미만의 고양이에는 투여하지 말 것

애완동물용
Product List

프라벤-에스 Praben-S

애완용 광범위 구충제

- 원료약품 및 분량** (본제 1정 중)
 플루벤다졸 (Flubenazole)..... 160 mg
 프라지관텔 (Praziquantel).....30 mg
 비타민 A (Vitamin A)1,600 IU
- 특 장 점**
 - 종합 광범위 구충제로서 각종 내부 기생충에 대한 구충 효과가 탁월합니다.
 - 독성이 없어 안전합니다.
 - 유충 및 충란 사멸 효과가 뛰어납니다.
- 효능 및 효과**
 - 개 : 회충, 십이지장충, 편충, 촌충의 구제
 - 고양이 : 회충, 촌충의 구제
- 용법 및 용량**
 - 개의 회충, 십이지장충, 편충, 촌충의 구제, 고양이의 회충, 촌충의 구제를 위해 체중 4kg 미만의 동물에 체중에 따라 아래와 같이 1일 1회 1~2일간 경구투여한다.

체중 (kg)	2kg 미만	2kg 이상~4kg 미만
투여정수	1/2정	1정
- 주의사항**
 - 수의사(약사)의 지시나 처방에 따라 사용할 것
 - 4주령 미만의 강아지나 6주령 미만의 고양이에는 투여하지 말 것

하트 필락스 Heart phylax

심장사상충 및 회충 구제제

■ 원료약품 및 분량

(본제 1정 중)

1) 등황색

이버멕틴 (Ivermectin) 0.068 mg

피란텔파모산 (Pyrantel pamoate) 57 mg

2) 연분홍색 또는 분홍색

이버멕틴 (Ivermectin) 0.136 mg

피란텔파모산 (Pyrantel pamoate) 114 mg

■ 특 장 점

• 이버멕틴과 피란텔파모산의 복합처방으로 개 심장사상충 예방 및 개구충, 개회충 근절에 탁월한 효과를 나타내는 제품입니다.

■ 효능 및 효과

• 개 심장사상충의 예방, 개구충, 개회충의 구충

■ 용법 및 용량

• 개 체중 kg 당 ivermectin 6.0mcg 및 pyrantel 5mg의 용량을 30일 간격으로 1개월에 1정씩 1년에 12번 투여한다.

개체중	용량(Tablet)	이버멕틴 함량	피란텔 함량	투여간격	정제의 색
~1kg	1	68mcg	57mg	1개월	등황색
12~22kg	1	136mcg	114mg	1개월	연분홍색 또는 분홍색

■ 주의사항

• 6주령 이상의 개에만 사용하십시오.

• 23kg 이상의 개에는 체중에 맞게 상기 정제들을 적절히 조합하여 투여하십시오.

MEMO

조달청 등록 품목

1. 살균제

제품명	킹사이드	올크린업	이지워시
주원료	글루타르알데히드 & 디메틸코코벤질암모늄클로라이드	삼중염 & NaDCC & 사과산	차아염소산칼슘
물품 식별 번호	<ul style="list-style-type: none"> • 1L 12164001-20464233 • 5L 12164001-20464232 • 18L 12164001-20464249 	<ul style="list-style-type: none"> • 1kg 12164001-21122305 	<ul style="list-style-type: none"> • 300정 12164001-23101843
특장점	<ol style="list-style-type: none"> 1. 광범위, 강력한 살균효과 2. 강한 침투력, 빠른 살균 작용 3. 약효의 높은 안정성 유지 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 삼중염과 NaDCC 이중 소독효과 2. 고농도 사과산 함유로 구제역 등의 소독범위 확장 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 수산용 살균제 2. 정제로 소독 편이 3. 장기간 살균 지속 4. 광범위한 소독효과

2. 의료용 살충제

제품명	응애킬	대한-안티섹
주원료	구연산 & 프로폴리스	티몰 & 소르브산
물품 식별 번호	<ul style="list-style-type: none"> • 150mL 51320303-21997821 	<ul style="list-style-type: none"> • 150mL 51320303-22230803
특장점	<ol style="list-style-type: none"> 1. 생약성분의 꿀벌 응애 구제제로 벌꿀에 잔류 X 2. 최소 분무량으로 최대 효과 발휘 3. 친환경제제로 내성문제 X 3. 장기간 살균 지속 4. 광범위한 소독효과 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 에센셜 오일 제제로 잔류 걱정 X 2. 황균, 항바이러스, 항진균, 항기생충 효과로 다양한 질병에 적용 가능한 제품 3. 석고병 및 진드기 예방 & 치료

제품명	미네라본 부록	라본믹스	골드파워 유제
주원료	레이본(테트라클로르비포스) & 미네랄 & 소금	레이본(테트라클로르비포스)	비펜스린
물품 식별 번호	<ul style="list-style-type: none"> • 10kg : 51320303-22451576 	<ul style="list-style-type: none"> • 5kg : 51320303-22033489 	<ul style="list-style-type: none"> • 1L : 51320303-22926261
특장점	<ol style="list-style-type: none"> 1. 파리유충구제 부록 2. 필수 미량광물질 공급 및 파리유충 구제 동시 가능 3. 빠른 대사속도로 내성 및 잔류걱정 X 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 파리유충구제 사료첨가제 2. 사료첨가제로 투약비용 및 노동력 절감 3. 빠른 대사속도로 내성 및 잔류걱정 X 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 친환경 저독성 살충제 2. 전염병 예방용 분무, 연막, 연무 겸용 살충제

3. 보조사료

제품명	DCS 682	비타플러스-원샷
주원료	효모배양물(사카로미세스 세르비시예) & 비타민 B1 & 사카린나트륨	비타민 A, B1, B2, B12, D3, E, 콜린, 나이아신, 라이신, 메치오닌
물품 식별 번호	• 1kg 10121599-21582567	• 20kg 10121599-22477364
특장점	1. CS682 발효추출물 함유로 천연 항생제 대체제 2. 사료효율개선 및 성장촉진 3. 면역기능 및 건강증진	1. 가축의 각종 비타민 결핍증 예방 2. 간기능 강화 및 면역력 향상 3. 증체율 향상 및 사료효율 개선 4. 환경변화 시 스트레스 예방

제품명	파워가바-C	비타킹비-액
주원료	비타민 C	비타민 C, E
물품 식별 번호	• 5L 10121599-23056549	• 500mL 10121599-22725822
특장점	1. 가바(GABA) 액상 제품 2. 천연물질 가바 사용으로 부작용 및 내성 없음 3. 특허출원 : 10-2016-0042737	1. 비타민 결핍에 의한 벌의 영양보충, 산란촉진 2. 항병력 강화, 면역력 증가, 활력증진

4. 대사성 의약품

제품명	바이오에스비-골드	에코 스태프
주원료	활성효모균 & 바실루스서브틸리스 & 효모배양물	바실루스서브틸리스 & 비타민 C & 난황분
물품 식별 번호	• 5kg 51280508-21007677	• 1kg 51280508-22973829
특장점	1. 기존 이스트컬처에 생균이 다량 함유된 복합 생균, 이스트컬처제 2. 장내유해균 억제, 정상유익균 증식 3. 생산성 향상 및 환경개선 효과	1. 면역기능 촉진, 장기능 개선 2. 난황형태 첨가로 가축 수동 면역력 획득 3. 물이나 대용유에 타서 급여

제품명	이문 디오더	에코 아이지
주원료	바실루스서브틸리스 & 비타민 C & 난황분	바실루스서브틸리스 & 비타민 C & 비타민 B6 & 난황분
물품 식별 번호	• 1kg 51280508-22893826	• 15g 51280508-22973824
특장점	1. 면역기능 및 장 기능 개선 2. 난황형태 첨가로 가축 수동 면역력 획득 3. 분변 악취감소 및 고온스트레스 예방	1. 짜먹이는 면역증강제로 간편 투여 2. 난황형태 함유로 각종 질병 예방 3. 유익 생균 복합처방으로 설사방지 탁월

5. 구충제

제품명	송아지용 피그록	그랜멕틴 주	그랜멕틴-에프 주
주원료	톨트라주릴	이버멕틴	이버멕틴 & 클로르설펜
물품 식별 번호	• 10mL : 51310402-22787493	• 50mL : 51310402-22644936	• 50mL : 51310402-22644934
특장점	1. 송아지 항콕시둠제 2. 1회 주입제 타입으로 투여 편리 3. 빠른 약효 발휘	1. 소, 돼지 내·외부 종합 기생충 구제제 2. 연 2회(봄, 가을) 단 한번 주사로 간편 구충 가능 3. 생산성 향상, 사료효율 향상	1. 소 간질충 및 내·외부 종합 구충제 2. 연 2회(봄, 가을) 단 한번 주사로 간편 구충 가능 3. 생산성 향상, 사료효율 향상

제품명	대한 뉴멕틴 프리믹스	그랜멕틴 펠렛
주원료	이버멕틴	이버멕틴
물품 식별 번호	• 1kg 51310402-22904582	• 500g 51310402-22926260 • 1kg 51310402-22931383
특장점	1. 생약성분의 꿀벌 응애 구제제로 벌꿀에 잔류 X 2. 최소 분무량으로 최대 효과 발휘 3. 친환경제제로 내성문제 X 3. 장기간 살균 지속 4. 광범위한 소독효과	1. 에센셜 오일 제제로 잔류 걱정 X 2. 항균, 항바이러스, 항진균, 항기생충 효과로 다양한 질병에 적용 가능한 제품 3. 석고병 및 진드기 예방 & 치료

따뜻함을 함께하는 기업 **대한뉴팜**

따뜻함을 함께하는 기업 대한뉴팜

본사(공장) : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 66
서울사무소 : 서울특별시 관악구 남현3길 61(남현동)
TEL : 02-3415-7853