


Product List

대한뉴팜 제품 리스트

따뜻함을 함께하는 대한뉴팜이 건강과 행복을 책임집니다.





순환기계 용제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 339		실로탈 정 Cilostazol 50mg	만성동맥폐색증에 따른 괴양, 동통 및 냉감 등 허혈성 증상의 개선, 뇌경색(심인성 뇌색전증 제외) 발증 후 재발억제	1회 2정, 1일 2회	30T 500T	669902380 250원
전문 218		뉴피도 정 Clopidogrel 75mg	1. 허혈뇌졸중, 심근경색 또는 말초동맥질환이 있는 성인 환자에서 죽상동맥경화성 증상의 개선 2. 급성관상동맥증후군(불안정성 협심증 또는 비Q파 심근경색 환자)에 있어서 약물치료 또는 관상중재시술(PCI)stent 시술을 하거나 하지 않은 경우) 및 관상동맥 회로우회술(CABG)을 받았거나 받을 환자를 포함)이 있는 성인 환자에서 죽상동맥경화성 증상(심혈관계 이상으로 인한 사망, 심근경색, 뇌졸중 또는 불응성 허혈)의 개선 3. 한 가지 이상의 혈관성 위험인자를 가지고 있고, 비타민 K 길항제(VKA) 투여가 적합하지 않으며, 출혈 위험이 낮은 심방세동 성인 환자에서 뇌졸중을 포함한 죽상 혈전증 및 혈전색전증의 위험성 감소	o 성인 1. 허혈뇌졸중, 심근경색 또는 말초동맥성 질환이 있는 환자: 클로피도로그렐로서 1일 1회 75mg을 경구투여 2. 급성관상동맥증후군(불안정성 협심증 또는 비Q파 심근경색)이 있는 환자: 1일 1회 300mg을 부하용량 (loading dose)으로 시작하고 이후에 1일 1회 75mg을 유지용량으로 경구투여. 아스피린 75~325mg을 1일 1회 이 약과 병용투여 3. 심방세동 환자에는 이 약으로서 1일 1회 75mg을 경구투여. 아스피린 75~100mg을 1일 1회 이 약과 병용투여	30T 100T	669906370 1,164원
전문 218		뉴피도에이 캡슐 Aspirin 100mg Clopidogrel 75mg	1. 급성관상동맥증후군(불안정성 협심증 또는 비Q파 심근경색 환자)에 있어서, 약물치료 또는 관상중재시술(PCI)stent 시술을 하거나 하지 않은 경우) 및 관상동맥회로우회술(CABG)을 받았거나 받을 환자를 포함)이 있는 환자에서 죽상동맥경화성 증상(심혈관계 이상으로 인한 사망, 심근경색, 뇌졸중 또는 불응성 허혈)의 개선 2. 한 가지 이상의 혈관성 위험인자를 가지고 있고, 비타민 K 길항제(VKA) 투여가 적합하지 않으며, 출혈 위험이 낮은 심방세동 환자에서 뇌졸중을 포함한 죽상혈전증 및 혈전색전증의 위험성 감소	1일 1회 1캡슐	30C 100C	669907000 1,209원
전문 217		메타진 정 Trimetazidine HCl 20mg	1차 항협심증 치료제로 적절히 조절되지 않거나, 내약성이 없는 안정형 협심증 환자의 증상적 치료를 위한 병용요법	1회 1정, 1일 3회	30T 300T	669901470 77원
전문 214		테르탄 정 40mg Telmisartan 40mg	1. 본태성 고혈압 2. 심혈관 질환의 위험성 감소 안지오텐신 전환효소(ACE) 저해제를 내약성으로 투여할 수 없으며, 주요 심혈관 질환이 발병될 위험성이 높은 만 55세 이상의 환자(관상동맥질환, 말초동맥질환, 뇌졸중, 일과성 허혈 발작에 대한 과거 병력이 있거나 말단 장기 손상의 임상적 증거가 있는 고위험성 당뇨병 환자)에서 심근경색, 뇌졸중 및 심혈관 질환으로 인한 사망의 위험성 감소	1. 본태고혈압 성인 : 텔미사르탄으로서 1일 1회 40mg 경구투여. 환자에 따라 1일 1회 20mg으로 유효하며 필요한 경우 1일 1회 80mg까지 증량 가능 2. 심혈관 질환의 위험성 감소 성인 : 이 약으로서 1일 1회 80mg 경구투여	30T	669906790 426원
전문 214		테르탄 정 80mg Telmisartan 80mg	1. 고혈압, 관상동맥의 고정폐쇄(안정형협심증) 또는 관상혈관계의 혈관경련과 혈관수축(이형협심증)에 의한 심근성허혈증 2. 최근 혈관조영술로 관상동맥질환이 확인된 환자로서 심부전이 없거나 심박출량이 40% 미만인 아닌 환자의 -협심증으로 인한 입원의 위험성 감소 -관상동맥 혈관재생술에 대한 위험성 감소	성인 : 암로디핀으로서 1일 1회 5mg을 경구투여하며 환자의 반응에 따라 1일 최고 10mg까지 증량	30T 300T	669906560 367원
전문 214		라핀 정 Lacidipine 4mg	단독투여 또는 다른 혈압강화제와의 병용투여에 의한 고혈압의 치료	초기용량 : 1일 1회 2mg 증량이 필요한 경우 : 1일 1회 4mg~6mg	90T	669901020 393원
전문 214		대한뉴팜 로잘탄플러스 정 Losartan potassium 50mg Hydrochlorothiazide 12.5mg	단일요법으로 혈압이 적절히 조절되지 않는 고혈압	1일 1회 1정	30T 300T	669900550 282원

순환기계 용제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 214		엔피포지 정 5/80mg Valsartan 80mg Amlodipine 5mg			30T	669905910 805원
전문 214		엔피포지 정 5/160mg Valsartan 160mg Amlodipine 5mg	암로디핀 또는 발사르탄 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압	1일 1회 1정	30T	669905920 988원
전문 214		엔피포지 정 10/160mg Valsartan 160mg Amlodipine 10mg			28T	669905930 1,128원
전문 214		엔피스타 정 40/5mg Telmisartan 40mg Amlodipine 5mg			30T	669906990 706원
전문 214		엔피스타 정 40/10mg Telmisartan 40mg Amlodipine 10mg	텔미사르탄 또는 암로디핀 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압	1일 1회 1정 (식사와 관계없이 복용)	30T	669906970 762원
전문 214		엔피스타 정 80/5mg Telmisartan 80mg Amlodipine 5mg			30T	669906980 853원
전문 218		로바타딘 정 Lovastatin 20mg	원발성고지혈증 : 고콜레스테롤혈증(IIa형), 고콜레스테롤혈증과 고트리글리세라이드혈증의 복합형(IIb형) 고지혈증에 의한 관동맥질환의 발병 위험성 감소	1일 20mg~80mg, 1-수회 분할 경구투여	30T 500T	669901090 359원
전문 218		뉴토르 정 10mg Atorvastatin calcium 10.84mg (As Atorvastatin 10mg)	심혈관계 질환에 대한 위험성감소, 원발성 고콜레스테롤혈증 및 혼합형 이상지질혈증 환자의 콜레스테롤 개선	1일 1회 10mg~80mg의 용량범위로 투여	30T 100T	669905840 663원
전문 218		뉴토르 정 20mg Atorvastatin calcium 21.69mg (As Atorvastatin 20mg)			30T	669906010 712원
전문 218		뉴스토 정 10mg Rosuvastatin calcium 10.40mg (As Rosuvastatin 10mg)	원발성 고콜레스테롤혈증(type IIa), 복합형 고지혈증 (type IIb)	초회용량 : 1일 1회 1/2정 유지용량 : 1일 1회 1정	30T	669906020 612원
전문 218		엔피토린 정 10/10mg Simvastatin 10mg Ezetimibe 10mg	원발성 고콜레스테롤혈증, 동형정합 가족형 고콜레스테롤혈증(HoFH)	1일 1회 1정, 저녁에 투여	30T	669906750 784원
전문 218		엔피토린 정 10/20mg Simvastatin 20mg Ezetimibe 10mg			30T	669906620 1,095원

내분비 용제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 396		그리자이드 정 Gliclazide 80mg	제 2형 당뇨병(식사요법, 운동요법으로 충분한 효과를 얻을 수 없는 경우에 한함)	1일 40~80mg으로 시작 1일 1~2회 경구투여	30T 500T	669900170 82원
전문 396		게리메트 정 2/500mg Glimepiride 2mg Metformin HCl 500mg	인슐린 비의존성 당뇨병(제2형)환자에서 식이요법 및 운동요법과 병행하여 글리메피리드 또는 메트포르민 단독요법으로 혈당조절효과가 불충분한 경우 또는 글리메피리드와 메트포르민 병용요법의 대체	1회 1정, 1일 1~2회	30T 100T	669905520 197원
전문 399		알포의 정 R-thictic acid tromethamine 480mg	당뇨병성 다발성 신경염의 완화	1일 1회, 충분한 물과 함께 아침식사 약 30분전 복용	30T 100T	669907200 832원



신경계 용제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 218		엔피셉트 정 10mg Donepezil HCl 10mg	알츠하이머형 치매증상의 치료	1일 1회 5~10mg, 취침전 투여	30T	669906610 2,460원
전문 218		엔피셉트 정 5mg Donepezil HCl 5mg				669906730 2,060원
전문 119		포스콜린 연질캡슐 Choline alfoscerate 400mg	1. 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군 : 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력감소 2. 감정 및 행동변화 : 정서불안, 자극과민성, 주위무관심 3. 노인성 가성우울증	1회 1정, 1일 2~3회	90C	669906470 523원
전문 219		스포라틴 정 Acetyl L-carnitine HCl 590mg (As Acetyl L-carnitine 500mg)	일차적 퇴행성 질환 또는 뇌혈관 질환에 의한 이차적 퇴행성 질환	1회 1정, 1일 2~3회	60T	651500790 572원

소화기계 용제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 232		에스오엠 정 20mg Esomeprazole 20mg	1. 위식도 역류질환(GERD) 2. 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법 3. 비스테로이드소염진통제(COX-2 비선택성, 선택성) 투여와 관련된 상부 위장관 증상(통증, 불편감, 작열감) 치료의 단요법 4. 지속적인 비스테로이드소염진통제 투여가 필요한 환자 5. Zollinger-Ellison 증후군의 치료 6. 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후의 유지 요법	1일 1회 20~40mg (단, Zollinger-Ellison 증후군의 치료는 1일 2회 40~80mg)	28T	669906390 764원
전문 232		에스오엠 정 40mg Esomeprazole 40mg			28T	669906410 1,078원
전문 232		대한뉴팜 오엠프라졸 캡슐 Omeprazole 20mg	1. 위궤양, 십이지장궤양의 단기치료 2. 역류성 식도염 및 위식도 역류질환(GERD)의 증상(가슴앓이, 토출 등) 치료 3. 심한 역류성 식도염과 잘 치료되지 않는 소화성 궤양의 유지요법 4. Zollinger-Ellison 증후군 5. Helicobacter pylori 에 감염된 십이지장궤양의 재발 방지를 위한 항생제 병용요법 6. 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 투여로 인한 위·십이지장궤양 또는 미란의 치료 7. 위·십이지장 병변의 병력이 있는 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 장기투여 환자에서 NSAID 투여로 인한 위·십이지장궤양 또는 미란 및 소화 불량증상의 예방 8. 역류성식도염의 재발방지	1일 1회 1캡슐	28C	669900700 789원
전문 232		라피졸 정 10mg Rabeprazole sodium 10mg	1. 위·십이지장궤양 2. 미란성 또는 궤양성 위식도역류질환 3. 위식도역류질환 증상 완화 4. 위식도역류질환 장기간 유지요법 5. Helicobacter pylori에 감염된 소화기 궤양 환자에 대한 항생제 병용요법 6. Zollinger-Ellison 증후군	1. 위·십이지장궤양: 1일 1회 10mg 2. 미란성 또는 궤양성 위식도역류질환: 1일 1회 10mg 또는 20mg 3. 위식도역류질환 증상 완화: 1일 1회 10mg 4. 위식도역류질환 장기간 유지요법: 1일 10mg 또는 20mg 5. 헬리코박터필로리 제균: 본제 20mg+클래리트로마이신 500mg+아목시실린 1g 1일 2회, 7일간 6. Zollinger-Ellison 증후군: 1일 1회 60mg	28T	669906270 534원
전문 232		라피졸 정 20mg Rabeprazole sodium 20mg			28T	669906260 1,069원

소화기계 용제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 232		카밀란 정 Ranitidine HCl 168mg (As Ranitidine 150mg)	위·십이지장궤양, Zollinger-Ellison 증후군, 역류성식도염, 마취전 투약(멘델슨증후군 예방), 수술후 궤양, NSAID 투여로 인한 위·십이지장궤양, 급성위염, 만성위염의 급성악화기, 상부 소화관 출혈	1회 1정, 1일 2회	30T 500T	669903530 134원
전문 232		뉴잔틴 캡슐 150mg Nizatidine 150mg	1. 활동성 위·십이지장 궤양 치료 및 십이지장궤양 재발 방지 2. 내시경상으로 진단된 미란성 및 궤양성 식도염, 위식도 역류질환(GERD)에 기인한 가슴쓰림(heartburn) 증상의 치료 3. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성 악화기	1일 1회 300mg 또는 1회 150mg 1일 2회 아침, 저녁으로 투여	30C 300C	669906420 356원
전문 232		제이에스 시메티딘 정 Cimetidine 200mg	위·십이지장궤양, 역류성식도염, 재발성궤양, 문합부궤양, Zollinger-Ellison 증후군, 급성위염, 만성위염의 급성악화기의 위점막 병변 개선	1회 2정, 1일 2회 또는 1일 1회(취침시) 4정	1000T	699800740 69원
전문 232		무코란 정 Rebamipide 100mg	1. 위궤양 2. 급성위염, 만성위염의 급성악화기의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선	1회 1정, 1일 3회 (위궤양 : 아침, 저녁 및 취침전에 투여)	30T 500T	669901570 103원
전문 232		엔피렌 정 Artemisiae argyi folium 95% ethanol ext.(20→1) 60mg	급성위염, 만성위염의 위점막 병변 개선, NSAIDs 투여로 인한 위염의 예방	1회 1정, 1일 3회	30T 500T	669906150 124원
전문 239		레보란 정 Levosulpiride 25mg	기능성소화불량으로 인한 다음 증상의 완화: 복부 팽만감, 상복부불쾌감, 속쓰림, 트림, 구역, 구토	1회 1정, 1일 3회 식전 투여	30T 500T	669901040 119원
전문 239		모사가틴 정 Mosapride citrate 5mg	기능성소화불량으로 인한 소화기증상(속쓰림, 구역, 구토)	1일 3정을 3회로 나누어 식전 또는 식후에 투여	30T 300T	669906080 103원
전문 239		뉴콘 정 Calcium polycarbophil 625mg	만성변비, 비특이성 설사, 과민대장증후군에서의 변비 보조요법 및 설사	성인 : 1회 2정 1일 1~4회 경구투여	30T 500T	669906630 89원
전문 237		아시토바 캡슐 300mg Lactobacillus acidophilus 300mg (생균수로서 1.0 X 10 ⁸ 개)	정장, 변비, 묽은 변, 복부 팽만감, 장내이상발효	1. 성인 및 12세 이상의 소아 : 락토바실루스아시도필루스균으로서 1회 300mg (생균수로서 1 X 10 ⁸ 개)을 1일 1~3회 복용 2. 8세이상 12세 미만의 소아 : 이 약으로서 1회 300mg(생균수로서 1 X 10 ⁸ 개)을 1일 1~2회 복용	30C 500C	669902600 117원
전문 124		티파론 정 Tiropramide HCl 100mg	간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통에서의 급성 경련성 동통, 위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술 후 유착에서의 복부 경련 및 동통	1회 1정, 1일 2~3회	30T 500T	669904070 135원



호흡기계 용제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
일반 222		에스텐캡슐 300mg Erdosteine 300mg	급·만성 호흡기질환에서의 점액용해 및 거담	1회 300mg, 1일 2~3회	30C 500C	669906660 196원
전문 222		엘피진 정 Levodropropizine 60mg	급·만성 기관지염에서의 기침	1회 1정, 1일 3회	30T 300T	669902980 146원
일반 222		뮤시딘 캡셀 200mg Acetylcysteine 200mg	급·만성기관지염, 기관지천식, 후두염, 부비동염, 낭성 섬유증에서의 객담배출근관	급성질환 : (성인) 1회 1캡슐, 1일 3회 만성질환 : (성인) 1회 1캡슐 1일 2회 낭성섬유증 : (6세 이상 소아) 1회 1캡슐, 1일 3회	30C 500C	669901590 81원
일반 222		헤데란 시럽 Ivy leaf 70% ethanol fluid ext. 20mg/mL	만성 염증성 기관지 질환의 증상 개선, 기침을 동반한 호흡기의 급성 염증 완화	1. 성인 및 15세 이상 : 1회 100 mg, 1일 3회 2. 4~14세 : 이 약으로서 1회 100 mg, 1일 2회 3. 2~3세 : 1회 50 mg, 1일 3회	500mL	669904421 34원
전문 229		뉴카민 시럽 Pelargonium sidoides 11% ethanol ext.(1~8~10) · glycerin mixed solution(8:2) 0,1716g/mL	급성 기관지염	1. 성인 및 12세 이상 : 1회 9mL, 1일 3회 2. 6세 이상~12세 미만 : 1회 6mL, 1일 3회 3. 1세 이상~6세 미만 : 1회 3mL, 1일 3회	500mL	669905561 28원
전문 141		레보티진 정 Levocetirizine HCl 5mg	계절성 알레르기성 비염 또는 다년성 알레르기성 비염(지속적 알레르기성 비염 포함), 만성 특발성 두드러기, 가려움증을 동반한 피부염 및 습진(하이드로코르티손 외용제와 병용)의 증상완화	1일 1회 1정	30T 300T	669906090 210원
전문 141		베포타틴 정 Bepotastine besilate 10mg	다년성 알레르기성 비염, 만성 두드러기, 피부질환에 수반된 소양증(습진, 피부염, 피부소양증, 양진)	1회 1정, 1일 2회	30T 300T	669906930 164원
전문 149		아젤라스 정 Azelastine HCl 1mg	기관지천식, 알러지성 비염, 두드러기, 습진, 피부염, 아토피성피부염, 피부소양증, 가려움	1회 1정, 기관지 천식인 경우 1회 2mg, 1일 2회(아침식후 및 취침 전)	30T 300T	669906050 176원
전문 149		몬테스트 정 10mg Montelukast 10mg	1. 천식의 방지 및 지속적 치료 2. 계절 및 연중 알레르기비염 증상 완화	성인 및 15세 이상의 청소년: 1일 1회 10mg 경구투여	28T	669906860 774원
전문 149		몬테스트 추징 4mg Montelukast 4mg		2~5세 어린이: 1일 1회 4mg을 씹어서 복용	28T	669906820 695원
전문 149		몬테스트 추징 5mg Montelukast 5mg		6~14세 어린이 : 1일 1회 5mg을 씹어서 복용	28T	669906830 774원
전문 132		모메탈 나잘스프레이 Mometasone furoate 50mcg/1dose	계절 알레르기비염 및 연중비염, 중등도~중증의 계절 알레르기 비염의 증상 예방요법, 비염, 중증의 세균 감염이 없는 급성 비부비동염	알레르기 비염, 비염증 : 1회 각 비공에 2번씩 1일 1회 급성 비부비동염 : 1회 각 비공마다 2번씩 1일 2회	140dose	669905171 10,691원

해열진통소염제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 114		록스파인 정 Loxoprofen sodium hydrate 68,1mg (As Loxoprofen sodium 60mg)	만성관절류마티스, 변형성관절증, 요통, 건관절주위염, 경견완충후근의 소염진통, 수술후, 외상후 및 발치후의 소염·진통, 급성상기도염의 해열, 진통	1회 1정, 1일 3회	30T 500T	669901120 125원
전문 114		무파인 정 Acetaminophen 325mg Tramadol HCl 37.5mg	중등도-중증의 급·만성 통증	1회 2정, 최대 8정 (최소 6시간 간격투여)	30T 300T	669904810 190원
전문 114		무파인 세미 정 Acetaminophen 162.5mg Tramadol HCl 18.75mg	중등도-중증의 급·만성 통증	1회 4정, 최대 16정 (최소 6시간 간격투여)	30T 300T	669904800 126원
전문 114		무파인 서방정 Acetaminophen 650mg (속방층 325mg, 서방층 325mg) Tramadol HCl 75mg		1회 1정, 최대 4정 (최소 12시간 간격투여)	30T 100T	669906400 418원
전문 114		무파인 세미 서방정 Acetaminophen 325mg (속방층 162.5mg, 서방층 162.5mg) Tramadol HCl 37.5mg		1회 2정, 최대 8정 (최소 12시간 간격투여)	30T 100T	669906380 279원
전문 114		아세파인 정 Aceclofenac 100mg	류마티스관절염, 간직적추염, 골관절염(퇴행관절염) 및 건갑상완골의 관절주위염, 치통, 외상 후 생기는 염증, 요통, 좌골통, 비관절성 류머티즘으로 인한 통증	1회 1정, 1일 2회	30T 500T	669902550 188원
전문 114		모루밍 정 Morniflumate 350mg	호흡기질환(후두염, 기관염, 기관지염), 이비인후과질환(부비동염, 이염, 편도염, 인두염), 골관절질환 및 증상의 진통·소염	1회 1정, 1일 2회	30T 300T	669906130 170원
전문 114		메록캠 캡슐 Meloxicam 7.5mg	통증과 운동실조를 수반하는 골관절염(퇴행관절염)의 급성악화시 단기간의 증상치료, 류마티스관절염의 증상 치료, 간직적추염의 증상 치료	골관절염(퇴행관절염)의 급성악화시 : 1회 1캡슐, 1일 1회 류마티스관절염, 간직적추염 : 1회 2캡슐, 1일 1회	30C 500C	669905880 270원

항생제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 618		아목탐 정 500mg Amoxicillin 250mg Pivoxil sulbactam 250mg	중이염, 부비강염, 인두염, 후두염, 기관지염, 폐렴, 상하부 요로 감염증, 피부 및 상처 감염증	1회 1~2정, 1일 3회 경구투여	30T 300T	669902510 471원
전문 618		아목클 정 375mg Amoxicillin hydrate 250mg Potassium clavulanate diluted 212.73mg (As Potassium clavulanate 125mg)	급·만성 기관지염, 대염성 및 기관지염, 폐렴, 농흉, 폐농양, 편도염, 부비동염, 중이염, 방광염, 요도염, 신우신염, 패혈성 유산, 산욕기 패혈증, 골반강염, 연성하감, 임질, 중기 및 농양, 연조직염, 상처감염, 복막염, 골수염, 패혈증, 복부내 패혈증, 치과 감염	성인 및 12세 이상 또는 체중 40Kg 이상 소아 : 아목시실린의 양으로서 1회 250mg, 1일 3회 (중증 및 호흡기 감염 시 아목시실린의 양으로서 1회 500mg)	80T	669905950 353원
전문 618		아목클 정 625mg Amoxicillin hydrate 500mg Potassium clavulanate diluted 212.73mg (As Potassium clavulanate 125mg)		40T	669905960 568원	
전문 618		아목클 시럽 Amoxicillin 40mg/mL Clavulanate potassium 5.7mg/mL		경·중등도 감염 : 1일 Kg당 25mg/3.6mg을 2회 나누어 복용 중증감염 : 1일 Kg당 45mg/6.4mg을 2회 나누어 복용	50mL	669906001 81원



항생제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 619		클레마신 정 Clarithromycin 250mg	하기도감염증 : 기관지염, 폐렴 등 상기도감염증 : 인두염, 부비동염 등 피부 및 피부조직 감염증 미코박테륨 아비움, 미코박테륨 인트라셀룰라에기인한 미코박테리아 감염증 십이지장궤양 환자의 헬리코박터 파일로리 박멸	1회 250mg~500mg(약가), 1일 2회	30T 100T	669906310 865원
전문 619		클레마신 정 500mg Clarithromycin 500mg			30T 200T	669906850 1,291원
전문 614		록시티로신 정 Roxithromycin 150mg	인후두염, 급성기관지염, 편도염, 세균성폐렴, 미코플라스마폐렴 등 호흡기 감염증, 임균에 의한 감염을 제외한 생식기감염증 및 성병, 중이염, 부비동염, 모낭염, 종기, 종기증, 응충, 단독, 연조직염, 림프관(절)염, 생인손, 화농성 손발톱주위염, 피하농양 등	1회 1정, 1일 2회(폐렴 : 1일 1회 2정 아침 식전에 투여)	30T 500T	669901130 376원
전문 618		세플러 캡슐 Cefaclor 250mg	중이염, 폐렴, 인후두염, 편도염, 기관지염, 신우신염, 방광염, 임균성 요도염, 부스럼, 응충, 모낭염, 연조직염, 감염성 죽종, 피하농양, 생인손, 항상감염	1회 1캡슐, 8시간마다 투여 중증 감염시 1회 2캡슐	30C 500C	669902150 438원
전문 618		사프딘 캡슐 500mg Cephadrine 500mg	편도염, 인두염, 대엽성폐렴, 기관지염, 방광염, 신우신염, 요도염, 전립선염, 농양, 연조직염, 종기, 농가진, 중이염	피부 및 연조직, 호흡기 감염증 : 1회 250mg~500mg, 1일 4회 또는 500mg~1g, 1일 2회 요로감염증 : 1회 1캡슐, 1일 2회	30C 500C	669901920 205원
전문 629		엑센 정 Ofloxacin 100mg	모낭염, 종기, 큰종기, 알은연조직염(단독), 연조직염, 림프관(절)염, 손끝염(표저), 피하농양, 멍새염, 접촉성 여드름, 감염성 죽종, 항문주위 농양, 유선염, 외상, 열상, 수술상처 등의 표재성 2차감염 등	3~6정, 1일 2~3회 분할 투여	30T 500T	669902910 183원
전문 629		에프로신 정 Ciprofloxacin HCl 291mg (As Ciprofloxacin 250mg)	호흡기감염, 귀·코·인후감염·구강·치아·턱의 감염증, 신장 또는 요로 감염증, 임질을 포함한 성기감염증, 위장관감염증, 담즙분비관의 감염증, 피부 및 연조직의 감염과 상처, 골·관절의 감염증, 산부인과적 감염증, 패혈증, 복막염, 안과적 감염증	1회 1~2정, 1일 2회 식간 경구투여	30T 500T	669902830 522원
전문 629		레비신 정 Levofloxacin 100mg	인후두염, 급성 기관지염, 만성 기관지염, 미만성 병세 기관지염, 만성호흡기질환의 2차 감염, 폐렴, 기관지확장 증(감염시) 등	1회 1정, 1일 2~3회	30T 200T	669901050 567원
전문 629		레비신 정 500mg Levofloxacin 500mg	원내감염 폐렴, 복합 피부 및 연조직 감염, 지역 사회감염 폐렴, 만성기관지염의 급성 세균성 악화, 급성 부비동염, 경·중등도의 비복합성 피부 및 연조직 감염 : 고름집 연조직염, 종기, 농피증, 상처감염, 만성 세균성 전립선염, 경·중등도의 급성 신우신염을 포함한 복합요로감염, 경·중등도의 단순요로감염	1일 1회, 250~750 mg 경구투여	28T 100T	669907180 1,607원

근골격계 용제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 122		에피손 정 Eperisone HCl 50mg	경견완중후군, 견관절주위염, 요통에 수반하는 동통성 근육연축, 신경계 질환에 의한 경직성 마비	1회 1정, 1일 3회	30T 500T	669902880 115원

골다공증 치료제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 399		세로본플러스 정 Cholecalciferol concentrated powder 56mg (As Cholecalciferol 5,600 I.U) Risedronate sodium 35mg	폐경 후 여성의 골다공증 치료와 예방, 남성의 골다공증 치료	1정을 매주 1회 경구 투여	4T	669906940 5,360원
전문 399		알로본 플러스디 정 Cholecalciferol concentrate powder 53.33mg (As Vitamin D ₃ 5,600 I.U) Alendronate sodium 91.37mg (As Alendronic acid 70mg)	폐경 후 여성의 골다공증 치료, 남성의 골다공증 치료	1주 1회 1정	4T	669906530 5,327원
전문 399		엔피본 주 Ibandronate sodium monohydrate 3.375mg/3ml (As Ibandronic acid 1mg/mL)	폐경 후 여성의 골다공증 치료	3mg을 3개월에 한번씩 15~30초간 정맥주사	1's	669906741 54,246원
일반 321		시트라칼에프 정 Calcium citrate 750mg (As Calcium 0.158g) Cholecalciferol 4mg (As Vitamin D 400I.U)	칼슘결핍 및 칼슘의 보급, 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방, 비타민 D의 보급	1일 1회, 1회 2정	300T	669902360 70원

비뇨기계 용제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 259		테트린 정 2mg Terazosin HCl 2,347mg (As Terazosin 2mg)	양성전립선비대에 의한 배뇨장애, 고혈압 (경중~중등도)	양성전립선비대에 의한 배뇨장애, 고혈압 : 초회량~취침전 1/2정, 유지량~1일 1회 5~10mg 투여 고혈압 : 초회량~취침전 1/2정, 유지량~1일 1회 2~10mg 투여	30T 100T	669903960 357원
전문 259		타로신서방 정 0.2mg Tamsulosin HCl 0.2mg	양성전립샘비대증에 따른 배뇨장애	1일 1회 1정	30T 100T	669906360 547원
전문 259		엔피스카 정 Finasteride 5mg	양성전립샘비대증	1일 1회 1정	30T	669906600 732원
전문 259		유로픽스 정 Propiverine HCl 20mg	신경인성방광, 신경성빈뇨, 불안정방광, 방광자극상태 (만성방광염, 만성전립샘염)에 의한 빈뇨, 요실금, 과활동 방광의 소변 절박감, 빈뇨 및 절박성 요실금	1일 1회 1정	30T 100T	640900780 615원



항진균제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 629		푸졸 캡슐 Fluconazole 50mg	급성 또는 재발성 질칸디다증, 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자의 구강 인두, 식도, 비침습성 기관지 폐렴과 칸디다노증, 피부점막 및 만성위축성 구강칸디다증(의치로 인한 구강내 통증)등을 포함한 점막칸디다증 등	질칸디다증 : 1회 3캡슐 점막 칸디다증 : 1일 1회, 1캡슐 손·발톱진균증 : 1주 1회 3캡슐 피부 진균감염증 : 1일 1회 1캡슐 또는 1주 1회 3캡슐	30C 100C	669904220 1,784원
전문 629		이코졸 정 Itraconazole 100mg	칸디다성 질염, 어루러기, 피부사상균에 의한 체부백선, 고부백선(완선), 수부백선, 족부백선, 구강칸디다증, 진균성각막염, 손·발톱진균증, 전신진균감염증 등	칸디다성 질염 : 1회 2정, 1일 2회 어루러기 : 1일 1회 2정 체부백선, 고부백선(완선), 수부백선, 족부백선 : 1일 1회 1정 구강칸디다증 : 1일 1회 1정 진균성각막염 : 1일 1회 2정 손·발톱진균증 : 1회 2정, 1일 2회	28T 100T	669905850 1,268원

항바이러스제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 629		팜디악 정 Famciclovir 250mg	대상포진 바이러스 감염증, 생식기포진 감염증의 치료 및 재발성 생식기포진의 억제	대상포진 감염증 : 1회 1정, 1일 3회 7일간 투여 초발성 생식기포진 감염증 : 1회 1정, 1일 3회 5일간 투여	21T	669904110 2,477원

부신피르몬제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 245		히티손 정 Hydrocortisone 10mg	1. 내분비 장애 : 원발성 및 속발성 만성 부신피질기능 부전증, 급성 부신피질기능부전증, 아 급성 갑상선염, 갑상선 질환에 수반되는 악성 안구돌출증, 부신피질자극 호르몬 단독결핍증, 특발성 저혈당증 2. 류마티스성 장애 : 급성진행 또는 악화를 방지하기 위한 단기투여용 보조요법으로서 다음의 질환 : 만성 류마티스관절염, 류마티스열(류마티스성 심염을 포함) 등	1일 1~12정, 1~4회 분할 투여	30T 500T	669906160 111원

모발용제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 267		두피나 정 Finasteride 1mg	성인 남성(만 18~41세)의 남성형 탈모증(안드로겐 탈모증)의 치료	1일 1회 1정	30T	비급여

여드름 치료제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 311		아크노 연질캡슐 Isotretinoin 10mg	다른 치료법으로 잘 치료되지 않는 중증의 여드름 (결절성, 낭포성, 응괴성), 특히 체간 병변과 관련된 낭포성 및 응괴성 여드름	1. 초기용량 : 이소트레티노인으로서 1일 체중 kg당 0.5mg을 반응을 관찰하며 투여 2. 유지용량 : 이 약으로서 1일 체중 kg당 0.5~1.0mg을 투여하며, 중증의 여드름 환자에게는 2mg까지 증량, 저용량의 경우는 1일1회, 고용량의 경우는 1일 2회 분할하여 식사와 함께 복용	30C 100C	669906320 305원

정신신경계 용제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 117		디프렌 캡슐 Fluoxetine HCl 22.4mg (As Fluoxetine 20mg)	우울증, 신경성 식욕과항진증, 강박반응성 질환, 월경전 불쾌장애	1일 20~80mg 투여	30C 300C	669901000 435원 (363원)
전문 117		디프렌 캡슐 10mg Fluoxetine HCl 11.2mg (As Fluoxetine 10mg)			30C 300C	비급여 (220원)
전문 117		부프론 정 Bupropion HCl 100mg	우울증의 치료	초기 : 1회 1정, 1일 2회 4일 이후 : 1회 1정, 1일 3회	100T	비급여

비만 치료제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문/항정 123		페스틴 정 Phentermine HCl 37.5mg (As Phentermine 30mg)		1일 1회 1정	30T 100T	비급여 770원
전문/항정 123		피티엠 정 Phentermine HCl 18.75mg (As Phentermine 15mg)	초기 체질량지수(BMI)가 30kg/m ² 이상, 또는 다른 위험인자가 있는 BMI 27kg/m ² 이상인 외인성 비만 환자에서 운동, 행동 수정 및 칼로리 제한을 기본으로 하는 체중 감량 보조요법	1일 1회 2정 또는 1일 1~2회 1정	30T 100T	비급여 440원
전문/항정 123		펜틴 정 Phendimetrazine tartrate 35mg		1일 2~3회 1정	300T	비급여 330원
일반 399		마메이드 정 Alginic acid 200mg Carboxymethylcellulose sodium 100mg	음식물 섭취 감소를 통한 체중감량의 보조요법	1일 3회 2정	300T	비급여 198원



비만 치료제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 399		제로다운 캡슐 60mg Orlistat 60mg	체질량 지수(BMI) 30kg/m ² 이상 또는 다른 위험인자 (예, 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증) 가 있는 27kg/m ² 이상의 비만환자에 있어 저칼로리 식이와 함께 체중감소 또는 체중유지를 포함한 비만치료 또는 체중 재 증가의 위험감소	지방을 함유하는 식사와 함께 복용하거나 식사 후 1시간 이내에 오르 리스타트로서 1회 2캡슐, 1일 3회	84C	비급여
전문 399		제로팻 캡슐 Orlistat 120mg		지방을 함유하는 식사와 함께 복용하거나 식사 후 1시간 이내에 오르 리스타트로서 1회 1캡슐, 1일 3회	84C	비급여

기타 치료제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 392		나렉스 정 Naltrexone HCl 25mg	적정 관리 프로그램과 병행하여 알코올의 존성 치료 및 외인성 아편류의 효과차단	1일 1회 2정	30T 100T	비급여 1,125원
전문 113		토피 정 25mg Topiramate 25mg	간질, 편두통의 예방	간질 : 처음 1주일 동안 저녁에 1정씩 투여 하고 1-2주 간격으로 1일 25 또는 50mg씩 증량하여 1일 2회(단독 요법으로서의 권장 용량은 1일 100~200mg) 편두통의 예방 : 처음 1주일 동안은 저녁에 1정으로 투여를 시작하고 1주 간격으로 25mg/일 씩 증량	30T 100T	비급여 385원
전문 113		토피트 정 Topiramate 100mg			30T 100T	비급여 880원
일반 114		카푸린에스 정 Ephedrine HCl 25mg Caffeine anhydrous 25mg Acetaminophen 200mg	감기의 증상상 (인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화	1회 1정, 1일 3회	60T	비급여 140원
일반 114		나오미 정 방기황기탕건조엑스(7.52-1) 244mg	살색이 희고 피로하기 쉬우며, 땀이 잘나는 경향이 있는 비만(근육에 긴장감이 없고 몰살핀) 관절통, 부종 증상	1회 4정, 1일 3회	360T	비급여 110원
전문 116		히스탄에프 정 16mg Betahistine HCl 16mg	메니에르병에 의한 어지러움, 이명, 청력 소실	초기 용량 : 1회 16mg, 1일 3회 유지 용량 : 1일 24~48 mg	30T 300T	비급여 165원
전문 116		히스탄에프 정 24mg Betahistine HCl 24mg			30T 300T	비급여 198원

기타 치료제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
일반 218		콜다운 연질캡슐 Pantethine 62.5mg Unsaponifiable Matter of soybean oil 100mg Vitamine E(Tocopherol) 22.67 I.U.	고콜레스테롤 혈종의 개선, 고콜레스테롤 혈중에 수반되는 말초혈행장애(수족냉증, 저림)의 완화	성인 1회 2캡슐, 1일 3회 식후 복용	300C	비급여 150원
일반 218		콜레스텐 연질캡슐 Safflower oil 333.33mg (리놀산으로서 250mg) Tocopherol acetate 6.67mg Pyridoxine HCl 0.67mg	비만증, 당뇨병·분태성 고콜레스테롤혈증에 의한 지질대사 개선	1회 3캡슐, 1일 3회 식전 30분 전에 복용	300C	비급여 130원
일반 219		캠벨 정 방풍통산산건조엑스(4,64-1) 237.5mg	배에 피하지방이 많고 변비가 있는 환자의 다음 증상 : 고혈압의 동반증상(두근거림, 어깨결림, 흉조), 비만, 부기, 변비	1회 2정, 1일 3회 식전 또는 식간에 복용	500T	비급여 88원
일반 219		디카틴 정 L-carnitine 330mg	1차성, 2차성 카르니틴 결핍증 허혈성 심질환에 의한 심근대사장애 : 협심증, 급성심근경색	1일 2~3g을 2~3회 분할 경구 투여	90T	비급여 180원
일반 238		마노엘 정 Aloe extract 100mg Magnesium hydroxide 500mg Ursodesoxycholic acid 10mg	변비, 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질	1회 1정 성인(15세이상) 1일 3회 11세~14세 1일 2회를 식전(식간 또는 식후)에 복용	300T	비급여 121원
일반 339		다이엔 캡슐 Green tea powder 250mg Orthosiphon powder 150mg	비만 또는 과체중시 체중감량 보조제	1회 1~2캡슐, 1일 3회 복용	300C	비급여 141원
일반 313		바이타비 정 Folic acid 250µg Cyanocobalamin 500µg Pyridoxine HCl 50mg	<ul style="list-style-type: none"> 다음 경기의 비타민 B₆의 보급 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복후)의 체력 저하시 o 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 	만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1회 1정, 1일 2회	300T	비급여 130원
일반 239		탐부틴 정 200mg Trimebutine maleate 200mg	식도역류 및 열공헤르니아, 위,십이지장염, 위,십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통, 소화불량, 구역, 구토), 과민성대장증후군 및 경련성 결장 소아 질환 : 습관성 구토, 비강염성 장관 통과 장애(변비, 설사), 동요자극, 수면장애	1회 1/2~1정, 1일 3회	500T	비급여 120원



항악성 종양제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드
전문/희귀 421		이스카도엠 0.01mg Viscum Album(Mali) Soluble Extract(1→5) 0.05mg/mL	<p>종양의 치료, 종양수술후 재발의 예방, 전암증 병소 조절기관의 악성질환, 골수기능의 자극</p> <p>1. 초기 단계 : 시리즈0에서부터 단계 적인 용량증가, 주 2~3회 피하주사 2. 유지단계 - 개별적으로 결정된 최적용법용량 으로 치료를 지속 - 유지기간 동안 시리즈의 치료는 가장 높은 강도를 나타내는 용량, 또는 해당 종류의 묽음을 사용 하는 것으로 지속</p>		7A	비급여 (053100040)
전문/희귀 421		이스카도엠 0.1mg Viscum Album(Mali) Soluble Extract(1→5) 0.5mg/mL			7A	비급여 (053100100)
전문/희귀 421		이스카도엠 1mg Viscum Album(Mali) Soluble Extract(1→5) 5mg/mL			7A	비급여 (053100050)
전문/희귀 421		이스카도엠 10mg Viscum Album(Mali) Soluble Extract(1→5) 50mg/mL			7A	비급여 (053100010)
전문/희귀 421		이스카도엠 20mg Viscum Album(Mali) Soluble Extract(1→5) 100mg/mL			7A	비급여 (053100090)
전문/희귀 421		이스카도큐 0.01mg Viscum album(Quercus) Soluble Extract(1→5) 0.05mg/mL			7A	비급여 (053100060)
전문/희귀 421		이스카도큐 0.1mg Viscum album(Quercus) Soluble Extract(1→5) 0.5mg/mL			7A	비급여 (053100080)
전문/희귀 421		이스카도큐 1mg Viscum album(Quercus) Soluble Extract(1→5) 5mg/mL			7A	비급여 (053100070)
전문/희귀 421		이스카도큐 10mg Viscum album(Quercus) Soluble Extract(1→5) 50mg/mL			7A	비급여 (053100020)
전문/희귀 421		이스카도큐 20mg Viscum album(Quercus) Soluble Extract(1→5) 100mg/mL			7A	비급여 (053100030)

해열소염진통제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드 급여상한액
전문 114		크낙 주 2mL Diclofenac 8-dimethylamino ethanol 90mg/2mL	류마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추 염, 외상후·수술후 염증 및 동통, 급성통 풍, 신 및 간산통	1일 1앰플, 둔부의 상부 한쪽면에 감속이 주사	50A	669903791 1,044원

진경제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드
전문 124		미네엠 주 Magnesium sulfate 0.5g/5mL	경련, 자간, 전해질보급(저마그네슘혈증), 자궁경직(분만촉진)	1~5g을 근육 또는 천천히 정맥주사, 전해질보급을 위해서는 1일 2~4g을 수회 분할하여 근육 또는 매우 천천히 정맥주사	25A	비급여 (669904701)

비타민제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드
전문 319		멀티비타 주 Cyanocobalamin 5µg Biotin 60µg Folic acid 400µg Tocopherol acetate 10mg Dexpanthenol 15mg Nicotinic acid amide 40mg Ascorbic acid 100mg Riboflavin sodium phosphate 3.6mg Thiamine HCl 3.81mg Pyridoxine HCl 4.86mg Ergocalciferol 5µg(200IU) Retinol palmitate 1.815mg(3,300IU)	1. 수액제료 영양을 공급받는 환자의 비타민 유지요법 2. 다음 환자의 비타민(비타민 K제외) 결핍 예방 - 외과수술시, 중증화상, 골절 및 기타 외상 - 중증감염증, 혼수상태	11세 이상의 소아 및 성인 : 이 약에 주사용 증류수 5 mL를 가볍게 흔들 어 녹인 다음, 5분 이내에 정맥주사 용 포도당 주사액, 생리식염 주사액 또는 이와 유사한 수액제 500~ 1,000 mL에 혼합하여 1일 1회 점적 정맥주사	10V	비급여 (669906440)
전문 239		펜타비타 주 Dexpanthenol 500mg/2mL	판토텐산결핍증의 예방 및 치료, 판토텐산 의 수요가 증대하고 식사로부터 섭취가 불 충분한 때의 보급	1회 20~100mg 1일 1~2회 근육 또는 정맥주사, 수술 후 장관 마비에는 1회 50~500mg 1일 1~3회 투여, 필요시 6회까지 증가	50A	비급여 (669904690)
전문 312		푸르민 주 5mg Fursultiamine HCl 54.6mg/10mL	비타민 B1 결핍증의 예방 및 치료, 비타민 B1의 수요가 증대하여 음식으로부터 섭취가 불충분한 때의 보급 등	통상 성인 1일 5~100mg을 피하근 육 내 또는 정맥내에 주사	10A	비급여 (669904210)
전문 313		헥사비타 주 Pyridoxine HCl 100mg/2mL	비타민 B6 결핍증의 예방 및 치료, 비타민 B6의 수요가 증대하여, 식사로부터의 섭취 가 불충분할 경우	1일 10~100mg을 1~2회 분할하여 근육, 피하 또는 정맥주사	50A	비급여 (669904680)
전문 314		대한뉴팜 비타민씨 주 10g Ascorbic acid 10g/20mL	비타민 C 결핍증의 예방과 치료, 비타민 C 의 요구량이 증가하는 경우	1일 50~1,000mg을 1일 1회~수회 분할하여 피하, 근육 또는 정맥주사	10A	비급여 (669900560)
전문 311		바이타디 주 Cholecalciferol 5mg (200,000IU)/1mL	비타민 D가 결핍된 고령자 및 청소년에서의 비타민 D 결핍의 예방과 치료, 비타민 D가 결핍된 성인에서의 비타민 D 결핍의 치료	성인 : 콜레칼시페롤로서 200,000IU를 근육주사 청소년 : 콜레칼시페롤로서 200,000IU를 근육주사 고령자 : 콜레칼시페롤로서 100,000IU를 근육주사	5A	비급여 (669906220)



순환기계용제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드
전문 219		지타코 주 Ginkgo leaf extract 17.5mg/5mL	뇌혈액순환장애 및 뇌영양장애(뇌혈관부전), 지적 및 감각능력저하, 어지러움, 이명 등을 수반하는 뇌기능장애	1일 5~10mL를 근육주사 또는 정맥주사하거나 2일마다 15mL를 정맥주사	25A	비급여 (669903400)
전문 219		메조카틴 주 L-carnitine 2g/10mL	1. 1차성, 2차성 카르니틴결핍증 2. 허혈성심질환에 의한 심근대사장애 : 협심증, 급성심근경색 3. 혈액투석중인 말기 신 질환자의 카르니틴 결핍증 치료	1차성, 2차성 카르니틴결핍증 : 성인 1일 2~3g을 2~3회 분할하여 근육 또는 정맥주사	10A	비급여 (669905900)
전문 119		포스콜린 주 Choline alfoscerate 1g/4mL	1. 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군 : 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력감소 2. 감정 및 행동변화 : 정서불안, 자극과민성, 주위 무관심 3. 노인성 가성우울증	1일 1회 1g을 근육 또는 정맥주사	10A	비급여 (669906431)

무기질제제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드
전문 339		멀티트레이스 주 Selenious acid 327µg Chromic chloride hydrate 205µg Cupric sulfate pentahydrate 15.7mg Manganese sulfate monohydrate 3.08mg Zinc sulfate heptahydrate 43.9mg/10mL	경정맥 영양보급시 미량원소(아연, 구리, 망간, 셀레늄, 크롬)의 보급	의사의 처방에 따라 사용하되, 혈장 미량 원소량을 확인하여 용량 조절의 지침으로 삼음	10V	비급여 (669906880)
전문 322		셀렌 주 Selenious acid 654µg/10mL	비경구영양요법(TPN)시 셀레늄 보충	성인 : 대사가 안정적인 비경구영양요법(TPN)시 1일 셀레늄으로서 20~40µg(이 약은 셀레늄 40µg/mL를 포함)을 주사	10V	비급여 (669906920)
전문 322		셀레네 주 sodium selenite pentahydrate 1.66mg/mL	영양공급으로 보충될 수 없는 셀레늄 결핍 환자에서 셀레늄 보급	셀레늄으로서 1일 100µg을 근육주사 또는 정맥주사 필요한 경우 1일 200µg 까지 증량 치료가 적절한지를 확인하기 위하여 셀레늄의 혈중농도를 측정, 만약 이 약을 종합 비경구 영양요법(TPN)기본 주사에 추가로 투여할 경우 반드시 1일 용량은 셀레늄으로서 100µg을 사용	10V	비급여 (669907071)
전문 322		대한뉴팜 염화마그네슘 주 10% Magnesium chloride 1g/10mL	1. 토르사드 드 포인트(Torsade de pointe)치료 2. 저마그네슘혈증을 동반한 급성 저칼륨혈증 치료 3. 전해질 불균형시 마그네슘 보충 4. 비 경구영양 공급시 마그네슘 보충 5. 자간전증(임신중독증) 위험의 예방 및 치료	토르사드 드 포인트(Torsade de pointe) 치료 : 마그네슘 8mmol (염화마그네슘 1.6g)을 천천히 정맥주사	10A	비급여 (669905890)
전문 322		징크에스 주 5mL Zinc sulfate hydrate 22mg (As Zinc 5mg)	비경구영양요법(TPN)시 아연 보충	대사적으로 안정한 TPN환자 : 2.5~4mg/일	10V	비급여 (669905811)
전문 322		징크에스 주 10mL Zinc sulfate hydrate 44mg (As Zinc 10mg)			10V	비급여 (669905541)

단백아미노산제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드
전문 325		프라세인엠 주 자하거추출물 2mL/2mL	갱년기 장애 증상의 개선	1회 2mL, 1주일에 3회씩 2주간 (총 6회) 피하주사	10A	비급여 (669904260)

해열진통소염제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드
전문 114		비코라민 주 Hydroxocobalamin 5mg/2mL	급성신경염, 다발성 신경염, 좌골신경통, 류마티양 관절염증후군, 척수근통, 견갑관 절주위염, 위염, 암 및 외상에 의한 신경통, 대상포진 및 편두통에 의한 신경통	1일 1회 근육주사 또는 정맥주사	50A	비급여 (669906481)
전문 114		뉴포팜 주 Netopam HCl 20mg/2mL	급성통증의 대증요법, 특히 수술 후 통증	1회 20mg, 근육 또는 정맥주사 필요한 경우 1일 120mg을 초과하지 않는 범위에서 6시간마다 반복투여	10A	비급여 (669906231)

기타약물

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드
전문 490		뉴디엔 주 Polydeoxyribonucleotide sodium 5.625mg/3mL	피부이식으로 인한 상처의 치료 및 조직 수복	1일 1바이알을 근육 또는 피하주사로 투여	10V	비급여 (669906640)
전문 395		리포라제 주 Hyaluronidase 1,500 I.U.	피하주사나 근육주사, 국소마취제 및 피하주입 시 침투력증가, 조직 내에 과다하게 존재하는 체액 및 혈액의 재흡수 촉진	피하주입시(대량피하주사) : 1바이알을 주사용수나 생리식염주사액 1mL에 녹여서 피하주입을 시작하기 전에 해당부위에 주사	10V	비급여 (669904600)
전문 399		이엔지 주 Adenosine triphosphate disodium trihydrate 21.96mg (As Adenosine triphosphate disodium 20mg)/2mL	근무력증, 심부전, 만성감염에 있어서의 간기능 개선, 두부외상 후유증, 조절성안정피로	보통성인 1회 5~20mg을 1~2회 피하, 근육 또는 정맥 주사	10A	비급여 (669906040)
전문 392		리코리스 주 Ammonium Glycyrhizinate 26.5mg Glycine 200mg Cysteine Hydrochloride Monohydrate 10mg /10mL	두드러기, 습진, 알레르기성 피부질환, 약물중독의 보조요법, 만성간질환의 간기능 개선	성인 : 1회 2~20mL, 1일 1회 만성간질환에는 1회 40~60mL, 1일1회 정맥 또는 점적정맥주사, 증량하는 경우에는 1일 최대 100mL를 초과하지 않는다.	50A	비급여 (669906281)
전문 399		신델라 주 Thioctic acid 25mg/5mL	티옥트산의 수요가 증대되는 경우의 보급 (격심한 육체노동시), Leigh증후군(아급성괴사성뇌척수염), 중독성 (스트렙토마이신, 가나마이신에 의한) 및 소음성(직업성)의 내이성 난청	성인 1일 1회 10~25mg을 정맥내 주사	10A	비급여 (669905780)
전문 399		리포익 주 Thioctic acid tromethamine 476.4mg (As Thioctic acid 300mg) /12mL	당뇨병성 다발신경병증의 완화	중증의 증상에 대해 티옥트산 1일 600mg을 2~4주간 정맥주사, 그 이후에 이 약으로 1일 600mg을 경구투여	10A	비급여 (669905970)



기타약물

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드
전문 399		바이온 주 Glutathione(reduced) 600mg	시스플라틴 또는 유사결핵 화학요법에 의한 신경성질환의 예방	중증의 경우 1일 600~1200mg을 근육 주사 또는 점적 정맥 주사	10V	비급여 (669902980)
전문 399		루치온 주 Glutathione(reduced) 600mg			10V	비급여 (669905750)
전문 399		루치온 주 1200mg Glutathione(reduced) 1200mg			10V	비급여 (669906030)

마취제

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드
일반 121		리도칸크림 Lidocaine 96mg/g	남성성기 축각의 예민성 감소	연고로서 0.25~0.66g (리도카인으로서 23~62mg)을 도포	500g	비급여 (669904793)

건강기능식품

구분 분류번호	성상	제품명·성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장	보험코드
		아스코르빈산포 3g Ascorbic acid 3g	아스코르빈산의 공급	물 또는 음료와 함께 섭취	100포	
		울트라파인 아스코르빈산 Ascorbic acid 3g	아스코르빈산의 공급	물 또는 음료와 함께 섭취	90포	
		MSM(엠에스엠) MSM(디메틸설폰) 2g	관절 및 연골건강에 도움	1일 1회, 1회 1포(2g)을 물과 함께 섭취	120포	
		슈퍼MSM 프로토콜 MSM(디메틸설폰) 750mg 비타민 C 300mg	관절 및 연골건강에 도움, 효과적인 신경통증 완화, 광범위한 활성산소 제거, 아스코르빈산의 공급	1회 2정, 1일 1회	180T	
		에니플러스 캡슐 비타민 C, 산화마그네슘, 결정셀룰로오스, L-티로신	[비타민 C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [마그네슘] 에너지 이용에 필요, 신경과 근육기능 유지에 필요	1회 1캡슐, 1일 2회	120C	
		카보글루엑스 캡슐 비타민 B1, 질산염, 비타민 B2, 비타민 B6, 엽산염, 비타민 C, 결정셀룰로오스, 환강낭콩추출물, 진피추출물, 유청질승	[비타민 B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민 B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민 C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요	1회 2캡슐, 1일 2회	300C	

의료기기*

제품	제품명	모델명	규격	니들	함량
	큐젤	N	1.0 ml / 1s	27G X 2ea	HA 20mg / ml
		MAX	1.1 ml / 1s	23G X 2ea	HA 20mg / ml
		MAX 1400	1.1 ml / 2s	23G X 4ea	HA 20mg / ml
		Ultra	2.0 ml / 1s	23G X 2ea	HA 20mg / ml
		Strong	3.0 ml / 1s	23G X 2ea	HA 20mg / ml
	큐젤 리도카인	Ultra	2.0 ml / 1s	23G X 2ea	HA 20mg / ml with 0.3% Lidocaine
		Strong	3.0 ml / 1s	23G X 2ea	HA 20mg / ml with 0.3% Lidocaine
	플로레 리도카인	Aqua-s	0.9 ml / 1s	30G X 2ea	HA 20mg / ml with 0.3% Lidocaine
		S	0.7 ml / 1s	30G X 2ea	HA 20mg / ml with 0.3% Lidocaine
		N	1.0 ml / 1s	27G X 2ea	HA 20mg / ml with 0.3% Lidocaine
		MAX	1.1 ml / 1s	23G X 2ea	HA 20mg / ml with 0.3% Lidocaine
		MAX 1400	1.1 ml / 2s	23G X 4ea	HA 20mg / ml with 0.3% Lidocaine
	플랑셀	N	1.0 ml / 1s	27G X 2ea	HA 20mg / ml with 0.3% Lidocaine
		MAX	1.1 ml / 1s	23G X 2ea	HA 20mg / ml with 0.3% Lidocaine
	청아안	MAX	1.1 ml / 1s	23G X 2ea	HA 20mg / ml with 0.3% Lidocaine
제품	제품명	효능·효과	규격·니들	함량	
	콜라플레오	(내·외과적) 처치 및 수술 시 결손 또는 손상된 인대, 건, 근육, 생체막 등을 보충하기 위해 사용하는 콜라겐 함유 물질	1.0 ml / 1s 22G x 2ea	Atelco collagen 3% / ml	

*제조원 : (주)한국비엔씨

New Platform for Life Care



본사(공장) : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 66
서울사무소 : 서울특별시 관악구 남현3길 61(남현동)
TEL : 02-581-2333

수정일: 2018년 4월 1일