


# Product List

by DaeHan New Pharm Co., Ltd.

대한뉴팜 제품 리스트

따뜻함을 함께하는 대한뉴팜이 건강과 행복을 책임집니다.





## 순환기계 용제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량  | 효능·효과  | 용법·용량   | 포장          | 보험코드<br>급여상한액              |
|------------|----|--|--|---|-------------|----------------------------|
| 전문<br>339  |    | 실로탈 정<br>Cilostazol 50mg   | 만성동맥폐색증에 따른 궤양, 동통 및 냉감 등 허혈성 재증상의 개선, 뇌경색(심인성 뇌색전증 제외) 발증 후 재발억제  | 1회 2정, 1일 2회  | 30T<br>500T | 669902380<br><b>250원</b>   |
| 전문<br>218  |    | 뉴피도 정<br>Clopidogrel 75mg  | 1. 허혈뇌졸중, 심근경색 또는 말초동맥질환이 있는 성인 환자에서 죽상동맥경화성 증상의 개선<br>2. 급성관상동맥증후군(불안정성 협심증 또는 비Q파 심근경색 환자)에 있어서 약물치료 또는 관상중재시술(PCI)stent 시술을 하거나 하지 않은 경우) 및 관상동맥 회로우회술(CABG)을 받았거나 받을 환자를 포함)이 있는 성인 환자에서 죽상동맥경화성 증상(심혈관계 이상으로 인한 사망, 심근경색, 뇌졸중 또는 불응성 허혈)의 개선<br>3. 한 가지 이상의 혈관성 위험인자를 가지고 있고, 비타민 K 길항제(VKA) 투여가 적합하지 않으며, 출혈 위험이 낮은 심방세동 성인 환자에서 뇌졸중을 포함한 죽상 혈전증 및 혈전색전증의 위험성 감소 | ○ 성인<br>1. 허혈뇌졸중, 심근경색 또는 말초동맥성 질환이 있는 환자: 클로피도로그렐로서 1일 1회 75mg을 경구투여<br>2. 급성관상동맥증후군(불안정성 협심증 또는 비Q파 심근경색)이 있는 환자: 1일 1회 300mg을 부하용량 (loading dose)으로 시작하고 이후에 1일 1회 75mg을 유지용량으로 경구투여, 아스피린 75~325mg을 1일 1회 이 약과 병용투여<br>3. 심방세동 환자에는 이 약으로서 1일 1회 75mg을 경구투여, 아스피린 75~100mg을 1일 1회 이 약과 병용투여 | 30T<br>100T | 669906370<br><b>1,164원</b> |
| 전문<br>217  |    | 메타진 정<br>Trimetazidine HCl 20mg  | 1차 항협심증 치료제로 적절히 조절되지 않거나, 내약성이 없는 안정형 협심증 환자의 증상적 치료를 위한 병용요법   | 1회 1정, 1일 3회  | 30T<br>300T | 669901470<br><b>77원</b>    |
| 전문<br>214  |    | 테르탄 정 40mg<br>Telmisartan 40mg   | 1. 본태성 고혈압<br>2. 심혈관 질환의 위험성 감소<br>안지오텐신 전환효소(ACE) 저해제를 내약성으로 투여할 수 없으며, 주요 심혈관 질환이 발생할 위험성이 높은 만 55세 이상의 환자(관상동맥질환, 말초동맥질환, 뇌졸중, 일과성 허혈 발작에 대한 과거 병력이 있거나 말단 장기 손상의 임상적 증거가 있는 고위험성 당뇨병 환자)에서 심근경색, 뇌졸중 및 심혈관 질환으로 인한 사망의 위험성 감소  | 1. 본태고혈압<br>성인 : 텔미사르탄으로서 1일 1회 40mg 경구투여, 환자에 따라 1일 1회 20 mg으로 유효하며 필요한 경우 1일 1회 80mg까지 증량 가능<br>2. 심혈관 질환의 위험성 감소<br>성인 : 이 약으로서 1일 1회 80 mg 경구투여   | 30T         | 669906790<br><b>426원</b>   |
| 전문<br>214  |    | 테르탄 정 80mg<br>Telmisartan 80mg   | 1. 고혈압, 관상동맥의 고정폐쇄(안정형협심증) 또는 관상혈관계의 혈관경련과 혈관수축(이형협심증)에 의한 심근성허혈증<br>2. 최근 혈관조영술로 관상동맥질환이 확인된 환자로 심부전이 없거나 심박출량이 40% 미만인 아닌 환자의<br>-협심증으로 인한 입원의 위험성 감소<br>-관상동맥 혈관재생술에 대한 위험성 감소  | 성인 : 암로디핀으로서 1일 1회 5mg을 경구투여하며 환자의 반응에 따라 1일 최고 10mg까지 증량   | 30T<br>300T | 669906800<br><b>573원</b>   |
| 전문<br>214  |    | 암로크 정<br>Amlodipine besylate 6.944mg<br>(As Amlodipine 5mg)            | 1. 고혈압, 관상동맥의 고정폐쇄(안정형협심증) 또는 관상혈관계의 혈관경련과 혈관수축(이형협심증)에 의한 심근성허혈증<br>2. 최근 혈관조영술로 관상동맥질환이 확인된 환자로 심부전이 없거나 심박출량이 40% 미만인 아닌 환자의<br>-협심증으로 인한 입원의 위험성 감소<br>-관상동맥 혈관재생술에 대한 위험성 감소  | 초기용량 : 1일 1회 2mg<br>증량이 필요한 경우 : 1일 1회 4mg~6mg  | 30T<br>300T | 669906560<br><b>367원</b>   |
| 전문<br>214  |    | 라핀 정<br>Lacidipine 4mg   | 단독투여 또는 다른 혈압강화제와의 병용투여에 의한 고혈압의 치료  | 1일 1회 1정  | 90T         | 669901020<br><b>393원</b>   |
| 전문<br>214  |    | 대한뉴팜 로잘탄플러스 정<br>Losartan potassium 50mg<br>Hydrochlorothiazide 12.5mg | 단일요법으로 혈압이 적절히 조절되지 않는 고혈압   | 1일 1회 1정  | 30T<br>300T | 669900550<br><b>282원</b>   |
| 전문<br>214  |    | 엔피포지 정 5/80mg<br>Valsartan 80mg<br>Amlodipine 5mg                      | 암로디핀 또는 발사르탄 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압   | 1일 1회 1정  | 30T         | 669905910<br><b>805원</b>   |
| 전문<br>214  |    | 엔피포지 정 5/160mg<br>Valsartan 160mg<br>Amlodipine 5mg                    |  |   | 28T         | 669905920<br><b>988원</b>   |
| 전문<br>214  |    | 엔피포지 정 10/160mg<br>Valsartan 160mg<br>Amlodipine 10mg                  |  |   | 60T         | 669905930<br><b>1,128원</b> |

## 순환기계 용제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량  | 효능·효과  | 용법·용량                                | 포장          | 보험코드<br>급여상한액              |
|------------|----|--|--|--------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 전문<br>214  |    | 엔피스타 정 40/5mg<br>Telmisartan 40mg<br>Amlodipine 5mg                  | 텔미사르탄 또는 암로디핀 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압  | 1일 1회 1정<br>(식사와 관계없이 복용)            | 30T         | 669906990<br><b>706원</b>   |
| 전문<br>214  |    | 엔피스타 정 40/10mg<br>Telmisartan 40mg<br>Amlodipine 10mg                |  |                                      | 30T         | 669906970<br><b>762원</b>   |
| 전문<br>214  |    | 엔피스타 정 80/5mg<br>Telmisartan 80mg<br>Amlodipine 5mg                  |  |                                      | 30T         | 669906980<br><b>853원</b>   |
| 전문<br>218  |    | 로바타딘 정<br>Lovastatin 20mg  | 원발성고지혈증 : 고콜레스테롤혈증(IIa형), 고콜레스테롤혈증과 고트리글리세라이드혈증의 복합형(IIb형) 고지혈증에 의한 관동맥질환의 발병 위험성 감소                     | 1일 20mg~80mg, 1-수회 분할 경구투여           | 30T<br>500T | 669901090<br><b>359원</b>   |
| 전문<br>218  |    | 뉴토르 정 10mg<br>Atorvastatin calcium 10.84mg<br>(As Atorvastatin 10mg) | 심혈관계 질환에 대한 위험성감소, 원발성 고콜레스테롤혈증 및 혼합형 이상지질혈증 환자의 콜레스테롤 개선  | 1일 1회 10mg~80mg의 용량범위로 투여            | 30T<br>100T | 669905840<br><b>663원</b>   |
| 전문<br>218  |    | 뉴토르 정 20mg<br>Atorvastatin calcium 21.69mg<br>(As Atorvastatin 20mg) |  |                                      | 30T<br>100T | 669906010<br><b>712원</b>   |
| 전문<br>218  |    | 뉴스토 정 10mg<br>Rosuvastatin calcium 10.40mg<br>(As Rosuvastatin 10mg) | 원발성 고콜레스테롤혈증(type IIa), 복합형 고지혈증 (type IIb)  | 초회용량 : 1일 1회 1/2정<br>유지용량 : 1일 1회 1정 | 28T         | 669906020<br><b>612원</b>   |
| 전문<br>218  |    | 엔피토린 정 10/10mg<br>Simvastatin 10mg<br>Ezetimibe 10mg                 | 원발성 고콜레스테롤혈증, 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증(HoFH)  | 1일 1회 1정, 저녁에 투여                     | 30T         | 669906750<br><b>784원</b>   |
| 전문<br>218  |    | 엔피토린 정 10/20mg<br>Simvastatin 20mg<br>Ezetimibe 10mg                 |  |                                      | 30T         | 669906620<br><b>1,095원</b> |
| 전문<br>396  |    | 그리자이드 정<br>Gliclazide 80mg   | 제 2형 당뇨병(식사요법, 운동요법으로 충분한 효과를 얻을 수 없는 경우에 한함)  | 1일 40~80mg으로 시작<br>1일 1~2회 경구투여      | 30T<br>500T | 669900170<br><b>82원</b>    |
| 전문<br>396  |    | 게리메트 정 2/500mg<br>Glimepiride 2mg<br>Metformin HCl 500mg             | 인슐린 비의존성 당뇨병(제2형)환자에서 식이요법 및 운동요법과 병행하여 글리메피리드 또는 메트포르민 단독요법으로 혈당조절효과가 불충분한 경우 또는 글리메피리드와 메트포르민 병용요법의 대체 | 1회 1정, 1일 1~2회                       | 30T<br>100T | 669905520<br><b>197원</b>   |

## 신경계 용제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량   | 효능·효과                               | 용법·용량                | 포장  | 보험코드<br>급여상한액              |
|------------|----|---|-------------------------------------|----------------------|-----|----------------------------|
| 전문<br>218  |    | 엔피셉트 정 10mg<br>Donepezil HCl 10mg                                       | 알츠하이머형 치매증상의 치료                     | 1일 1회 5~10mg, 취침전 투여 | 30T | 669906610<br><b>2,460원</b> |
| 전문<br>218  |    | 엔피셉트 정 5mg<br>Donepezil HCl 5mg   |                                     |                      | 30T | 669906730<br><b>2,060원</b> |
| 전문<br>219  |    | 스포르틴 정<br>Acetyl L-carnitine HCl 590mg<br>(As Acetyl L-carnitine 500mg) | 일차적 퇴행성 질환 또는 뇌혈관 질환에 의한 이차적 퇴행성 질환 | 1회 1정, 1일 2~3회       | 60T | 651500790<br><b>572원</b>   |



## 소화기계 용제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량   | 효능·효과   | 용법·용량  | 포장          | 보험코드<br>급여상한액              |
|------------|----|---|---|--|-------------|----------------------------|
| 전문<br>232  |    | 에스오엠 정 20mg<br>Esomeprazole 20mg  | 1. 위식도 역류질환(GERD)<br>2. 헬리코박터피로리 박멸을 위한 항생제 병용요법<br>3. 비스테로이드소염진통제(COX-2 비선택성, 선택성) 투여와 관련된 상부 위장관 증상(통증, 불편감, 작열감) 치료의 단기요법<br>4. 지속적인 비스테로이드소염진통제 투여가 필요한 환자<br>5. Zollinger-Ellison 증후군의 치료<br>6. 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후의 유지 요법  | 1일 1회 20~40mg<br>(단, Zollinger-Ellison 증후군의 치료는 1일 2회 40~80mg)   | 28T         | 669906390<br><b>764원</b>   |
| 전문<br>232  |    | 에스오엠 정 40mg<br>Esomeprazole 40mg  |   |  | 28T         | 669906410<br><b>1,078원</b> |
| 전문<br>232  |    | 대한뉴팜 오엠프라졸 캡슐<br>Omeprazole 20mg  | 1. 위궤양, 십이지장궤양의 단기치료<br>2. 역류성 식도염 및 위식도 역류질환(GERD)의 증상(가슴앓이, 토출 등) 치료<br>3. 심한 역류성 식도염과 잘 치료되지 않는 소화성 궤양의 유지요법<br>4. Zollinger-Ellison 증후군<br>5. Helicobacter pylori 에 감염된 십이지장궤양의 재발 방지를 위한 항생제 병용요법<br>6. 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 투여로 인한 위·십이지장궤양 또는 미란의 치료<br>7. 위·십이지장 병변의 병력이 있는 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 장기투여 환자에서 NSAID 투여로 인한 위·십이지장궤양 또는 미란 및 소화 불량증상의 예방<br>8. 역류성식도염의 재발방지 | 1회 1캡슐, 1일 1회  | 28C         | 669900700<br><b>789원</b>   |
| 전문<br>232  |    | 라피졸 정 10mg<br>Rabeprazole sodium 10mg   | 1. 위·십이지장궤양<br>2. 미란성 또는 궤양성 위식도역류질환<br>3. 위식도역류질환 증상 완화<br>4. 위식도역류질환 장기간 유지요법<br>5. Helicobacter pylori에 감염된 소화기 궤양 환자에 대한 항생제 병용요법<br>6. Zollinger-Ellison 증후군   | 1. 위·십이지장궤양: 1일 1회 10mg<br>2. 미란성 또는 궤양성 위식도역류질환: 1일 1회 10mg 또는 20mg<br>3. 위식도역류질환 증상 완화: 1일 1회 10mg<br>4. 위식도역류질환 장기간 유지요법: 1일 10mg 또는 20mg<br>5. 헬리코박터피로리 제균: 본제 20mg+클래리트로마이신 500mg+아목시실린 1g 1일 2회, 7일간<br>6. Zollinger-Ellison 증후군: 1일 1회 60mg | 28T         | 669906270<br><b>534원</b>   |
| 전문<br>232  |    | 라피졸 정 20mg<br>Rabeprazole sodium 20mg   |   |  | 28T         | 669906260<br><b>1,069원</b> |
| 전문<br>232  |    | 카밀란 정<br>Ranitidine HCl 168mg<br>(As Ranitidine 150mg)                              | 위·십이지장궤양, Zollinger-Ellison 증후군, 역류성식도염, 마취전 투약(멘델슨 증후군 예방), 수술후 궤양, NSAID 투여로 인한 위·십이지장궤양, 급성위염, 만성위염의 급성악화기, 상부 소화관 출혈  | 1회 1정, 1일 2회   | 30T<br>500T | 669903530<br><b>134원</b>   |
| 전문<br>232  |    | 뉴잔틴 캡슐 150mg<br>Nizatidine 150mg  | 1. 활동성 위, 십이지장 궤양 치료 및 십이지장 궤양 재발 방지<br>2. 내시경상으로 진단된 미란성 및 궤양성식도염, 위식도 역류질환(GERD)에 기인한 가슴쓰림(heartburn) 증상의 치료<br>3. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성 악화기   | 1일 1회 300mg 또는 1회 150mg<br>1일 2회 아침, 저녁으로 투여   | 30C<br>300C | 669906420<br><b>356원</b>   |
| 전문<br>232  |    | 제이에스 시메티딘 정<br>Cimetidine 200mg   | 위·십이지장궤양, 역류성식도염, 재발성궤양, 문합부궤양, Zollinger-Ellison 증후군, 급성위염, 만성위염의 급성악화기의 위점막병변 개선  | 1회 2정, 1일 2회 또는<br>1일 1회(취침시) 4정   | 1000T       | 699800740<br><b>69원</b>    |
| 전문<br>232  |    | 무코란 정<br>Rebamipide 100mg   | 1. 위궤양<br>2. 급성위염, 만성위염의 급성악화기의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선   | 1회 1정, 1일 3회<br>(위궤양: 아침, 저녁 및 취침전에 투여)  | 30T<br>500T | 669901570<br><b>103원</b>   |
| 전문<br>239  |    | 레보란 정<br>Levosulpiride 25mg   | 기능성소화불량으로 인한 다음 증상의 완화: 복부 팽만감, 상복부불쾌감, 속쓰림, 트림, 구역, 구토   | 1회 1정, 1일 3회 식전 투여   | 30T<br>500T | 669901040<br><b>119원</b>   |
| 전문<br>239  |    | 모사가틴 정<br>Mosapride citrate 5mg   | 기능성소화불량으로 인한 소화기증상(속쓰림, 구역, 구토)   | 1일 3정을 3회로 나누어 식전 또는 식후에 투여  | 30T<br>300T | 669906080<br><b>103원</b>   |
| 전문<br>232  |    | 엔피렌 정<br>Artemisiae argyi folium 95% ethanol ext.(20→1) 60mg                        | 급성위염, 만성위염의 위점막 병변 개선, NSAIDs 투여로 인한 위염의 예방   | 1회 1정, 1일 3회   | 30T<br>500T | 669906150<br><b>124원</b>   |
| 전문<br>237  |    | 아시토바 캡슐 300mg<br>Lactobacillus acidophilus 300mg<br>(생균수로서 1.0 X 10 <sup>9</sup> 개) | 장장, 변비, 묽은 변, 복부 팽만감, 장내이상발효  | 1. 성인 및 12세 이상의 소아: 락토바실루스아시도필루스균으로서 1회300mg(생균수로서 1 X 10 <sup>9</sup> 개)을 1일 1~3회 복용<br>2. 8세이상 12세 미만의 소아: 이 약으로서 1회 300mg(생균수로서 1 X 10 <sup>9</sup> 개)을 1일 1~2회 복용  | 30C<br>500C | 669902600<br><b>117원</b>   |

## 소화기계 용제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량                                | 효능·효과  | 용법·용량                     | 포장          | 보험코드<br>급여상한액           |
|------------|----|--|--|---------------------------|-------------|-------------------------|
| 전문<br>239  |    | 뉴콘 정<br>Calcium polycarbophil 625mg      | 만성변비, 비특이성 설사, 과민대장증후군에서의 변비 보조요법 및 설사   | 성인: 1회 2정 1일 1~4회<br>경구투여 | 30T<br>500T | 669906630<br><b>89원</b> |
| 일반<br>239  |    | 탐부틴 정 200mg<br>Trimebutine maleate 200mg | 식도역류 및 열공헤르니아, 위, 십이지장염, 위, 십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상(복통, 소화불량, 구역, 구토), 과민성대장증후군 및 경련성 결장<br>소아 질환: 습관성 구토, 비강염성 장관 통과 장애(변비, 설사), 동요자극, 수면장애 | 1회 1/2~1정, 1일 3회          | 500T        | 비급여<br><b>120원</b>      |

## 호흡기계 용제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량   | 효능·효과  | 용법·용량   | 포장          | 보험코드<br>급여상한액               |
|------------|----|---|--|---|-------------|-----------------------------|
| 일반<br>222  |    | 에스틴캡슐 300mg<br>Erdosteine 300mg   | 급·만성 호흡기질환에서의 점액용해 및 거담  | 1회 300mg, 1일 2~3회   | 30C<br>500C | 669906660<br><b>196원</b>    |
| 전문<br>222  |    | 엘피진 정<br>Levodropropizine 60mg  | 급·만성 기관지염에서의 기침  | 1회 1정, 1일 3회  | 30T<br>300T | 669902980<br><b>146원</b>    |
| 일반<br>222  |    | 뮤시딘 캡슐 200mg<br>Acetylcysteine 200mg  | 급·만성기관지염, 기관지천식, 후두염, 부비동염, 낭성 섬유증에서의 객담배출곤란   | 급성질환: (성인) 1회 1캡슐, 1일 3회<br>만성질환: (성인) 1회 1캡슐 1일 2회<br>낭성섬유증: (6세 이상 소아) 1회 1캡슐, 1일 3회            | 30C<br>500C | 669901590<br><b>81원</b>     |
| 일반<br>222  |    | 헤데란 시럽<br>Ivy leaf 70% ethanol fluid ext. 20mg/mL   | 만성 염증성 기관지 질환의 증상 개선, 기침을 동반한 호흡기의 급성 염증 완화  | 1. 성인 및 15세 이상: 1회 100 mg, 1일 3회<br>2. 4~14세: 이 약으로서 1회 100 mg, 1일 2회<br>3. 2~3세: 1회 50 mg, 1일 3회 | 500mL       | 669904421<br><b>34원</b>     |
| 전문<br>229  |    | 뉴카민 시럽<br>Pelargonium sidoides 11% ethanol ext.(1→8~10) · glycerin mixed solution(8:2) 0.1716g/mL | 급성 기관지염  | 1. 성인 및 12세 이상: 1회 9mL, 1일 3회<br>2. 6세 이상~12세 미만: 1회 6mL, 1일 3회<br>3. 1세 이상~6세 미만: 1회 3mL, 1일 3회  | 500mL       | 669905561<br><b>28원</b>     |
| 전문<br>141  |    | 레보티진 정<br>Levocetirizine HCl 5mg  | 계절성 알레르기성 비염 또는 다년성 알레르기성 비염(지속적 알레르기성 비염 포함), 만성 특발성 두드러기, 가려움증을 동반한 피부염 및 습진(하이드로코르티손 외용제와 병용)의 증상완화 | 1일 1회 1정  | 30T<br>300T | 669906090<br><b>210원</b>    |
| 전문<br>149  |    | 아젤라스 정<br>Azelastine HCl 1mg  | 기관지천식, 알러지성 비염, 두드러기, 습진, 피부염, 아토피성피부염, 피부소양증, 가려움   | 1회 1정, 기관지 천식인 경우 1회 2mg, 1일 2회(아침식사후 및 취침 전)   | 30T<br>300T | 669906050<br><b>176원</b>    |
| 전문<br>149  |    | 몬테스트 정 10mg<br>Montelukast 10mg   |  | 성인 및 15세 이상의 청소년: 1일 1회 10mg 경구투여   | 28T         | 669906860<br><b>774원</b>    |
| 전문<br>149  |    | 몬테스트 추정 4mg<br>Montelukast 4mg  | 1. 천식의 방지 및 지속적 치료<br>2. 계절 및 연중 알레르기비염 증상 완화  | 2~5세 어린이: 1일 1회 4mg을 씹어서 복용   | 28T         | 669906820<br><b>695원</b>    |
| 전문<br>149  |    | 몬테스트 추정 5mg<br>Montelukast 5mg  |  | 6~14세 어린이: 1일 1회 5mg을 씹어서 복용  | 28T         | 669906830<br><b>774원</b>    |
| 전문<br>132  |    | 모메탈 나잘스프레이<br>Mometasone furoate 50mcg/1dose  | 계절 알레르기비염 및 연중비염, 중등도~중증의 계절 알레르기 비염의 증상 예방요법, 비염증, 중증의 세균 감염이 없는 급성 비부비동염                             | 알레르기 비염, 비염증: 1회 각 비공에 2번씩 1일 1회<br>급성 비부비동염: 1회 각 비공마다 2번씩 1일 2회                                 | 140dose     | 669905171<br><b>10,691원</b> |



## 해열진통소염제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량  | 효능·효과   | 용법·용량  | 포장          | 보험코드<br>급여상한액            |
|------------|----|--|---|--|-------------|--------------------------|
| 전문<br>114  |    | 록스파인 정<br>Loxoprofen sodium hydrate 68,1mg<br>(As Loxoprofen sodium 60mg)              | 만성관절류마티스, 변형성관절증, 요통, 견관절주위염, 경관절증후군의 소염진통, 수술후, 외상후 및 발치후의 소염·진통, 급성상기도염의 해열, 진통       | 1회 1정, 1일 3회   | 30T<br>500T | 669901120<br><b>125원</b> |
| 전문<br>114  |    | 무파인 정<br>Acetaminophen 325mg<br>Tramadol HCl 37.5mg                                    | 중등도-중증의 급·만성 통증   | 1회 2정, 최대 8정<br>(최소 6시간 간격투여)  | 30T<br>300T | 669904810<br><b>190원</b> |
| 전문<br>114  |    | 무파인 세미 정<br>Acetaminophen 162.5mg<br>Tramadol HCl 18.75mg                              | 중등도-중증의 급·만성 통증   | 1회 4정, 최대 16정<br>(최소 6시간 간격투여)   | 30T<br>300T | 669904800<br><b>126원</b> |
| 전문<br>114  |    | 무파인 서방정<br>Acetaminophen 650mg<br>(속방층 325mg, 서방층 325mg)<br>Tramadol HCl 75mg          |   | 1회 1정, 최대 4정<br>(최소 12시간 간격투여)   | 30T<br>100T | 669906400<br><b>418원</b> |
| 전문<br>114  |    | 무파인 세미 서방정<br>Acetaminophen 325mg<br>(속방층 162.5mg, 서방층 162.5mg)<br>Tramadol HCl 37.5mg |   | 1회 2정, 최대 8정<br>(최소 12시간 간격투여)   | 30T<br>100T | 669906380<br><b>279원</b> |
| 전문<br>114  |    | 아세파인 정<br>Aceclofenac 100mg  | 류마티스관절염, 강직척추염, 골관절염(퇴행관절염) 및 견갑상완골의 관절주위염, 치통, 외상 후 생기는 염증, 요통, 좌골통, 비관절성 류머티즘으로 인한 통증 | 1회 1정, 1일 2회   | 30T<br>500T | 669902550<br><b>188원</b> |
| 전문<br>114  |    | 모루밍 정<br>Morniflumate 350mg  | 호흡기질환(후두염, 기관염, 기관지염), 이비인후과질환(부비동염, 이염, 편도염, 인두염), 골관절질환 및 증상의 진통·소염                   | 1회 1정, 1일 2회   | 30T<br>300T | 669906130<br><b>170원</b> |
| 전문<br>114  |    | 메록캠 캡슐<br>Meloxicam 7.5mg  | 통증과 운동실조를 수반하는 골관절염(퇴행관절염)의 급성악화시 단기간의 증상치료, 류마티스관절염의 증상 치료, 강직척추염의 증상 치료               | 골관절염(퇴행관절염)의 급성악화시 :<br>1회 1캡슐, 1일 1회<br>류마티스관절염, 강직척추염 :<br>1회 2캡슐, 1일 1회 | 30C<br>500C | 669905880<br><b>270원</b> |

## 항생제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량  | 효능·효과   | 용법·용량   | 포장                      | 보험코드<br>급여상한액            |
|------------|----|--|---|---|-------------------------|--------------------------|
| 전문<br>618  |    | 아목탐 정 500mg<br>Amoxicillin 250mg<br>Pivoxyl subactam 250mg   | 중이염, 부비강염, 인두염, 후두염, 기관지염, 폐렴, 상하부 요로 감염증, 피부 및 상처 감염증  | 1회 1~2정, 1일 3회 경구투여   | 30T<br>300T             | 669902510<br><b>471원</b> |
| 전문<br>618  |    | 아목클 정 375mg<br>Amoxicillin hydrate 250mg<br>Potassium clavulanate diluted 212.73mg<br>(As Potassium clavulanate 125mg) | 급·만성 기관지염, 대염성 및 기관지 폐렴, 농흉, 폐농양, 편도염, 부비동염, 중이염, 방광염, 요도염, 신우신염, 패혈성 유산, 산욕기 패혈증, 골반감염, 연성하감, 임질, 종기 및 농양, 연조직염, 상처감염, 복막염, 골수염, 패혈증, 복부내 패혈증, 치과 감염 | 성인 및 12세 이상 또는 체중 40Kg 이상 소아 : 아목시실린의 양으로서<br>1회 250mg, 1일 3회<br>(중증 및 호흡기 감염 시 아목시실린의 양으로서 1회 500mg) | 80T                     | 669905950<br><b>353원</b> |
| 전문<br>618  |    | 아목클 정 625mg<br>Amoxicillin hydrate 500mg<br>Potassium clavulanate diluted 212.73mg<br>(As Potassium clavulanate 125mg) |   | 경,중등도 감염 : 1일 Kg당<br>25mg/3.6mg을 2회 나누어 복용<br>중증감염 : 1일 Kg당 45mg/6.4mg<br>을 2회 나누어 복용                 | 40T                     | 669905960<br><b>568원</b> |
| 전문<br>618  |    | 아목클 시럽<br>Amoxicillin 40mg/mL<br>Clavulanate potassium 5.7mg/mL  |   | 30T<br>100T   | 669906001<br><b>81원</b> |                          |
| 전문<br>619  |    | 클래마신 정<br>Clarithromycin 250mg   | 허기도감염증 : 기관지염, 폐렴 등 상기도감염증 : 인두염, 부비동염 등 피부 및 피부조직 감염증 미코박테륨 아비움, 미코박테륨 인트라셀룰라에기인한 미코박테리아 감염증 심이장장애 환자의 헬리코박터 파일로리 박멸                                 | 1회 250mg~500mg(역가), 1일 2회   | 30T<br>100T             | 669906310<br><b>865원</b> |
| 전문<br>619  |    | 클래마신 정 500mg<br>Clarithromycin 500mg   | 30T<br>200T   | 669906850<br><b>1,291원</b>  |                         |                          |

## 항생제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량   | 효능·효과   | 용법·용량   | 포장          | 보험코드<br>급여상한액            |
|------------|----|---|---|---|-------------|--------------------------|
| 전문<br>614  |    | 록시티로신 정<br>Roxithromycin 150mg                                | 인후두염, 급성기관지염, 편도염, 세균성폐렴, 미코플라스마폐렴 등 호흡기 감염증, 임균에 의한 감염을 제외한 생식기감염증 및 성병, 중이염, 부비동염, 모낭염, 종기, 종기증, 응충, 단독, 연조직염, 림프관(절)염, 생인손, 화농성 손발톱주위염, 피하농양 등 | 1회 1정, 1일 2회(폐렴 : 1일 1회 2정 아침 식전에 투여)   | 30T<br>500T | 669901130<br><b>376원</b> |
| 전문<br>618  |    | 세플러 캡슐<br>Cefaclor 250mg                                      | 중이염, 폐렴, 인후두염, 편도염, 기관지염, 신우신염, 방광염, 임균성 요도염, 부스럼, 응충, 모낭염, 연조직염, 감염성 죽종, 피하농양, 생인손, 창상감염   | 1회 1캡슐, 8시간마다 투여 중증 감염시 1회 2캡슐  | 30C<br>500C | 669902150<br><b>438원</b> |
| 전문<br>618  |    | 사프딘 캡슐 500mg<br>Cephadrine 500mg                              | 편도염, 인두염, 대염성폐렴, 기관지염, 방광염, 신우신염, 요도염, 전립선염, 농양, 연조직염, 종기, 농가진, 중이염   | 피부 및 연조직, 호흡기 감염증 :<br>1회 250mg~500mg, 1일 4회 또는<br>500mg~1g, 1일 2회<br>요로감염증 : 1회 1캡슐, 1일 2회 | 30C<br>500C | 669901920<br><b>205원</b> |
| 전문<br>629  |    | 엑센 정<br>Ofloxacin 100mg                                       | 모낭염, 종기, 큰종기, 알은연조직염(단독), 연조직염, 림프관(절)염, 손끝염(표재), 피하농양, 멍새염, 접촉성 여드름, 감염성 죽종, 항문주위 농양, 유선염, 외상, 열상, 수술상처 등의 표재성 2차감염 등                            | 3~6정, 1일 2~3회 분할 투여   | 30T<br>500T | 669902910<br><b>183원</b> |
| 전문<br>629  |    | 에프로신 정<br>Ciprofloxacin HCl 291mg<br>(As Ciprofloxacin 250mg) | 호흡기감염, 귀·코·인후감염·구강·치아·턱의 감염증, 신장 또는 요로 감염증, 임질을 포함한 성기감염증, 위장관감염증, 담즙분비관의 감염증, 피부 및 연조직의 감염과 상처, 골·관절의 감염증, 산부인과적 감염증, 패혈증, 복막염, 안과적 감염증          | 1회 1~2정, 1일 2회 식간 경구투여  | 30T<br>500T | 669902830<br><b>522원</b> |
| 전문<br>629  |    | 레비신 정<br>Levofloxacin 100mg                                   | 인후두염, 급성 기관지염, 만성 기관지염, 미만성 폐세 기관지염, 만성호흡기질환의 2차 감염, 폐렴, 기관지확장 증(감염시) 등   | 1회 1정, 1일 2~3회  | 30T<br>200T | 669901050<br><b>567원</b> |

## 근골격계 용제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량                   | 효능·효과  | 용법·용량        | 포장          | 보험코드<br>급여상한액            |
|------------|----|-----------------------------|--|--------------|-------------|--------------------------|
| 전문<br>122  |    | 에피손 정<br>Eperisone HCl 50mg | 경관절증후군, 견관절주위염, 요통에 수반하는 동통성 근육연축, 신경계 질환에 의한 경직성 마비 | 1회 1정, 1일 3회 | 30T<br>500T | 669902880<br><b>115원</b> |

## 골다공증 치료제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량  | 효능·효과   | 용법·용량                      | 포장   | 보험코드<br>급여상한액               |
|------------|----|--|---|----------------------------|------|-----------------------------|
| 전문<br>399  |    | 세로본플러스 정<br>Cholecalciferol concentrated powder 56mg<br>(As Cholecalciferol 5,600 I.U)<br>Riseditronate sodium 35mg  | 폐경 후 여성의 골다공증 치료와 예방, 남성의 골다공증 치료             | 1정을 매주 1회 경구 투여            | 4T   | 669906940<br><b>5,360원</b>  |
| 전문<br>399  |    | 알로본 플러스디 정<br>Cholecalciferol concentrate powder 53.33mg<br>(As Vitamin D <sub>3</sub> 5,600 I.U)<br>Alendronate sodium 91.37mg<br>(As Alendronic acid 70mg) | 폐경 후 여성의 골다공증 치료, 남성의 골다공증 치료                 | 1주 1회 1정                   | 4T   | 669906530<br><b>5,327원</b>  |
| 전문<br>399  |    | 엔피본 주<br>Ibandronate sodium monohydrate 3.375mg/3ml<br>(As Ibandronic acid 1mg/mL)   | 폐경 후 여성의 골다공증 치료                              | 3mg을 3개월에 한번씩 15~30초간 정맥주사 | 1s   | 669906741<br><b>54,246원</b> |
| 일반<br>321  |    | 시트라칼에프 정<br>Calcium citrate 750mg<br>(As Calcium 0.158g)<br>Cholecalciferol 4mg<br>(As Vitamin D 400I.U)   | 칼슘결핍 및 칼슘의 보급, 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방, 비타민 D의 보급 | 1일 1회, 1회 2정               | 300T | 669902360<br><b>70원</b>     |



## 비뇨기계 용제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량  | 효능·효과   | 용법·용량   | 포장          | 보험코드<br>급여상한액            |
|------------|----|--|---|---|-------------|--------------------------|
| 전문<br>259  |    | 테트린 정 2mg<br>Terazosin HCl 2,347mg<br>(As Terazosin 2mg) | 양성전립선비대에 의한 배뇨장애, 고혈압<br>(경증~중등도)   | 양성전립선비대에 의한 배뇨장애 :<br>초회량-취침전 ½정, 유지량-1일<br>1회 5-10mg 투여<br>고혈압 : 초회량-취침전 ½정, 유지<br>량-1일 1회 2-10mg 투여 | 30T<br>100T | 669903960<br><b>357원</b> |
| 전문<br>259  |    | 타로신서방 정 0.2mg<br>Tamsulosin HCl 0.2mg                    | 양성전립선비대증에 따른 배뇨장애   | 1일 1회 1정  | 30T<br>100T | 669906360<br><b>547원</b> |
| 전문<br>259  |    | 엔피스카 정<br>Finasteride 5mg                                | 양성전립선비대증  | 1일 1회 1정  | 30T         | 669906600<br><b>732원</b> |
| 전문<br>259  |    | 유로픽스 정<br>Propiverine HCl 20mg                           | 신경인성방광, 신경성빈뇨, 불안정방광,<br>방광자극상태 (만성방광염, 만성전립선염)에<br>의한 빈뇨, 요실금, 과활동 방광의 소변 절박감,<br>빈뇨 및 절박성 요실금 | 1일 1회 1정  | 30T<br>100T | 640900780<br><b>615원</b> |

## 항진균제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량                   | 효능·효과   | 용법·용량   | 포장          | 보험코드<br>급여상한액              |
|------------|----|-----------------------------|---|---|-------------|----------------------------|
| 전문<br>629  |    | 푸졸 캡슐<br>Fluconazole 50mg   | 급성 또는 재발성 질칸디다증, 면역기능이 정상<br>인 환자 및 면역기능저하 환자의 구강 인두,<br>식도, 비침습성 기관지 폐감염과 칸디다노증,<br>피부점막 및 만성위축성 구강칸디다증(의치료<br>인한 구강내 통증)등을 포함한 점막칸디다증 등 | 질칸디다증 : 1회 3캡슐<br>점막 칸디다증 : 1일 1회, 1캡슐<br>손 · 발톱진균증 : 1주 1회 3캡슐<br>피부 진균감염증 :<br>1일 1회 1캡슐 또는 1주 1회 3캡슐   | 30C<br>100C | 669904220<br><b>1,784원</b> |
| 전문<br>629  |    | 이코졸 정<br>Itraconazole 100mg | 칸디다성 질염, 어루러기, 피부사상균에<br>의한 체부백선, 고부백선(완선), 수부백선,<br>족부백선, 구강칸디다증, 진균성각막염,<br>손 · 발톱진균증, 전신진균감염증 등  | 칸디다성 질염 : 1회 2정, 1일 2회<br>어루러기 : 1일 1회 2정<br>체부백선, 고부백선(완선),<br>수부백선, 족부백선 : 1일 1회 1정<br>구강칸디다증 : 1일 1회 1정<br>진균성각막염 : 1일 1회 2정<br>손 · 발톱진균증 : 1회 2정, 1일 2회 | 28T<br>100T | 669905850<br><b>1,268원</b> |

## 항바이러스제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량                  | 효능·효과  | 용법·용량  | 포장  | 보험코드<br>급여상한액              |
|------------|----|----------------------------|--|--|-----|----------------------------|
| 전문<br>629  |    | 팜피악 정<br>Famciclovir 250mg | 대상포진 바이러스 감염증, 생식기포진 감<br>염증의 치료 및 재발성 생식기포진의 억제 | 대상포진 감염증 : 1회 1정, 1일 3회 7일간 투여<br>초발성 생식기포진 감염증 :<br>1회 1정, 1일 3회 5일간 투여 | 21T | 669904110<br><b>2,477원</b> |

## 부신피로르몬제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량                    | 효능·효과   | 용법·용량                | 포장          | 보험코드<br>급여상한액            |
|------------|----|------------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------------|
| 전문<br>245  |    | 히티손 정<br>Hydrocortisone 10mg | 1. 내분비 장애 : 원발성 및 속발성 만성 부신피질기능 부<br>전증, 급성 부신피질기능부전증, 이급성 갑상선염, 갑상선<br>질환에 수반되는 악성 안구돌출증, 부신피질자극 호르몬<br>단독결핍증, 특발성 저혈당증<br>2. 류마티스성 장애 : 급성진행 또는 악화를 방지하기 위<br>한 단기투여용 보조요법으로서 다음의 질환 : 만성 류마<br>티스양 관절염, 류마티스 열(류마티스성 심염을 포함) 등 | 1일 1~12정, 1~4회 분할 투여 | 30T<br>500T | 669906160<br><b>111원</b> |

## 모발용제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량                | 효능·효과                                      | 용법·용량    | 포장  | 보험코드<br>급여상한액 |
|------------|----|--------------------------|--|----------|-----|---------------|
| 전문<br>267  |    | 두피나 정<br>Finasteride 1mg | 성인 남성(만 18~41세)의 남성형 탈모증<br>(안드로겐 탈모증)의 치료 | 1일 1회 1정 | 30T | 비급여           |

## 여드름 치료제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량                     | 효능·효과   | 용법·용량  | 포장          | 보험코드<br>급여상한액            |
|------------|----|-------------------------------|---|--|-------------|--------------------------|
| 전문<br>311  |    | 아크논 연질캡슐<br>Isotretinoin 10mg | 다른 치료법으로 잘 치료되지 않는 중증의<br>여드름 (결절성, 낭포성, 응괴성), 특히 체간<br>병변과 관련된 낭포성 및 응괴성 여드름 | 1. 초기용량 : 이소트레티노인으로서 1일<br>체중 kg당 0.5mg을 반응을 관찰하며 투여<br>2. 유지용량 : 이 약으로서 1일 체중 kg당<br>0.5~1.0mg을 투여하며, 중증의 여드름<br>환자에게는 2mg까지 증량, 저용량의<br>경우는 1일1회, 고용량의 경우는 1일 2회<br>분할하여 식사와 함께 복용 | 30C<br>100C | 669906320<br><b>305원</b> |

## 정신신경계 용제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량  | 효능·효과                                  | 용법·용량                                     | 포장          | 보험코드<br>급여상한액                      |
|------------|----|--|--|---|-------------|------------------------------------|
| 전문<br>117  |    | 디프렌 캡슐<br>Fluoxetine HCl 22.4mg<br>(As Fluoxetine 20mg)      | 우울증, 신경성 식욕과화진증, 강박반응성<br>질환, 월경전 불쾌장애 | 1일 20~80mg 투여                             | 30C<br>300C | 669901000<br><b>435원</b><br>(363원) |
| 전문<br>117  |    | 디프렌 캡슐 10mg<br>Fluoxetine HCl 11.2mg<br>(As Fluoxetine 10mg) |  |   | 30C<br>300C | 비급여<br>(220원)                      |
| 전문<br>117  |    | 부프로 정<br>Bupropion HCl 100mg                                 | 우울증의 치료                                | 초기 : 1일 2회, 1회 1정<br>4일 이후 : 1일 3회, 1회 1정 | 100T        | 비급여                                |

## 비만 치료제

| 구분<br>분류번호   | 성상 | 제품명·성분·함량  | 효능·효과   | 용법·용량   | 포장          | 보험코드<br>급여상한액      |
|--------------|----|--|---|---|-------------|--------------------|
| 전문/항정<br>123 |    | 페스틴 정<br>Phentermine HCl 37.5mg<br>(As Phentermine 30mg)               | 초기 체질량지수(BMI)가 30kg/m <sup>2</sup> 이상, 또<br>는 다른 위험인자가 있는 BMI 27kg/m <sup>2</sup> 이<br>상인 외인성 비만 환자에서 운동, 행동 수<br>정 및 칼로리 제한을 기본으로 하는 체중<br>감량 보조요법                         | 1일 1회 1정  | 30T<br>100T | 비급여<br><b>770원</b> |
| 전문/항정<br>123 |    | 피티엠 정<br>Phentermine HCl 18.75mg<br>(As Phentermine 15mg)              |   | 1일 1회 2정 또는 1일 1~2회 1정  | 30T<br>100T | 비급여<br><b>440원</b> |
| 전문/항정<br>123 |    | 펜틴 정<br>Phendimetrazine tartrate 35mg                                  |   | 1일 2~3회 1정  | 300T        | 비급여<br><b>330원</b> |
| 일반<br>399    |    | 마메이드 정<br>Alginic acid 200mg<br>Carboxymethylcellulose<br>sodium 100mg | 음식물 섭취 감소를 통한 체중감량의 보조<br>요법  | 1일 3회 2정  | 300T        | 비급여<br><b>198원</b> |
| 전문<br>399    |    | 제로다온 캡슐 60mg<br>Orlistat 60mg  | 체질량 지수(BMI) 30kg/m <sup>2</sup> 이상 또는 다른<br>위험인자 (예, 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증)<br>가 있는 27kg/m <sup>2</sup> 이상의 비만환자에 있어<br>저칼로리 식이와 함께 체중감소 또는<br>체중유지를 포함한 비만치료 또는 체중 재<br>증가의 위험감소 | 지방을 함유하는 식사와 함께 복용<br>하거나 식사 후 1시간 이내에 오르<br>리스타트로서 1회 2캡슐, 1일 3회 | 84C         | 비급여                |
| 전문<br>399    |    | 제로팻 캡슐<br>Orlistat 120mg   | 체중유지를 포함한 비만치료 또는 체중 재<br>증가의 위험감소  | 지방을 함유하는 식사와 함께 복용<br>하거나 식사 후 1시간 이내에 오르<br>리스타트로서 1회 1캡슐, 1일 3회 | 84C         | 비급여                |



## 기타 치료제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량   | 효능·효과   | 용법·용량  | 포장          | 보험코드<br>급여상한액     |
|------------|----|---|---|--|-------------|-------------------|
| 전문<br>392  |    | 나렉스 정<br>Naltrexone HCl 25mg  | 적정 관리 프로그램과 병행하여 알코올의<br>존성 치료 및 외인성 아편류의 효과차단  | 1일 1회 2정   | 30T<br>100T | 비급여<br>1,125원     |
| 전문<br>113  |    | 토피 정 25mg<br>Topiramate 25mg  | 간질, 편두통의 예방   | 간질 : 처음 1주일 동안 저녁에 1정씩 투여<br>하고 1-2주 간격으로 1일 25 또는 50mg씩<br>증량하여 1일 2회(단독 요법으로서의 권장<br>용량은 1일 100~200mg)<br>편두통의 예방 : 처음 1주일 동안은 저녁에<br>1정으로 투여를 시작하고 1주 간격으로<br>25mg/일 씩 증량 | 30T<br>100T | 비급여<br>385원       |
| 전문<br>113  |    | 토피트 정<br>Topiramate 100mg   |   |  | 30T<br>100T | 비급여<br>880원       |
| 일반<br>114  |    | 카푸린에스 정<br>Ephedrine HCl 25mg<br>Caffeine anhydrous 25mg<br>Acetaminophen 200mg                                     | 감기의 재증상 (인후(목구멍)통, 기침, 가래,<br>오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화   | 1회 1정, 1일 3회   | 300T        | 비급여<br>140원       |
| 일반<br>114  |    | 나오미 정<br>방기황기탕건조엑스(7.52-1)<br>244mg   | 살색이 희고 피로하기 쉬우며, 땀이 잘나<br>는 경향이 있는 비만(근육에 긴장감이 없<br>고 물살잔) 관절통, 부종 증상   | 1회 4정, 1일 3회   | 360T        | 비급여<br>110원       |
| 전문<br>116  |    | 히스탄에프 정 16mg<br>Betahistine HCl 16mg  | 메니에르병에 의한 어지러움, 이명, 청력<br>소실  | 초기 용량 : 1회 16mg, 1일 3회<br>유지 용량 : 1일 24~48 mg  | 30T<br>300T | 비급여<br>165원       |
| 전문<br>116  |    | 히스탄에프 정 24mg<br>Betahistine HCl 24mg  |   |  | 30T<br>300T | 비급여<br>198원       |
| 일반<br>218  |    | 콜다운 연질캡슐<br>Pantethine 62.5mg<br>Unsaponifiable Matter of<br>soybean oil 100mg<br>Vitamine E(Tocopherol) 22.67 I.U. | 고콜레스테롤 혈증의 개선, 고콜레스테롤<br>혈증에 수반되는 말초혈행장애(수족냉증,<br>저림)의 완화   | 성인 1회 2캡슐, 1일 3회 식후 복용   | 300C        | 비급여<br>150원       |
| 일반<br>218  |    | 콜레스텐 연질캡슐<br>Safflower oil 333.33mg<br>(리놀산으로서 250mg)<br>Tocopherol acetate 6.67mg<br>Pyridoxine HCl 0.67mg         | 비만증, 당뇨병·본태성 고콜레스테롤혈증<br>에 의한 지질대사 개선   | 1일 3회, 1회 3캡슐,<br>식전 30분 전에 복용   | 300C        | 비급여<br>130원       |
| 일반<br>219  |    | 캠벨 정<br>방풍통성산건조엑스(4.64-1)<br>237.5mg  | 배에 피하지방이 많고 변비가 있는 환자<br>의 다음 증상 : 고헤압의 동반증상(두근거<br>림, 어깨결림, 흉조), 비만, 부기, 변비  | 1회 2정, 1일 3회 식전 또는 식간에<br>복용   | 500T        | 비급여<br>88원        |
| 일반<br>219  |    | 디카틴 정<br>L-carnitine 330mg  | 1차성, 2차성 카르니틴 결핍증 허혈성 심질<br>환에 의한 심근대사장애 : 협심증, 급성심근<br>경색  | 1일 2~3g을 2~3회 분할 경우 투여   | 90T         | 비급여<br>180원       |
| 일반<br>238  |    | 마노엘 정<br>Aloe extract 100mg<br>Magnesium hydroxide 500mg<br>Ursodesoxycholic acid 10mg                              | 변비, 변비에 따른 다음 증상의 완화 :<br>식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효,<br>치질   | 1회 1정 성인(15세이상) 1일 3회 11세<br>~14세 1일 2회를 식전(식간 또는 식<br>후)에 복용  | 300T        | 비급여<br>121원       |
| 일반<br>339  |    | 다이엔 캡슐<br>Green tea powder 250mg<br>Orthosiphon powder 150mg  | 비만 또는 과체중시 체중감량 보조제   | 1회 1~2캡슐, 1일 3회 복용   | 300C        | 비급여<br>141원       |
| 일반<br>313  |    | 바이타비 정<br>Folic acid 250µg<br>Cyanocobalamin 500µg<br>Pyridoxine HCl 50mg   | o 다음 경기의 비타민 B의 보급<br>- 임신·수유기<br>- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복후)의<br>체력 저하시<br>o 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순<br>염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진,<br>피부염 | 만 8세 이상 어린이 및 성인 :<br>1일 2회, 1회 1정 복용  | 300T        | 비급여<br>130원       |
| 전문<br>124  |    | 티파론 정<br>Tiropramide HCl 100mg  | 간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통,<br>신장·요관의 산통에서의 급성 경련성<br>동통, 위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염,<br>수술 후 유착에서의 복부 경련 및 동통  | 1회 1정, 1일 2~3회   | 30T<br>500T | 669904070<br>135원 |

## 항악성 종양제

| 구분<br>분류번호   | 성상 | 제품명·성분·함량   | 효능·효과  | 용법·용량 | 포장                 | 보험코드               |
|--------------|----|---|--|-------|--------------------|--------------------|
| 전문/희귀<br>421 |    | 이스카도엠 0.01mg<br>Viscum Album(Mali) Soluble<br>Extract(1-5) 0.05mg/mL    | <p>종양의 치료, 종양수술후 재발의 예방,<br/>전암증 병소 조절기관의 악성질환,<br/>골수기능의 자극</p> <p>1. 초기 단계 : 시리즈0에서부터 단계<br/>적인 용량증가, 주 2~3회 피하주사<br/>2. 유지단계<br/>- 개별적으로 결정된 최적용량으로<br/>치료를 지속<br/>- 유지기간 동안 시리즈의 치료는<br/>가장 높은 강도를 나타내는 용량,<br/>또는 해당 종류의 묽음을 사용<br/>하는 것으로 지속</p> |       | 7A                 | 비급여<br>(053100040) |
| 전문/희귀<br>421 |    | 이스카도엠 0.1mg<br>Viscum Album(Mali) Soluble<br>Extract(1-5) 0.5mg/mL      |  | 7A    | 비급여<br>(053100100) |                    |
| 전문/희귀<br>421 |    | 이스카도엠 1mg<br>Viscum Album(Mali) Soluble<br>Extract(1-5) 5mg/mL          |  | 7A    | 비급여<br>(053100050) |                    |
| 전문/희귀<br>421 |    | 이스카도엠 10mg<br>Viscum Album(Mali) Soluble<br>Extract(1-5) 50mg/mL        |  | 7A    | 비급여<br>(053100010) |                    |
| 전문/희귀<br>421 |    | 이스카도엠 20mg<br>Viscum Album(Mali) Soluble<br>Extract(1-5) 100mg/mL       |  | 7A    | 비급여<br>(053100090) |                    |
| 전문/희귀<br>421 |    | 이스카도큐 0.01mg<br>Viscum album(Quercus) Soluble<br>Extract(1-5) 0.05mg/mL |  | 7A    | 비급여<br>(053100060) |                    |
| 전문/희귀<br>421 |    | 이스카도큐 0.1mg<br>Viscum album(Quercus) Soluble<br>Extract(1-5) 0.5mg/mL   |  | 7A    | 비급여<br>(053100080) |                    |
| 전문/희귀<br>421 |    | 이스카도큐 1mg<br>Viscum album(Quercus) Soluble<br>Extract(1-5) 5mg/mL       |  | 7A    | 비급여<br>(053100070) |                    |
| 전문/희귀<br>421 |    | 이스카도큐 10mg<br>Viscum album(Quercus) Soluble<br>Extract(1-5) 50mg/mL     |  | 7A    | 비급여<br>(053100020) |                    |
| 전문/희귀<br>421 |    | 이스카도큐 20mg<br>Viscum album(Quercus) Soluble<br>Extract(1-5) 100mg/mL    |  | 7A    | 비급여<br>(053100030) |                    |



## 해열소염진통제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량   | 효능·효과   | 용법·용량                      | 포장  | 보험코드<br>급여상한액       |
|------------|----|---|---|----------------------------|-----|---------------------|
| 전문<br>114  |    | 크낙 주 2mL<br>Diclofenac B-dimethylamino ethanol 90mg/2mL | 류마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추염, 외상후·수술후 염증 및 동통, 급성통풍, 신 및 간산통 | 1일 1앰플, 둔부의 상부 한쪽면에 갑속이 주사 | 50A | 669903791<br>1,044원 |

## 진경제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량                           | 효능·효과                              | 용법·용량  | 포장  | 보험코드               |
|------------|----|-------------------------------------|------------------------------------|--|-----|--------------------|
| 전문<br>124  |    | 미네엠 주<br>Magnesium sulfate 0.5g/5mL | 경련, 자간, 전해질보급(저마그네슘혈증), 자궁경직(분만촉진) | 1~5g을 근육 또는 천천히 정맥주사, 전해질보급을 위해서는 1일 2~4g을 수회 분할하여 근육 또는 매우 천천히 정맥주사 | 25A | 비급여<br>(669904701) |

## 비타민제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량   | 효능·효과   | 용법·용량   | 포장  | 보험코드               |
|------------|----|---|---|---|-----|--------------------|
| 전문<br>319  |    | 멀티비타 주<br>Cyanocobalamin 5µg<br>Biotin 60µg<br>Folic acid 400µg<br>Tocopherol acetate 10mg<br>Dexpanthenol 15mg<br>Nicotinic acid amide 40mg<br>Ascorbic acid 100mg<br>Riboflavin sodium phosphate 3.6mg<br>Thiamine HCl 3.81mg<br>Pyridoxine HCl 4.86mg<br>Ergocalciferol 5µg(200IU)<br>Retinol palmitate 1.815mg(3,300IU)/1mL | 1. 수액제로 영양을 공급받는 환자의 비타민 유지요법<br>2. 다음 환자의 비타민(비타민 K제외) 결핍 예방<br>- 외과수술시, 중증화상, 골절 및 기타 외상<br>- 중증감염증, 혼수상태 | 11세 이상의 소아 및 성인 : 이 약에 주사용 증류수 5 mL를 가볍게 흔들어 녹인 다음, 5분 이내에 정맥주사용 포도당 주사액, 생리식염 주사액 또는 이와 유사한 수액제 500~1,000 mL에 혼합하여 1일 1회 점적 정맥주사 | 10V | 비급여<br>(669906440) |
| 전문<br>239  |    | 펜타비타 주<br>Dexpanthenol 500mg/2mL  | 판토텐산결핍증의 예방 및 치료, 판토텐산의 수요가 증대하고 식으로부터 섭취가 불충분한 때의 보급   | 1회 20~100mg 1일 1~2회 근육 또는 정맥주사, 수술 후 장관 마비에는 1회 50~500mg 1일 1~3회 투여, 필요시 6회까지 증가  | 50A | 비급여<br>(669904690) |
| 전문<br>312  |    | 푸르민 주 5mg<br>Fursultiamine HCl 54.6mg/10mL  | 비타민 B1 결핍증의 예방 및 치료, 비타민 B1의 수요가 증대하여 음식으로부터 섭취가 불충분한 때의 보급 등   | 통상 성인 1일 5~100mg을 피하근육 내 또는 정맥내에 주사   | 10A | 비급여<br>(669904210) |
| 전문<br>313  |    | 헥사비타 주<br>Pyridoxine HCl 100mg/2mL  | 비타민 B6 결핍증의 예방 및 치료, 비타민 B6의 수요가 증대하여, 식으로부터의 섭취가 불충분할 경우   | 1일 10~100mg을 1~2회 분할하여 근육, 피하 또는 정맥주사   | 50A | 비급여<br>(669904680) |
| 전문<br>314  |    | 대한뉴팜 비타민씨 주 10g<br>Ascorbic acid 10g/20mL   | 비타민 C 결핍증의 예방과 치료, 비타민 C의 요구량이 증가하는 경우  | 1일 50~1,000mg을 1일 1회~수회 분할하여 피하, 근육 또는 정맥주사   | 10A | 비급여<br>(669900560) |
| 전문<br>311  |    | 바이타디 주<br>Cholecalciferol 5mg (200,000IU)/1mL   | 비타민 D가 결핍된 고령자 및 청소년에서의 비타민 D 결핍의 예방과 치료, 비타민 D가 결핍된 성인에서의 비타민 D 결핍의 치료                                     | 성인 : 콜레칼시페롤로서 200,000IU를 근육주사<br>청소년 : 콜레칼시페롤로서 200,000IU를 근육주사<br>고령자 : 콜레칼시페롤로서 100,000IU를 근육주사                                 | 5A  | 비급여<br>(669906220) |

## 순환기계용제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량                               | 효능·효과   | 용법·용량   | 포장  | 보험코드               |
|------------|----|---|---|---|-----|--------------------|
| 전문<br>219  |    | 지다코 주<br>Ginkgo leaf extract 17.5mg/5mL | 뇌혈액순환장애 및 뇌영양장애(뇌혈관부전), 지적 및 감각능력저하, 어지러움, 이명 등을 수반하는 뇌기능장애   | 1일 5~10mL를 근육주사 또는 정맥주사하거나 2일마다 15mL를 정맥주사          | 25A | 비급여<br>(669903400) |
| 전문<br>219  |    | 메조카틴 주<br>L-carnitine 2g/10mL           | 1. 1차성, 2차성 카르니틴결핍증<br>2. 허혈성심질환에 의한 심근대사장애 : 협심증, 급성심근경색<br>3. 혈액투석중인 말기 신 질환자의 카르니틴 결핍증 치료  | 1차성, 2차성 카르니틴결핍증 : 성인 1일 2~3g을 2~3회 분할하여 근육 또는 정맥주사 | 10A | 비급여<br>(669905900) |
| 전문<br>119  |    | 포스콜린 주<br>Choline alfoscerate 1g/4mL    | 1. 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군 : 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력감소<br>2. 감정 및 행동변화 : 정서불안, 자극과민성, 주위 무관심<br>3. 노인성 가성우울증 | 1일 1회 1g을 근육 또는 정맥주사                                | 10A | 비급여<br>(669906431) |

## 무기질제제

| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량   | 효능·효과   | 용법·용량   | 포장  | 보험코드               |
|------------|----|---|---|---|-----|--------------------|
| 전문<br>339  |    | 멀티트레이스 주<br>Selenious acid 327µg<br>Chromic chloride hydrate 205µg<br>Cupric sulfate pentahydrate 15.7mg<br>Manganese sulfate monohydrate 3.08mg<br>Zinc sulfate heptahydrate 43.9mg/10mL | 경정맥 영양보급시 미량원소(아연, 구리, 망간, 셀레늄, 크롬)의 보급   | 의사의 처방에 따라 사용하되, 혈장 미량 원소량을 확인하여 용량 조절의 지침으로 삼음   | 10V | 비급여<br>(669906880) |
| 전문<br>322  |    | 셀렌 주<br>Selenious acid 654µg/10mL   | 비경구영양요법(TPN)시 셀레늄 보충  | 성인 : 대사가 안정적인 비경구영양요법(TPN)시 1일 셀레늄으로서 20~40 µg(이 약은 셀레늄 40 µg/mL를 포함)을 주사   | 10V | 비급여<br>(669906920) |
| 전문<br>322  |    | 셀레네 주<br>sodium selenite pentahydrate 1.66mg/mL   | 영양공급으로 보충될 수 없는 셀레늄 결핍 환자에서 셀레늄 보급  | 셀레늄으로서 1일 100µg을 근육주사 또는 정맥주사 필요한 경우 1일 200µg 까지 증량 치료가 적절한지를 확인하기 위하여 셀레늄의 혈중농도를 측정, 만약 이 약을 통한 비경구 영양요법(TPN)기분 주사에 추가로 투여할 경우 반드시 1일 용량은 셀레늄으로서 100µg을 사용 | 10V | 비급여<br>(669907071) |
| 전문<br>322  |    | 대한뉴팜 염화마그네슘 주 10%<br>Magnesium chloride 1g/10mL   | 1. 토르사드 드 포인트(Torsade de pointe)치료<br>2. 저마그네슘혈증을 동반한 급성 저칼륨혈증 치료<br>3. 전해질 불균형시 마그네슘 보충<br>4. 비 경구영양 공급시 마그네슘 보충<br>5. 자간전증(임신중독증) 위험의 예방 및 치료 | 토르사드 드 포인트(Torsade de pointe) 치료 : 마그네슘 8mmol (염화마그네슘 1.6g)을 천천히 정맥주사   | 10A | 비급여<br>(669905890) |
| 전문<br>322  |    | 징크에스 주 5mL<br>Zinc sulfate hydrate 22mg (As Zinc 5mg)   | 비경구영양요법(TPN)시 아연 보충   | 대사적으로 안정한 TPN환자 : 2.5~4mg/일   | 10V | 비급여<br>(669905811) |
| 전문<br>322  |    | 징크에스 주 10mL<br>Zinc sulfate hydrate 44mg (As Zinc 10mg)   |   |   | 10V | 비급여<br>(669905541) |

## 단백아미노산제


| 구분<br>분류번호 | 성상 | 제품명·성분·함량                 | 효능·효과         | 용법·용량                             | 포장  | 보험코드               |
|------------|----|---------------------------|---------------|-----------------------------------|-----|--------------------|
| 전문<br>325  |    | 프라세인엠 주<br>자하거추출물 2mL/2mL | 갱년기 장애 증상의 개선 | 1회 2mL, 1주일마다 3회씩 2주간 (총 6회) 피하주사 | 10A | 비급여<br>(669904260) |




## 해열진통소염제

| 구분<br>분류번호 | 성상  | 제품명·성분·함량                          | 효능·효과   | 용법·용량   | 포장  | 보험코드               |
|------------|---|------------------------------------|---|---|-----|--------------------|
| 전문<br>114  |  | 비코라민 주<br>Hydroxocobalamin 5mg/2mL | 급성신경염, 다발성 신경염, 좌골신경통, 류마티양 관절염, 척수근통, 건갑관 절주위염, 위염, 암 및 외상에 의한 신경통, 대상포진 및 편두통에 의한 신경통 | 1일 1회 근육주사 또는 정맥주사  | 50A | 비급여<br>(669906481) |
| 전문<br>114  |  | 뉴포팜 주<br>Nelopam HCl 100mg/2mL     | 급성통증의 대증요법, 특히 수술 후 통증  | 1회 20mg, 근육 또는 정맥주사<br>필요한 경우 1일 120mg을 초과하지 않는 범위에서 6시간마다 반복투여 | 10A | 비급여<br>(669906231) |

## 기타약물

| 구분<br>분류번호 | 성상  | 제품명·성분·함량  | 효능·효과   | 용법·용량  | 포장                       | 보험코드                        |
|------------|---|--|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| 전문<br>399  |    | 이엔지 주<br>Adenosine triphosphate disodium trihydrate 21.96mg/2mL<br>(As Adenosine triphosphate disodium 20mg) | 근무력증, 심부전, 만성감염에 있어서의 간기능 개선, 두부외상 후유증, 조절성 안정피로  | 보통성인 1회 5~20mg을 1~2회<br>피하, 근육 또는 정맥 주사  | 10A                      | 비급여<br>(669906040)          |
| 전문<br>392  |   | 리코리스 주<br>Ammonium Glycyrhizinate 26.5mg<br>Glycine 200mg<br>Cysteine Hydrochloride Monohydrate 10mg /10mL   | 두드러기, 습진, 알레르기성 피부질환, 약물중독의 보조요법<br>만성간질환의 간기능 개선   | 성인 : 1회 2~20mL, 1일 1회 만성<br>간질환에는 1회 40~60mL, 1일1회<br>정맥 또는 점적정맥주사.<br>증량하는 경우에는 1일 최대<br>100mL를 초과하지 않는다. | 50A                      | 비급여<br>(669906281)          |
| 전문<br>399  |  | 신텔라 주<br>Thioctic acid 25mg/5mL  | 티옷트산의 수요가 증대되는 경우의 보급 (격심한 육체노동시), Leigh증후군(아급성 괴사성뇌척수염), 중독성 (스트렙토마이신, 가나마이신에 의한) 및 소음성(직업성)의 내이성 난청 | 성인 1일 1회 10~25mg을 정맥내 주사   | 10A                      | 비급여<br>(669905780)          |
| 전문<br>399  |  | 리포익 주<br>Thioctic acid tromethamine 476.4mg/12mL<br>(As Thioctic acid 300mg)                                 | 당뇨병성 다발신경병증의 완화   | 중증의 증상에 대해 티옷트산 1일 600mg을 2~4주간 정맥주사, 그 이후에 이 약으로 1일 600mg을 경구투여   | 10A                      | 비급여<br>(669905970)          |
| 전문<br>399  |  | 바이온 주<br>Glutathione(reduced) 600mg  | 시스플라틴 또는 유사계열 화학요법에 의한 신경성질환의 예방  | 중증의 경우 1일 600~1200mg을<br>근육 주사 또는 점적 정맥 주사   | 10V                      | 비급여<br>(669902980)          |
| 전문<br>399  |  | 루치온 주<br>Glutathione(reduced) 600mg  |   |  | 10V                      | 비급여<br>(669905750)          |
| 전문<br>399  |  | 루치온 주 1200mg<br>Glutathione(reduced) 1200mg  |   |  | 10V                      | 비급여<br>(669906030)          |
| 전문<br>490  |  | 뉴디엔 주<br>Polydeoxyribonucleotide sodium 5.625mg/3mL  |   |  | 피부이식으로 인한 상처의 치료 및 조직 수복 | 1일 1바이알을 근육 또는 피하주사<br>로 투여 |
| 전문<br>395  |  | 리포라제 주<br>Hyaluronidase 1,500 I.U.   | 피하주사나 근육주사, 국소마취제 및 피하 주입 시 침투력증가, 조직 내에 과다하게 존재하는 체액 및 혈액의 재흡수 촉진                                    | 피하주입시(대량피하주사) :<br>바이알을 주사용수나 생리식염주사액 1mL에 녹여서 피하주입을 시작하기 전에 해당부위에 주사                                      | 10V                      | 비급여<br>(669904600)          |

## 건강기능식품

| 구분<br>분류번호 | 성상  | 제품명·성분·함량   | 효능·효과  | 용법·용량                      | 포장   | 보험코드 |
|------------|---|---|--|----------------------------|------|------|
|            |  | 아스코르빈산포 3g<br>Ascorbic acid 3g  | 아스코르빈산의 공급   | 물 또는 음료와 함께 섭취             | 100포 |      |
|            |  | 울트라파인 아스코르빈산<br>Ascorbic acid 3g  | 아스코르빈산의 공급   | 물 또는 음료와 함께 섭취             | 90포  |      |
|            |  | MSM(엠에스엠)<br>MSM(디메틸설폰) 2g  | 관절 및 연골건강에 도움  | 1일 1회, 1회 1포(2g)을 물과 함께 섭취 | 120포 |      |
|            |  | 슈퍼MSM 프로토콜<br>MSM(디메틸설폰) 750mg<br>비타민 C 300mg   | 관절 및 연골건강에 도움, 효과적인 신경통증 완화, 광범위한 활성산소 제거, 아스코르빈산의 공급  | 1일 1회, 1회 2정 섭취            | 180T |      |
|            |  | 에니플러스 캡슐<br>비타민 C, 산화마그네슘,<br>결정셀룰로오스, L-티로신  | [비타민 C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요<br>[마그네슘] 에너지 이용에 필요, 신경과 근육기능 유지에 필요   | 1일 2회, 1회 1캡슐              | 120C |      |
|            |  | 카보글루엑스 캡슐<br>비타민 B, 질산염, 비타민 B2,<br>비타민 B6 염산염, 비타민 C,<br>결정셀룰로오스, 흰강낭콩추출물,<br>진피추출물, 유청질 | [비타민 B] 탄수화물과 에너지 대사에 필요<br>[비타민 B] 체내 에너지 생성에 필요<br>[비타민 B] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요<br>[비타민 C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 1일 2회, 1회 2캡슐              | 300C |      |

## 의료기기

| 구분<br>분류번호 | 성상  | 제품명·성분·함량  | 효능·효과         | 용법·용량             | 포장      | 보험코드 |
|------------|---|--|---------------|-------------------|---------|------|
|            |  | 라필레어 MAX<br>Hyaluronic acid 20mg/ml                          | 일시적인 얼굴 주름 개선 | 얼굴 주름 부위의 피부층에 주입 | 1.1ml/s |      |
|            |  | 플랑셀 Max<br>Hyaluronic acid 20mg/ml<br>with lidocaine 0.3%    | 일시적인 얼굴 주름 개선 | 얼굴 주름 부위의 피부층에 주입 | 1.1ml/s |      |
|            |  | 플랑셀 N<br>Hyaluronic acid 20mg/ml<br>with lidocaine 0.3%      | 일시적인 얼굴 주름 개선 | 얼굴 주름 부위의 피부층에 주입 | 1.0ml/s |      |
|            |  | SSONDAR M9 Injector<br>- 9-Pin Needle<br>- Needle Size : 32G | 물광주사 전용 인젝터   |                   | 1Set    |      |

## 기타약물

| 구분<br>분류번호 | 성상  | 제품명·성분·함량                 | 효능·효과           | 용법·용량                                    | 포장   | 보험코드 |
|------------|---|---------------------------|-----------------|--|------|------|
| 일반<br>399  |  | 리도칸크림<br>Lidocaine 96mg/g | 남성성기 축각의 예민성 감소 | 연고로서 0.25~0.66g<br>(리도카인으로서 23~62mg)을 도포 | 500g | 비급여  |

## New Platform for Life Care



본사(공장) : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 66  
서울사무소 : 서울특별시 관악구 남현3길 61(남현동)  
TEL : 02-581-2333

수정일: 2017년 7월 1일