

## [용법·용량]

성인

10 mL부터 정맥 내 주입이 권장되며, 0.9% 생리식염주사액, 링겔액, 5% 포도당 주사액에 혼합하여 약 15 ~ 60 분에 걸쳐서 천천히 정맥 주입한다. 심혈관계 작용 약 또는 비타민제와 동시에 투여할 수 있으나, 용액에 직접 혼합해서는 안 된다.

1. 노인성 치매(알츠하이머 및 혈관성 치매)

: 1일 투여용량은 10 - 30 mL로 4 주간 투여한다(5 회/주). 4 주 치료 후 재투약 하는 경우 2 개월간 휴약기를 갖는다.

2. 허혈성 뇌졸중

: 1일 투여용량은 30 - 50 mL로 10 - 21 일간 투여한다.

3. 출혈성 뇌졸중

: 1일 투여용량은 30 mL로 10 - 15 일간 투여한다.

4. 외상성 뇌손상

: ① 1일 투여용량 20 - 30 mL로 10 - 30 일간 투여한다.

또는, ② 1일 투여용량 50 mL로 10 일간 투여한다. 이때, 환자의 상태에 따라(예: Glasgow Outcome Scale extended [GOS-E] level <7) 추가치료 주기에 투여용량 10 mL로 10 일간 투여할 수 있으며, 치료 주기 사이에 20 일의 휴약기를 갖는다.