

메로페넴 성분 제제 허가사항 변경(안)

‘3. 이상반응’ 항

1) ~ 16) <생략>

17) 근골격계 : 횡문근융해증이 나타날 수 있다.

18) <생략>

‘4. 일반적 주의’ 항

1) ~ 8) <생략>

9) 횡문근융해증이 나타날 수 있으므로 근육통, 압통, 근력 약화, 흑색뇨, 크레아틴키나아제(CK) 상승과 같은 횡문근융해증의 징후나 증상이 관찰되는 경우, 이 약을 중단하고 적절한 처치를 한다.

메로페넴 성분 제제 허가사항 변경대비표

항목	기허가 사항	변경(안)
3. 이상반응	1) ~ 16) <생략> <신설> 17) <생략>	1) ~ 16) <생략> 17) 근골격계 : 횡문근융해증이 나타날 수 있다. 18) <생략>
4. 일반적 주의	1) ~ 8) <생략> <신설>	1) ~ 8) <생략> 9) 횡문근융해증이 나타날 수 있으므로 근육통, 압통, 근력 약화, 흑색뇨, 크레아틴키나아제(CK) 상승과 같은 횡문근융해증의 징후나 증상이 관찰되는 경우, 이 약을 중단하고 적절한 처치를 한다.