

메토트렉세이트 성분 제제 허가사항 변경(안) - 나정

‘6. 상호작용’ 항

1)~13) <생략>

14) 혈액 독성 약물을 추가로 투여하면 메토트렉세이트의 심각한 혈액 독성 효과가 증가할 수 있으므로 병용투여를 피해야 한다. 특히 노인 환자의 경우 메타미졸과 메토트렉세이트를 동시에 투여하면 메토트렉세이트의 혈액 독성 효과가 증가할 수 있다.

메토트렉세이트 성분 제제 허가사항 변경(안) - 용액주사제

‘6. 상호작용’ 항

1)~17) <생략>

18) 혈액 독성 약물을 추가로 투여하면 메토트렉세이트의 심각한 혈액 독성 효과가 증가할 수 있으므로 병용투여를 피해야 한다. 특히 노인 환자의 경우 메타미졸과 메토트렉세이트를 동시에 투여하면 메토트렉세이트의 혈액 독성 효과가 증가할 수 있다.

메토트렉세이트 성분 제제 허가사항 변경(안) - 필름코팅정

‘6. 상호작용’ 항

약제명 등	임상증상·조치방법	기전·위험인자
<생략>		
아산화질소	아산화질소 마취는 엽산 의존 대사 경로에서 구내염, 골수억제 및 신경독성과 같은 독성을 잠재적으로 유발하는 메토트렉세이트의 효과를 증가시킨다. 메토트렉세이트를 투여받는 환자에게 아산화질소 마취와 병용을 피한다. 최근에 아산화질소를 투여 받은 이력이 있는 환자는 메토트렉세이트를 투여할 때 주의한다.	
<u>혈액 독성 약물</u>	<u>혈액 독성 약물을 추가로 투여하면 메토트렉세이트의 심각한 혈액 독성 효과가 증가할 수 있으므로 병용투여를 피해야 한다. 특히 노인 환자의 경우 메타미졸과 메토트렉세이트를 동시에 투여하면 메토트렉세이트의 혈액 독성 효과가 증가할 수 있다.</u>	

메토트렉세이트 성분 제제 허가사항 변경대비표 - 나정

항목	기허가 사항	변경(안)
6. 상호작용	1)~13) <생략> <u>14) <신설></u>	1)~13) <생략> <u>14) 혈액 독성 약물을 추가로 투여하면 메토트렉세이트의 심각한 혈액 독성 효과가 증가할 수 있으므로 병용투여를 피해야 한다. 특히 노인 환자의 경우 메타미졸과 메토트렉세이트를 동시에 투여하면 메토트렉세이트의 혈액 독성 효과가 증가할 수 있다.</u>

메토트렉세이트 성분 제제 허가사항 변경대비표 - 용액주사제

항목	기허가 사항	변경(안)
6. 상호작용	1)~17) <생략> <u>18) <신설></u>	1)~17) <생략> <u>18) 혈액 독성 약물을 추가로 투여하면 메토트렉세이트의 심각한 혈액 독성 효과가 증가할 수 있으므로 병용투여를 피해야 한다. 특히 노인 환자의 경우 메타미졸과 메토트렉세이트를 동시에 투여하면 메토트렉세이트의 혈액 독성 효과가 증가할 수 있다.</u>

메토트렉세이트 성분 제제 허가사항 변경대비표 - 필름코팅정

항목	기허가 사항			변경(안)		
6. 상호작용	약제명 등	임상증상·조치방법	기전· 위험 인자	약제명 등	임상증상·조치방법	기전· 위험 인자
	<생략>			<생략>		
	아산화질소	아산화질소 마취는 엽산의존 대사 경로에서 구내염, 골수억제 및 신경독성과 같은 독성을 잠재적으로 유발하는 메토트렉세이트의 효과를 증가시킨다. 메토트렉세이트를 투여받는 환자에게 아산화질소 마취와 병용을 피한다. 최근에 아산화질소를 투여 받은 이력이 있는 환자는 메토트렉세이트를 투여할 때 주의한다.		아산화질소	아산화질소 마취는 엽산의존 대사 경로에서 구내염, 골수억제 및 신경독성과 같은 독성을 잠재적으로 유발하는 메토트렉세이트의 효과를 증가시킨다. 메토트렉세이트를 투여받는 환자에게 아산화질소 마취와 병용을 피한다. 최근에 아산화질소를 투여 받은 이력이 있는 환자는 메토트렉세이트를 투여할 때 주의한다.	
	<신설>			혈액 독성약물	혈액 독성 약물을 추가로 투여하면 메토트렉세이트의 심각한 혈액 독성 효과가 증가할 수 있으므로 병용투여를 피해야 한다. 특히 노인 환자의 경우 메타미졸과 메토트렉세이트를 동시에 투여하면 메토트렉세이트의 혈액 독성 효과가 증가할 수 있다.	