사용상의 주의사항

레보카르니틴 경구제(엘칸정330밀리그램(엘-카르니틴)등 26품목-일반의약품)

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 이 약에 과민증 환자

2. 부작용
일시적인 구역·구토, 복통, 설사, 체취가 나타날 수 있다.
이 약을 복용한 환자에게서 발진, 두드러기, 안면부종이 보고되었다.
이 약을 복용한 요독증 환자에게서 경증의 근무력증이 보고되었다.

3. 임부 및 수유부에 대한 투여
 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 2) 모유의 이행은 알려진 바 없으나 많은 약들이 모유로 이행되므로 수유중에는 신중히 투여한다.

4. 적용상의 주의(액제)
 경구투여전 희석하여 투여한다.

허가사항 변경대비표

항 목	기 허 가 사 항	변 경 사 항
2. 부작용	일시적인 구역·구토, 복통, 설사, 체취가 나타날 수 있다. (추가) (추가)	일시적인 구역·구토, 복통, 설사, 체취가 나타날 수 있다. 이 약을 복용한 환자에게서 발진, 두드러기, 안면부종이 보고되었다. 이 약을 복용한 요독증 환자에게서 경증의 근무력증이 보고되었다.