

## 용법·용량

(경구 : 정제)

1. 성인 및 6 세 이상의 소아 : 세티리진염산염으로서 1 일 1 회 10mg 취침 전에 경구 투여한다.
2. 이상반응에 민감한 환자의 경우는 5mg 씩을 아침, 저녁에 분할 투여한다.
3. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.
4. 신장애 환자 : 투여 간격은 환자의 신기능에 따라 조절되어야 한다. 다음 표를 참조하여 용량을 조절한다. 이 용량 표를 사용하기 위해서는 mL/min 단위의 크레아티닌 청소율 (CLcr)이 필요하다. CLcr (mL/min)은 다음 공식을 이용하여 혈청 크레아티닌 (mg/dL) 측정치로부터 계산된다 :

CLcr =	$[140 - \text{연령 (세)}] \times \text{체중 (kg)}$	(여성인 경우 $\times 0.85$ )
	$72 \times \text{혈청 크레아티닌 (mg/dL)}$	

<신기능이 손상된 성인 환자에 대한 용량 조절>

구분	크레아티닌 청소율 (mL/min)	용량 및 빈도
정상	$\geq 80$	1 일 1 회, 10 mg
경증	50 - 79	1 일 1 회, 10 mg
중등도	30 - 49	1 일 1 회, 5 mg
중증	< 30	매 2 일마다 1 회, 5 mg
말기 단계의 신 질환을 가진 투석중인 환자	<10	금기

신장장애를 가진 소아 환자는 환자의 신 청소율과 체중을 고려하여 개별적으로 용량을 조절해야 한다.