

사용상의 주의사항(주사제)

‘다음 환자에는 신중히 투여할 것’ 항

- 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제, 항혈소판제)을 복용하고 있는 환자
- 2) 수술이 예정된 자

‘이상반응’ 항

- 4) 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다.

‘수유부’ 항

모유 수유 중에는 복용을 피하는 것이 좋다. 은행업엑스 성분이 모유로 이행되는지 여부는 알려져 있지 않다.

‘은행업엑스 함유제제’ 주사제 허가사항 변경대비표

기 허가 사항	변경 사항
(생략)	(기허가사항과 동일)
<신설>	3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
	<u>1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제, 항혈소판제)을 복용하고 있는 환자</u>
	<u>2) 수술이 예정된 자</u>
3. 이상반응	4. 이상반응
1) ~ 3) (생략)	1) ~ 3) (기허가사항과 동일)
	<u>4) 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다.</u>
<신설>	5. 수유부
	<u>모유 수유 중에는 복용을 피하는 것이 좋다. 은행업엑스 성분이 모유로 이행되는지 여부는 알려져 있지 않다.</u>
4. 기타	6. 기타
이 약은 당 대사에 영향을 주지 않는다는 보고가 있다.	이 약은 당 대사에 영향을 주지 않는다는 보고가 있다.